

گزارش یک مورد تراتوم گوش

دکتر میرعبدالعلی مجابی*

A report on ear teratoma

M.A. Mojabi

Abstract

Teratomas are germ cell tumors usually found in the young and are characteristically composed of the tissue foreign to the place where they arise. Sometimes they arise in the three layers of mesoderm, endoderm and ectoderm.

Two teratomas of the middle ear were first reported in 1866 and since then, 19 additional cases have been recorded. This report describes a case of teratoma of middle ear and mastoid of a 41 year old male who complained of tinnitus, vertigo, vomiting and hearing-loss of right ear. He underwent an operation and a hairy cyst was observed in the mastoid and middle ear. Teratoma was reported in the pathology results.

Keywords : Teratoma, Dermoid Cyst

چکیده

تراتوم نوادگی مشکل از سلول‌ها یا بافت‌های بالغ یا نابالغ است که از بیش از یک لایه زاینده و گاهی از هر سه لایه آندودرم، مزددرم و اکتودرم به وجود می‌آید. اولین بار در سال ۱۸۶۶ دو مورد تراتوم گوش گزارش شده و تاکنون ۱۹ مورد دیگر آن به ثبت رسیده است.

بیماری که معرفی می‌شود مرد ۴۱ ساله‌ای است که با علائم وزوز گوش، سرگیجه و استفراغ مراجعت کرده است. در آزمایش‌های مربوطه، معاینه بالینی و سی‌تی اسکن، کلستئاتوم وسیع مطرح گردید و تنها هنگام جراحی رادیکال ماستوئیدکتومی توده کبستی مشخص شد. نتیجه آسیب‌شناسی تراتوم گوش میانی و ماستوئید را محرز کرد.

کلید واژه‌ها : تراتوم گوش - کیست درموئید - کلستئاتوم

■ مقدمه :

soft تقسم می شود که گاهی تغییرات بدخیمی دارد. کیست درموئید از دولایه اکتودرمی و مزودرمی تشکیل می شود و نام صحیح آن تراتوم است.

تراتوم ناحیه سر و گردن ده درصد تراتوم های بدن را شامل می شود که مکان شایع آن در گردن و نازوفارنکس است.^(۳)

■ معرفی بیمار :

بیمار، آقای م.م ۴۱ ساله متولد روسر و ساکن قزوین، در تاریخ ۷۸/۲/۴ با شکایت وزوز گوش به مدت یک ماه مراجعه کرد. علامت سرگیجه و حالت تهوع واستفراغ را از یک هفته قبل ذکر کرد. سابقه ابتلا به بیماری خاصی نداشت. دارویی مصرف نمی کرد و به مدت ۲۰ سال روزانه ۸ عدد سیگار می کشید.

■ بروزی های آزمایشگاهی :

در معاینه، پرده گوش راست ملتهد و برجستگی به خارج (Bulging) داشت. معاینه حلق، بینی و پرده گوش چپ طبیعی بود. در اوディومتری ساده گوش راست به میزان ۶۰ دسی بل کم شناوی انتقالی و ۲۵ دسی بل سنگینی عصبی را نشان داد. او دیوگرام گوش چپ طبیعی بود (جدول های شماره ۱ و ۲).

بیمار با تشخیص احتمالی اوتیت حاد چرکی در تاریخ ۷۸/۲/۴ تحت عمل پاراستر قرار گرفت. ترشحات چرکی غلیظ خارج گردید و سپس گروم تگذاری جهت ادامه تخلیه ترشحات انجام شد. بعد از جراحی علامت بیمار بهبودی نسبی یافت ولی با توجه به وضعیت خاص بیمار و نوع ترشحات درخواست سی تی اسکن گوش شد.

ریشه لغت تراتوم از کلمه *teraton* یونانی است که معنی آن عفریته یا هیولا است.^(۱) تراتوم تودهای مشکل از سلول ها یا بافت های مشخص بالغ یا نابالغ است که از بیش از یک لا یه زاینده و گاهی از هر سه لا یه زاینده پدید می آید. منشأ این تودها سلول های چند توانی هستند که به طور طبیعی در تخدمان یا بیضه ها وجود دارند و یا به طور غیرطبیعی در بقا یا جدا مانده جنینی در خط وسط یافت می شوند.^(۷) لا یه زاینده در دوره جنینی در خط وسط زیر اپیتیوم سولمیک (*Coelemic*) قرار دارد و معمولاً به طرف گونادها مهاجرت می کند. اگر به هر علتی اختلال در این روند ایجاد شود تراتوم شکل می گیرد.^(۶)


اولین تراتوم گوش در سال ۱۸۶۶ توسط توین بی (Toynbee) گزارش گردید. تا کنون ۱۹ مورد دیگر آن به ثبت رسیده که به اسامی مختلف مانند پولیپ مودار مادرزادی، کیست اپیدرموئید، کیست درموئید هامارتوم، تراتوم پوستی گزارش شده است. سازمان بهداشت جهانی با ارانه تقسیم بندی جدید سعی دارد اسامی مختلف تراتوم را تصحیح نماید. این سازمان تراتوم تخدمان را به انواع منودرم، نابالغ و بالغ و مخلوط تقسیم کرده است.^(۸) این تقسیم بندی در مورد تراتوم سر و گردن هم صادق است.

منودرم از یک لا یه زاینده که معمولاً اکتودرم است تشکیل می شود. تراتوم نابالغ معمولاً بدخیم است و از نظر بافت شناسی به درجات صفر الی سه تقسیم می شود. در نوع درجه صفر سلول ها قادر فعالیت می تورزی هستند و بافت نابالغ وجود ندارد و در درجات بعد به تدریج فعالیت می تورز و میزان بافت جنینی افزایش پیدا می کند. تراتوم بالغ به انواع کیست و تودها


تخلیه گردید. استخوان ماستوئید به طور کامل از بین رفته بود به طوری که با برداشتن کیست، سینوس سیگموئید بدون پوشش استخوانی و عریان بود و مقدار زیادی از ترشحات غلیظ سفید رنگ اطراف آن خارج گردید. در بررسی گوش میانی ترشحات غلیظ کیست فضای گوش میانی و شیپور اوستاش را پر کرده و استخوانچه‌ها از بین رفته بودند. لذا بیمار تحت عمل رادیکال ماستوئیدکتومی قرار گرفت و برای پوشش گوش میانی از گرافت فاسیای عضله گیجگاهی استفاده شد. برای پوشش سینوس سیگموئید از گرافت پوستی ناحیه بازو استفاده گردید. بنابراین نتیجه گزارش پاتولوژی تراatom کیستی با دو لایه اکتودرمی و مزودرمی بود.

در سی‌تی اسکن پرشدگی و کدورت حفره تمیان با انتشار به داخل سلول‌های ماستوئید و تخریب دیواره بین سلولی مشاهده شد. ضایعه به داخل حفره خلفی مغز تجاوز کرده بود و اروزیون واضح و نازک شدگی شدید در خلف زانه ماستوئید و تخریب کامل استخوان در رترواوریکولر ملاحظه شد به طوری که ضایعه به خارج جمجمه (زیر اسکالپ) راه یافته بود (شکل‌های شماره ۱ و ۲).


در مجموع سی‌تی اسکن به طور قوی احتمال کلستاتوم وسیع را مطرح کرد. لذا بیمار در تاریخ ۷۸/۲/۱۸ تحت عمل جراحی گوش قرار گرفت و در ناحیه ماستوئید توده‌ای بزرگ و کیستیک مشاهده شد که با شکاف دادن آن ترشحات غلیظ و مسوی فراوان



جدول ۳ :
اوڈیوگرام گوش راست



جدول ۱ :
اوڈیوگرام گوش چپ



شکل‌های ۱ و ۲:

سی‌تی‌اسکن ماستوئید هر دو گوش

■ بحث و نتیجه‌گیری:

نواحی دیگر بدن مشاهده می‌شود. تراatom کیستی در ۹۹ درصد موارد خوش خیم است که چون مملو از ضمام مپوستی است آن را کیست درموئید هم می‌نامند.^(۵)

تراatom در ۸۰ درصد موارد در سنین ۲۰ الی ۳۰ سالگی مشاهده می‌شود و در اکثریت موارد به صورت یک طرفه است و بیشتر طرف راست را درگیر می‌کند که در این بیمار هم گوش راست درگیر بود.

تراatom سفت یا بدخیم تنها یک درصد موارد را تشکیل می‌دهد و در سنین قبل از بلوغ شایع تر است. این تراatom رشد سریع دارد، فراتر از تخدمان دست اندازی می‌کند و امید به زندگی ۵ ساله ۲۵ تا ۳۰ درصد است.^(۵)

پاتوژن تراatom به طور دقیق روش نیست و نظریه‌های مختلفی در این باره مطرح شده است. در تراatom منوردم سر و گردن عقیده بر این است که هنگام

تراatom کیستیک متشكل از بافت‌های سوماتیک بالغ از هر نوعی است. باقی که کیست را می‌پوشاند پوست است. کراتین تفلس یافته، ترشحات (بیشتر از غدد سپاسه) و توده‌های مو و حفره کیست را پر می‌کند. اجزاء تشکیل‌دهنده دیگر برونش، غضروف، استخوان بافت عصبی و دندان هستند. تراatom کیستیک ۲۰ درصد تومورهای تخدمان بالغین را تشکیل می‌دهد و در ۱/۸ درصد موارد تغییرات بدخیمی گزارش شده است.^(۷)

اگر تمام اجزاء تراatom بالغ و تمایز یافته باشند تراatom خوش خیم خواهد بود. اما در صورتی که سلول‌ها نابالغ باشند بدخیم تلقی می‌شود و یا قابلیت بدخیم شدن را دارد. تراatom ضایعه‌ای است که در اکثر موارد در تخدمان مشاهده می‌شود. البته ممکن است بیضه‌ها را هم درگیر نماید و در موارد بسیار نادر در

احتمال آن را مطرح کرده‌اند.^(۱)

مراجع :

1. Carlos B , Eustachian R. Tube teratoma and its terminological correctness. *J laryngol otol* 1999 ; 113 (3) : 271-4
2. Djouhri Marsot Dupuch K Joutel. Perichiasmatic granuloma occurring after radical mastoidectomy. 1998 ; Eur-Readial Medline (R) 8 (2) : 286-8
3. Ferlito A , Devaney KO. Development lesions of the Head and Neck terminology , 1995
4. Fried MP , Vernick DM. Dermoid cyst of the middle ear and mastoid. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1984 Oct ; 92 (5)
5. Gellis. Current-Obstetric Gynecologic Diagnosis and Treatment , 8th ed , Philadelphia , Saunders , 1996 : 284
6. Govan Macfarlane. Pathology-Illustrated , 2nd ed , Churchill Livinston Co , 1986 , PP 199-200
7. Robbins Stanley. Pathologic Basis of Disease , 6th ed , Philadelphia , Saunders , 1999 , PP 262-3
8. Talerman A. Germ cell tumours of the ovary. In Blaustein's Pathology of Female Genital Tract , 4th ed , Berlin , Springer verlag , 1994 , PP 849-901

بسته شدن و تکامل لوله اولیه جنینی قسمتی از بقایای اپیتیلیوم جا می‌ماند. برخی آن را به علت مهاجرت سلول‌های اکتودرمی می‌دانند.^(۱)

با توجه به شیع تراتوم در نازوفارنکس تصور می‌شود تراتوم‌ها در نزدیکی محور خط وسط بدن از مغز تا ساکروم قرار می‌گیرند و تشکیل می‌شوند. تراتوم گوش در حقیقت انتشار تراتوم نازوفارنکس از مدخل شبپور اوستاش است.^(۱)

جدیدترین گزارش تراتوم مربوط به سال ۱۹۹۸ در آلمان است. بیمار با علائم منتشریت شیمیایی مراجعه می‌کند و با تشخیص اولیه کلستاتوم وسیع گوش تحت عمل رادیکال ماستوئیدکتومی قرار می‌گیرد. در این عمل کیستی محتوی ترشحات غلیظ در گوش میانی و ماستوئید مشاهده می‌گردد که به علت خوردنگی استخوان تا فضای ساب آراکنوئید انتشار یافته است. توجیه علت منتشریت را اتصال فضای گوش میانی با مایع مغزی نخاعی می‌داند که با پارگی کیست درمونید منتشر را درگیر کرده است.^(۲)

تاکنون تعداد ۱۱۴ تراتوم نازوفارنکس گزارش شده است که قسمتی از آنها در مجاورت شبپور اوستاش بوده و یا به آن انتشار پیدا کرده است ولی از سال ۱۸۸۶ تاکنون تعداد ۱۹ تراتوم گوش میانی و ماستوئید گزارش شده است. ۲ مورد آن تراتوم منورم و تراتوم نابالغ بوده است. ۱۰ مورد تراتوم سفت و پولیپوئید که محتوی لایه‌های اکتودرمی و مزودرمی بوده به ثبت رسیده است. ۷ مورد باقی مانده هر سه لایه جنینی را داشته‌اند. در ۱۰ مورد از تراتوم‌های فوق (۵۰ درصد) منشأ ، شبپور اوستاش بوده که به گوش میانی گسترش یافته است. در بقیه موارد هم تویستندگان