

## تروموبوآستنی گلانزمن در ایران

دکتر فرهاد رازجو\*

### Glanzmann's thrombasthenia in Iran

F. Razjoo

#### Abstract

**Background :** Glanzmann's thrombasthenia is a rare inherited disorder of platelet function in which platelets lack ability to bind fibrinogen and aggregate. The disease is characterized by glycoproteins IIb and / or IIIa deficiency.

**Objective :** To investigate Glanzmann's thrombasthenia in Iran and evaluate the clinical signs and laboratory findings of patients.

**Methods :** 342 patients with Glanzmann's thrombasthenia who had been submitted by coagulation laboratory of Iranian blood transfusion service since 21 years ago were studied. The tests included platelet count, platelet morphology, bleeding time, clotting time, clot reaction, specific tests for PE-3 activity; glass adhesion, platelet aggregation by aggregating agents. The information regarding all patients had been used.

**Findings :** It was revealed that only 40% of patients were diagnosed before age of 5. The number of male patients were 50% more than females. Only 11% of patients had been diagnosed during one year after episode of mucosal bleeding. 90% of patients had familial history and mortalities due to bleeding.

**Conclusion :** Regarding the high prevalence of familial marriage in Iran, Glanzmann's thrombasthenia is not considered as a rare disease. In case of sufficient lab facilities, the chance of patient diagnoses will become higher.

**Keywords :** Platelet, Glanzmann's Thrombasthenia, Aggregation

#### چکیده

**زمینه :** بیماری تروموبوآستنی گلانزمن از اختلال‌های کمیاب عملکرد پلاکت‌هاست که به دلیل فقدان گلیکوپروتئین‌های IIb و IIIa پلاکت‌ها توانایی اتصال با فیبرینوژن و تجمع را ندارند.

**هدف :** مطالعه جهت ارزیابی علائم بالینی و یافته‌های آزمایشگاهی بیماران تروموبوآستنی گلانزمن در ایران انجام شد.

**مواد و روش‌ها :** پیروزه ۳۴۲ بیمار مبتلا به تروموبوآستنی گلانزمن که در طول ۲۱ سال اخیر به آزمایشگاه انتقاد سازمان انتقال خون ایران مراجعه کرده بودند، بررسی شد. اطلاعات مربوط به آزمایش‌های شمارش تعداد پلاکت، شکل پلاکت‌ها، زمان انتقاد، جمع شدن لخته، فعالیت فاکتور ۳ پلاکتی، چسبندگی پلاکت‌ها و چگونگی پاسخ به عوامل انبوه‌ساز ثبت شد.

**یافته‌ها :** ۴۰٪ بیماران در زمان تشخیص کمتر از ۵ سال داشتند. تعداد بیماران مذکور ۱۶٪ بیشتر از بیماران مؤنث بود. فقط ۱۱٪ بیماران مورد مطالعه در فاصله یک سال بعد از بروز خونریزی‌های مخاطی تشخیص داده شده بودند. والدین ۹۰٪ بیماران خوبی‌شاندنی نسبی داشتند که در این گروه ساقمه بیماری‌های خونریزی‌دهنده در اقوام نسبی و همچنین مرگ در اثر بیماری‌های خونریزی‌دهنده بالاتر بود. عمرده ترین علائم بیماران خونریزی‌های مخاطی و اکیموز بود. یافته‌های آزمایشگاهی نشان‌دهنده تعداد و شکل طبیعی پلاکت‌ها، افزایش زمان سیلان و جواب طبیعی به ریستوسیتین بود. آزمایش جمع شدن لخته، فعالیت فاکتور ۳ پلاکتی، چسبندگی پلاکت‌ها و پاسخ با کلارن، آدنوزین دی‌فسفات و ترومیجن در غالب موارد کاهش نشان داد.

**نتایج:** با توجه به شیوع ازدواج‌های فامیلی در ایران تروموبوآستنی گلانزمن بیماری نادری محسوب نمی‌شود و در صورت فراهم شدن امکانات آزمایشگاهی کافی تشخیص سریع تر بیماران میسر خواهد بود.

**کلید واژه‌ها :** پلاکت - تروموبوآستنی گلانزمن - انبوه

### ■ مقدمه :

میزان فیبرینوژن  $\alpha$  گرانول‌ها به دونوع تقسیم می‌شد. در نوع اول (حاوی ۵ درصد  $GPIIb/IIIa$ ) تجمع لخته و فیبرینوژن  $\alpha$  گرانول وجود ندارد. در حالی که در نوع دوم (حاوی ۱۰ تا ۲۰ درصد  $GpIIb/IIIa$ ) تجمع لخته و فیبرینوژن  $\alpha$  گرانول به میزان ضعیف وجود دارد. در نوع دیگری موسوم به واریانت، تعداد  $GPIIb/IIIa$  بیشتر یا مساوی ۵۰ درصد میزان طبیعی و اختلال در  $GPIIb/IIIa$  بیشتر از جنبه کیفی است. (۴ و ۱۰)

آزمایشگاه تخصصی انعقاد در سازمان انتقال خون ایران از هنگام تأسیس تاکنون تنها مرجعی است که تشخیص آزمایشگاهی این بیماری را بر عهده دارد. لذا با استفاده از اطلاعات موجود در این آزمایشگاه مطالعه حاضر به منظور ارزیابی علائم بالینی و یافته‌های آزمایشگاهی بیماران تروموبوآستنی گلانزمن در ایران انجام شد.

### ■ مواد و روش‌ها :

در این مطالعه توصیفی پرونده ۳۴۲ بیمار مبتلا به تروموبوآستنی گلانزمن که در طول ۲۱ سال اخیر (از فروردین ۱۳۵۸ تا فروردین ۱۳۷۹) در ایران تشخیص داده شده بودند، بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز در پرسشنامه مربوطه ثبت شد. متغیرهای بررسی شده عبارت بودند از: سن و جنس بیمار، علائم بالینی، طول مدت ظهور علائم بالینی تا زمان تشخیص بیماری، توارث بیماری، سابقه بیماری‌های خون‌ریزی دهنده و رخداد مرگ ناشی از خون‌ریزی در خویشاوندان نسبی بیماران، سایر بیماری‌های

بیماری تروموبوآستنی گلانزمن از اختلال‌های ارشی عملکرد پلاکت‌ها محسوب می‌شود که در آن کمپلکس‌های گلیکوپروتئینی  $IIb$  و یا  $IIIa$  وجود ندارند یا دچار کاهش یا عملکرد غیرطبیعی هستند. پلاکت‌های بیماران مبتلا به این عارضه به دلیل فقدان جایگاه‌های پیوندشونده با فیبرینوژن، توانایی اتصال با فیبرینوژن را ندارند. اگرچه در گسترش‌های تهیه شده از خون بدون ماده ضد انعقاد، تعداد و ظاهر پلاکت‌ها طبیعی به نظر می‌رسد، اما برخلاف توده شدن پلاکتی - پلاکتی که مشخصه گسترش‌های خون طبیعی است، پلاکت‌ها به طور مشخص به جدا ماندن از یکدیگر تمایل دارند. (۸)

این بیماری به صورت اتوزومال مغلوب به ارث می‌رسد. قرابت نسبی در والدین اکثر افراد مبتلا وجود دارد و ژن‌های مربوط به  $GPIIb$  و  $GPIIIa$  هر دو بر روی بازوی بلند کروموزوم ۱۷ قرار دارند. (۹ و ۱۰) نشانه‌شناسی بالینی در اثر بروز نقاچی مانند حلق‌های اختصاصی و جهش‌های نقطه‌ای در رمزبندی  $DNA$  جهت گلیکوپروتئین‌های  $IIb$  و  $IIIa$  به صورت هوموزیگوس یا هتروزیگوس ناشی می‌شود. هتروزیگوت‌ها بدون علامت هستند و معمولاً آزمایش آنها اختلالی را نشان نمی‌دهد. البته تعداد کمپلکس‌های  $IIIa$  و  $IIb$  که در غشاء پلاکت‌های فعال شده سالم ۵۰۰۰۰ است، در افراد هتروزیگوت به نصف کاهش می‌یابد که همین تعداد برای بروز پاسخ طبیعی به عوامل انبوه‌ساز کافی است. (۱) قبل از شناسایی کاهش کمپلکس‌های  $IIIa$  و  $IIb$  در گلانزمن، بیماری بر حسب وجود یا عدم وجود تجمع لخته و همچنین

علائم بالینی در ۲۹۸ بیمار ذکر شده بود که شایع ترین علامت به صورت منوراژی (۸۰ درصد)، خونریزی از بینی و اکیموز هر کدام (۶۰ درصد) بود. خونریزی بعد از عمل جراحی بیشتر به دنبال عمل ختنه در پسران بود که در یک مورد بیمار تا یک سال بعد از ختنه خونریزی داشت (جدول شماره ۲).

جدول ۲ :

تظاهرات خونریزی در بیماران مورد مطالعه

درصد	تظاهرات خونریزی
۸۰	منوراژی
۶۰	خونریزی از بینی
۳۲	خونریزی از لثه
۶۰	اکیموز
۳۰	پورپورا
۱۵	پتشی
۱۷	خونریزی بعد از جراحی و ضربه
۳	خونریزی گوارشی
۱	هماتوری
۱	همارتروز

در این مطالعه بررسی ۱۳ خواهر و برادر مبتلا نشان داد که تنها در یک مورد بین علامت بالینی آنها هم خوانی وجود نداشت.

در این مطالعه حاملگی در بیماران به خوبی تحمل شد و تنها یک مورد خونریزی شدید به دنبال حاملگی وزایمان گزارش گردید.

اطلاعات به دست آمده از ۱۷۰ بیمار نشان داد که

خونریزی دهنده همراه، سابقه تزریق خون و پلاکت قبل از تشخیص بیماری، آزمایش های انجام شده برروی بیماران شامل شمارش تعداد پلاکت ها (به روش دستی و ماشینی)، بررسی مورفولوژی پلاکت ها، زمان سیلان، زمان انعقاد به روش IVY، جمع شدن لخته، بررسی فعالیت فاکتور ۳ پلاکتی، اندازه گیری میزان چسبندگی پلاکت ها به روش Bowie و چگونگی پاسخ به عوامل انبوه هساز (aggregation agents) شامل ریستوسیتین، کلارن، آدنوزین دی فسفات (ADP)، ترومیین، آدرنالین و اسید آراشیدونیک. (۹) آزمایش PTT و PT به طور انتخابی برای ۱۰۴ بیمار و اندازه گیری فاکتور ۱۳ برای ۳۵ بیمار انجام شده بود. آزمایش چسبندگی پلاکت ها به روش Bowie از سال ۱۷۵ از فهرست آزمایش های بیماران حذف شده بود.

### یافته ها :

تعداد کل بیماران تشخیص داده شده ۳۴۲ نفر بود. تعداد بیماران در پایان دهه اول مطالعه ۱۳۳ مورد بود که با رشدی معادل ۴۰ درصد به ۱۸۵ مورد در پایان دهه دوم رسید.

سن ۱۲۷ بیمار در زمان تشخیص ۵ سال یا کمتر و ۲۰۶ بیمار بیشتر از ۵ سال بود (جدول شماره ۱).

جدول ۱ :

توزیع فراوانی جنس و سن بیماران (۳۳۳ نفر)\* در زمان تشخیص

سن بیماران	مؤنث (درصد)	مذکور (درصد)	جمع (درصد)
۵ سال ≤	(۴۰) ۵۱	(۶۰) ۷۶	(۳۸) ۱۲۷
بالای ۵ سال	(۴۲) ۸۶	(۵۸) ۱۲۰	(۶۲) ۲۰۶

\* سن ۹ بیمار در پرونده ذکر نشده بود.

بیماری ۱۱ درصد

بالینی ، ۴۲ درصد

۱۰ سال و ۱۴ درجه در

علائم بالینی تشخ

بررسی سواب

خویشاوندی والد: آنها تا یک سال بعد، از بروز علامت First Cousin به بیماران تا ۵ سال بعد، ۳۳ درصد تا و دختر عمه، پسرصد بعد از گذشت ۱۰ سال از شروع خاله بوده است (یعنی داده شده بود).

والدین رابطه خوییق ۲۶ بیمار نشان داد که رابطه دوم). در ۱۰ درصد بن ۳۴ درصد بیماران به صورت نسبی بین والدین نبی پسر عموم و دختر عموم، پسر دایی ۶ درصد عمه و دختر دایی، پسر خاله و دختر خونریزی دهنده (سته اول). در ۵۶ درصد دیگر بین خونریزی را در خواهندی نسبی وجود داشت (دسته جدول شماره ۳) بد باقی مانده رابطه خویشاوندی جدول ۳: وجود نداشت (دسته سوم).

فراوانی بیماری بیماران دسته اول سابقه بیماری از خونریزی در ۱۲ درصد رخداد مرگ ناشی از

نسبی خویشاوندان نسبی گزارش داده بودند

علائم بیماری

سابقه خونریزی

مرگ ناشی از خو

فای خونریزی دهنده و مرگ ناشی

جمع

ر اقوام نسبی بیماران مورد مطالعه

در اطلاعات م

با این بیماری گزارش	بیلی والدین	دسته سوم (درصد)	دسته دوم (درصد)	دسته اول (درصد)
انعقاد در ۳۱۷ بیماران		۴۶	۳۶	۶۰
بیمار و همچنین بزرگی		۴	۷	۱۲
بود.		۱۰	۵۶	۳۴

وجود بیماری انعقادی دیگری همراه رش نشده بود. نتایج آزمایش زمان PTT و PT در ۱۰۴ ر، آزمایش های آزمایش فاکتور ۱۳ در ۵۳ بیمار طبیعی

گزارش های موجود ۴۴ مورد تزریق خون و پلاکت به بیماران را نشان داد که از این تعداد ۳۹ مورد برای کنترل خونریزی بالینی و بقیه موارد برای کنترل خونریزی ناشی از منوراژی، خونریزی مفصل و خونریزی گوارشی بوده است. در تعدادی نیز جهت کنترل خونریزی از فاکتورهای انعقادی استفاده شده بود.

اطلاعات به دست آمده از ۵۶ بیمار نشان داد بیشتر مراجعین به ترتیب از استان های خراسان (۹ نفر)، تهران (۸ نفر)، استان مرکزی (۷ نفر)، آذربایجان (۶ نفر)، اصفهان (۶ نفر)، خوزستان (۵ نفر)، سیستان و بلوچستان (۴ نفر)، مازندران (۲ نفر)، کرمان (۲ نفر)، کردستان (۲ نفر)، همدان، یزد، زنجان، کرمانشاه و گرگان (هر کدام یک نفر) بودند.

تعداد پلاکت های شمارش شده در ۳۱۲ بیمار نشان داد که به استثنای ۲ مورد کاهش و ۸ مورد افزایش مختصر، در سایر موارد تعداد پلاکت ها طبیعی بوده است.

گسترش خون محیطی در ۱۰ مورد نشان دهنده پلاکت های غول آسا بود (تعداد این پلاکت ها به طور متوسط ۱۵ درصد گزارش شده بود).

زمان سیلان طولانی به عنوان یک یافته ثابت در ۳۳۹ بیمار گزارش شد و تنها در یک بیمار ۳/۵ ساله زمان سیلان ۶ دقیقه گزارش گردید. آزمایش انجام شده بر روی ۳۱۷ بیمار نشان دهنده طبیعی بودن زمان انعقاد در بیماران مورد مطالعه بود.

آزمایش جمع شدن لخته بر روی ۲۹۷ بیمار، در ۹۱ درصد از بیماران کاهش داشت و در ۹ درصد طبیعی بود. بررسی فعالیت فاکتور ۳ پلاکتی در ۲۲۰ بیمار، در

زیاد است شیوع گلترمن حتی می تواند در حد بیماری هموفیلی باشد.<sup>(۲)</sup>

سن تشخیص بیماری در غرب در اکثر موارد زیر ۵ سالگی است،<sup>(۷)</sup> حال آن که تنها ۴۰ درصد بیماران این مطالعه قبل از ۵ سالگی تشخیص داده شده بودند. این امر می تواند ناشی از محدود بودن امکانات تشخیصی باشد.

در این اعماق لغزش بیماران مذر ۶۷ درصد بیسراز بیماران مؤثر بود. در مطالعه انجام شده بر روی ۱۷۷ بیمار در غرب، تعداد زنان ۵۸ درصد گزارش شد این افزایش جزئی ممکن است به دلیل منوراژی باشد.<sup>(۶)</sup> با این حال بالا بودن آمار بیماران مذکور در ایران ممکن است به علت توجه بیشتر خانواده ها به فرزند مذکور و همچنین امکان دستیابی بیشتر بیماران مذکور به مراکز درمانی و تشخیصی باشد.

عمده ترین علائم بالینی بیماران در این مطالعه خونریزی های مخاطی و اکیموز بود که طبق گزارش ها این علائم با افزایش سن کاهش می یافتد. علت این امر می تواند کاهش رخداد وضعیت هایی مانند خونریزی از بینی همراه با افزایش سن باشد.<sup>(۱)</sup> در این بررسی درصد کمی از بیماران (۱۱ درصد) قبل از یک سال از بروز علائم بیماری تشخیص داده شده بودند و در اکثر موارد (۸۹ درصد) این زمان تا ۱۰ سال یا بیشتر به تعویق افتاده بود. بدیهی است که محدودیت های موجود در امر تشخیص بیماران علت عمده این تأخیر است.

این مطالعه نشان داد که در ۹۰ درصد موارد بین والدین بیماران خویشاوندی نسبی وجود داشت و مرگ ناشی از خونریزی در وابستگان بیماران این گروه نیز

۷۰ درصد موارد کاهش داشت و در ۳۰ درصد طبیعی بود. آزمایش انجام شده بر روی ۱۹۳ بیمار نشان دهنده کاهش میزان چسبندگی پلاکت ها در تمام بیماران بود. فاکتور XIII در ۳۵ مورد به طور انتخابی بررسی شده بود که در همه موارد طبیعی بود. واکنش تمامی ۳۴۲ بیمار با ریستوسیتین طبیعی بود. واکنش ۸۴ درصد کل بیماران با کلائز منفی بود و ۱۶ درصد باقی مانده به

طور ضعیف با کلائز واکنش نشان داده بودند. واکنش ۹۵ درصد کل بیماران با آدنوزین دی فسفات منفی بود و ۵ درصد باقی مانده به طور ضعیف واکنش نشان داده بودند. از مجموع ۲۸۲ بیمار، ۹۴ درصد با ترومیلن واکنش منفی، ۵ درصد واکنش ضعیف و ۱ درصد واکنش طبیعی داشتند. از مجموع ۲۷۶ بیمار، ۹۹ درصد با آدرنالین واکنش منفی و ۱ درصد واکنش ضعیف داشتند. از مجموع ۱۵۰ بیمار، ۹۹ درصد با اسید آراشیدونیک واکنش منفی و ۱ درصد واکنش ضعیف داشتند.

## بحث و نتیجه گیری:

در دهه اول مطالعه، آمار بیماران تشخیص داده شده سالانه به طور متوسط ۱۳ نفر و در دهه دوم سالانه ۱۸ نفر گزارش شد. رشد ۴۰ درصدی تعداد بیماران در دهه دوم مطالعه می تواند از رشد جمعیت در ۱۰ سال اخیر و همچنین افزایش تعداد متخصصین و امکانات تشخیصی دقیق تر در سطح کشور ناشی شده باشد. بیماری گلترمن در کشورهایی که ازدواج های فامیلی در آن کم است بیماری نادری محسوب می شود، برای مثال در ایالات متحده در سال ۱۹۹۰ تنها ۱۲ بیمار شناسایی شدند. بر عکس در مناطقی که این ازدواج ها

عرaci الاصl به عمل آمده است. البته به نظر می‌رسد این روش بیشتر نشان‌دهنده اشکالات کیفی کملکس‌های *IIb/IIIa* باشد تا اشکالات کمی

بیشتر از افرادی بود که والدین آنها خویشاوندی نسبی نداشتند. با این حال آمار بیماری‌های خون‌ریزی دهنده *IIIb* و *IIIa* بسته سوم بیشتر از بیماران آن. (۱۱)

در تشخیص افتراقی این بیماری باید به ترموبیوآستنی گلانزمن کاذب توجه داشت. در بیماران مبتلا به پورپورای ترموبیوستوتینیک اتوایمیون، به علت ظهور آنتی‌بادی‌های علیه گلیکوپروتئین‌های *IIb* و *IIIa*، عوارضی شبیه ترموبیوآستنی گلانزمن ایجاد می‌شود. با این حال وجود این آنتی‌بادی‌ها امری غیرمعمول است و نتایج حاصل از پامچ به عوامل انبوه‌ساز ناشی از پیدایش این آنتی‌بادی‌هاست. (۵) از دیگر تشخیص‌های افتراقی می‌توان به میلوم متعدد و فقدان مادرزادی فیبرینوزن اشاره کرد. (۱)

دوم بود که این امر می‌تواند زمینه مساعدی را برای انتقال بیماری به صورت اتوزومال مغلوب در اهاران دسته سوم فراهم مسازد. اطلاعات به دست آمده از محل مراجعة بیماران محدود بود. با این حال نتایج نشان داد که مراجعته کنندگان مربوط به استان‌های نزدیک و جمیعت بیشتر از مراجعنین استان‌های دور و کم معیت بودند.

یافته‌های آزمایشگاهی نشان داد که افزایش زمان للان، طبیعی بودن تعداد پلاکت‌ها و جواب طبیعی به تستوستوئین از یافته‌های ثابت جهت تشخیص این

متاسب پیش‌آگهی خوب است و بیماران به تدریج در اثر خون‌ریزی می‌میرند.

#### ■ سپاسگزاری:

از همکاری آقای محمد جاذبی و خانم طاهره شعشاعانی سپاسگزاری می‌نمایم.

#### ■ مراجع:

1. Bennett JS. Inherited disorders of platelet function. In : Hoffman R , Benz EJ , Shattil SJ , Furie B , Cohen HJ , Silberstein LE , eds. Hematology basic principles and practice. 2nd ed... ILK , Churchill Livingstone 1995 , 1913-6

برای بیماران یهودی

در دسته براحتی بیماری مبتلا شدن می‌زند. پلاکتی یک روش وابسته بیماری به طور عمده کاهی یکی از علل بالابودن نیست. در این مطالعه می‌تواند باشد. در این بررسی در به عوامل انبوه‌سازی هفتمانی که مبتلا شده باشد. این امر ایجاد فسفات و ترموبیوآستنی ضعیف امروزه با استفاده از شده جهت تشخیص این آنتی‌بادی‌های تک دگلیکوپروتئینی *a* و *IIb* برآورد مقدار واقعی این میسر شده است. (۱۱) همچنین آنتی‌بادی‌ها تشخیص قبل از تولد

2. Cohn RJ , Sherman GG , Glencross DK. Flowcytometric analysis of platelet surface glycoproteins in the diagnosis of Bernard-Soulier Syndrom. *Pediatr Hematol Oncol* 1997 ; 14 : 43-50 (abstr)
3. Coller BS. Glycoprotein abnormalities. In: Bloom AL , eds. *Haemostasis and thrombosis*. 3rd ed , UK , Churchill Livingstone 1994 , vol 2 , 723-39
4. Dunlop LC , Andrews RK , Lopez JA , Bendt MC. Glanzmans' thrombasthenia. In: Loscalzo J , Schafer AI , eds. *Thrombosis and hemorrhage*. 2nd ed , USA , Williams & Wikkins , 1998 , 695-701
5. Granel B , Swiader L , Veit V et al. Pseudo glanzmann thrombastenia in the course of autoimmune thrombocytopenic purpura. *Rev Med Interne* 1998 ; 19 : 823-5 (abstr)
6. Jorge JN , Nurden AT. Inherited disorders of the platelet membrane. In : Colman RW , Hirsh J , Marder VJ , Salzman EW , eds. *Hemostasis and Thrombosis*. 3rd ed , USA , Lippincott Company , 1994 , 652-63
7. Levin SP. Defect in platelet aggregation. In : Wintrobe MM , eds. *Wintrobe's clinical hematology*. 10th ed , USA , Williams & Wilkins , 1999 , Vol 2 , 1663-6
8. Miller JL. Inherited disorders of platelet function. In : Henry JB , *Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods*. 19th ed , USA , WB Saunders , 1996 , 710-1
9. Pitney WR , Brozovic M. Investigation of platelet function. In : Dacie JV , Lewis SM , eds. *Practical Haematology*. 6th ed , UK , Churchill Livingstone , 1984 , 248-54
10. Ratnoff OD , Forbes CD. Disorders of hemostasis. 3rd ed , USA , Saunders , 1996 , 127-8
11. Tuddenham EGD , Cooper DN. The molecular genetics of haemostasis in inherited disorders. USA , Oxford University Press , 1994 , 418-20