

# بررسی موارد Case Reports

## گزارش دو مورد سل پستان

دکتر محسن سکوتی\*      دکتر وحید منتظری\*\*      دکتر منیره حلیمی\*

### Report of two cases of breast tuberculosis

M.Sokouti      V.Montazeri      M.Halimi      M.Sadique

#### Abstract

Though tuberculosis is frequently seen in the world , breast tuberculosis is still a rare disease. It may present as a breast lump with or without ulceration or discharge. Most cases are reported from endemic areas like India , Bangladesh and South Africa. Tuberculosis is also prevalent in Iran and sporadic cases of breast tuberculosis have been reported. Breast tuberculosis should always be considered in differential diagnosis of breast lumps , ulcers or sinuses. To confirm the diagnosis FNA , culture from secretions and biopsy should be performed. Satisfactory results have been obtained after simple surgical resection and antituberculous therapy.

**Keywords :** Tuberculosis , Breast mass

#### چکیده :

علی رغم فراوانی بیماری سل در جهان ، سل پستان هنوز بیماری نادری است که به طور عمده با تظاهراتی شبیه توده یا زخم و ترشح پستان خود را نشان می دهد. بیشتر موارد سل پستان از مناطق آندمیک مانند هندوستان ، بنگلادش و آفریقای جنوبی گزارش شده اند. در کشور ما نیز با وجود شیوع نسبی سل ، موارد سل پستان به صورت پراکنده گزارش شده است. لذا در برخورد با بیماران مبتلا به توده ، زخم و سینوس پستان باید به فکر این بیماری نیز بود و از روش های تشخیصی مانند آسپیراسیون سوزنی ، کشت و نمونه برداری ترشحات برای جستجوی باسیل سل و بیوپسی استفاده کرد. نتایج رضایت بخشی پس از خارج نمودن توده با عمل جراحی و تجویز درمان ضد سل حاصل شده است.

**کلید واژه ها :** سل ، توده پستان


\* استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

\*\* دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

\*\*\* استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

## ۵ مقدمه :

گزارش شد. بیوپسی از توده و جدار زخمی روی آن انجام شد و گزارش پاتولوژی وجود سل پستان را تایید نمود و درمان ضد سل شروع شد. در پی گیری یک ساله بیمار، زخم و توده پستانی بهبود یافته بود و مشکل دیگری مشاهده نشد. (شکل ۱)



شکل ۱- زخم و فیستول پستان چپ

خانم ۲۶ ساله ای لاغر، کاشکتیک و آنمیک با توده ای به ابعاد  $10 \times 6 \times 7$  در پستان چپ و دو گره لنفی قابل لمس در زیر بغل همان سمت در مرداد ماه ۱۳۸۰ به درمانگاه دانشگاه مراجعه نمود. در معاینه بالینی توده غیر حساس و بدون درد بود. رادیوگرافی سینه طبیعی و ESR بیمار ۳۸ میلی متر گزارش شد. بیمار با تشخیص اولیه تومور پستان تحت عمل رزکسیون جراحی توده قرار گرفت و پاسخ پاتولوژی سل پستان گزارش شد. بیمار با داروهای ضد سل درمان شد و در پی گیری یک ساله بیمار مشکلی دیده نشد. شکل ۲ مربوط به آسیب شناسی این بیمار است.


سل پستان اولین بار در سال ۱۸۲۹ توسط کوپر گزارش شد.<sup>(۱)</sup> از آن هنگام تاکنون در حدود ۷۰۰ مورد سل پستان از سراسر جهان گزارش شده که به طور عمده از نواحی آندمیک به ویژه هندوستان، آفریقای جنوبی و بنگلادش بوده است.<sup>(۲)</sup> با وجود شیوع سل، موارد سل پستان به تدریت دیده می شود، برای مثال در بررسی ۶۰۰۰ مورد سل طی ده سال در دانشگاه دالاس فقط یک مورد سل پستان دیده شد.<sup>(۳)</sup> بنا بر این به نظر می رسد بافت پستان نسبت به سل مقاومت خاصی دارد.<sup>(۴)</sup> در این مقاله دو مورد سل پستان در بیمارستان امام خمینی تبریز طی ۵ سال گذشته گزارش می شود که یک مورد به صورت زخم پستان با ترشح چركی و دیگری با توده پستانی مراجعه کرده بود. لذا در مواردی که بیمار با توده پستانی، زخم و ترشح پستان مراجعه می نماید، باید به این بیماری نیز توجه داشت.

## ۶ معرفی بیماران :

خانم میع ۳۸ ساله اهل نجفگران (جمهوری آذربایجان) به تاریخ دی ماه ۱۳۸۰ با زخم و توده پستان چپ، سلولیت پای چپ و زخم دهان (لثه های پیشین) به درمانگاه دانشگاه مراجعه کرد و با تشخیص افتراقی اولیه سرطان پستان، آیدز یا سل بستری شد و تحت بررسی قرار گرفت. تست مانتو و HIV منفی گزارش شد. در سونوگرافی، توده هیپوآکوئیک به ابعاد  $71 \times 23$  با حدود نامشخص و افزایش ضخامت پوست در قسمت فوقانی خارجی پستان چپ مشاهده شد. رادیوگرافی سینه سالم بود و سونوگرافی کبد، کیسه صakra و طحال نیز ضایعه ای نشان نداد. میزان ESR در ساعت اول ۴۸ و در ساعت دوم ۷۰ میلی متر، و CBC بیمار طبیعی

ترشح نوک پستان، زخم یا سینوس های پوستی تظاهر کند. بنابراین بیماری های دیگری مثل آکتینومیکوز و آبse های پیوژنیک نیز علاوه بر سرطان در تشخیص های افتراقی آن مطرح می شوند.<sup>(۱۵) و (۱۶)</sup> وجود بیماری سل فعال همزممان با سل پستانی در گزارش های دیگر از ۲۵ تا ۸۴ درصد متغیر بوده است، ولی به طور تقریبی در تمام موارد بیماران نشانه هایی از یک عفونت سلی قبلی داشته اند. در برخی موارد نیز این بیماری با غدد لنفاوی بزرگ شده در گردن یا زیر بغل همراه است.<sup>(۱۶) و (۱۷)</sup> در موارد نادری ممکن است آبse در ناحیه پشت پستان به دنبال گسترش آمپیم سلی از ریه و جنب فضای پشت پستان ایجاد شده باشد.<sup>(۱۸) و (۱۹)</sup>

مواردی از سل پستان نیز در زنان حامله و شیرده گزارش شده است، ولی به نظر نمی رسد شیوع آن در این گونه موارد بیش تراز افراد دیگر باشد.<sup>(۲۰)</sup> مهم ترین روش تشخیص بیماری، بررسی هیستولوژی است و گاهی لازم است برای تأیید تشخیص از نمونه های متعدد استفاده شود.<sup>(۲۱)</sup> وجود سینوس دلیل قطعی این بیماری نیست و چون سینوس ها در سیر طبیعی بیماری دیر تشکیل می شوند، در تشخیص زوردرس آن کمک نمی کنند. یافته های ماموگرافی خاصی نیز وجود ندارد که دال بر این تشخیص باشد. کشت، نمونه برای AFB و آسپيراسیون سوزنی نیز در تعداد محدودی از بیماران به تشخیص کمک می کند.<sup>(۲۲)</sup> به هر حال در بیماران دچار توده پستان به خصوص مواردی که با زخم، سینوس یا عود آبse تظاهر می کنند باید به فکر این بیماری بود و با انجام نمونه برداری از جدار زخم و آبse وجود یا عدم وجود آن را اثبات نمود.<sup>(۲۳)</sup> رژیم های دارویی ضد سل در درمان این بیماری موفق بوده اند. در



شکل ۲- گرانولوم با درشتنمایی (۴۰۰×) سلول های اپیتلیوئیدی با سلول های لنفوسيت در اطراف. در مرکز گرانولوم Giant cell Tip لانگرهانس با فلاش نشان داده شده است.

## ۵ بحث و نتیجه گیری :

سل همچنان یکی از شایع ترین بیماری های انسان است و تخمین زده می شود که در جهان بین یک تا دو میلیارد نفر به این بیماری آلوده اند. علی رغم این شیوع، میزان گرفتاری پستان به سل همچنان نادر است.<sup>(۲۴)</sup>

این بیماری در کشورهای پیشرفته کمتر گزارش شده است و به نظر می رسد پستان نیز مانند عضله های مخططها و طحال تا حد زیادی به این بیماری مقاوم باشد. این بیماری به طور عمده در زنان و در سنین ۲۰ تا ۴۰ سالگی دیده می شود و به طور معمول یک طرفه است. در آقایان و نیز در خانم ها قبل از سنین بلوغ نادر است. اخیراً مواردی از آن نیز در بیماران مبتلا به ایدز مشاهده و گزارش شده است.<sup>(۲۵) و (۲۶)</sup>

در اغلب موارد این بیماری خود را با توده پستانی نشان می دهد که از نظر بالینی با سرطان پستان قابل افتراق است.<sup>(۲۷)</sup> در مواردی نیز ممکن است با آبse،

- 9.Hartstein M, Leaf HL. Tuberculosis of the breast as a presenting manifestation of AIDS. Clinical Infectious Disease 1992; 15: 692-3
- 10.Hughes LE,Muusel RE, Webster DJT. Benign disorders and disease of the breast, Concept & clinical management. 2nd ed, W B Saunders, 2000, 193-4
- 11.Kakkar S, Kapila K, Singh MK. Tuberculosis of the breast , A cytomorphic study. Acta Cytology 2000; 44(3): 292-6
- 12.Mendes W, Da S, Levi M, Levi GC. Breast tuberculosis ; Case report and literature review. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 1996; 51(4): 186-7
- 13.Pop M, Saherie T, Fabian A, Man M. Breast tuberculosis. Pulmenologia 1999; 48(4): 313-5
- 14.Reys CV, Thomson KS. Fine needle aspiration biopsy of mastitis secondary to empyema necessitans. Acta Cytology 1999; 43(5): 873-6
- 15.Shirazi AS. Isolated tuberculosis of the breast. Med J Iran Hosp 1999; 2: 55-6
- 16.Treshin V, Oksachenko OG, Fursa NI, Larkia VS, Lukashina VA. A case of breast tuberculosis in patients with disseminated pulmonary tuberculosis. Problem tuberculosis 1999; (1): 55-6
- 17.Wilson JP, Chapman SV. Tuberculous mastitis. Chest 1990; 98: 1505-9
- 18.Wong Chen FJ, Robledo GD, Barreto RO, Guzman PC. Breast tuberculosis (a case report and review of the literature). Gyneco Obstet Mex 1997; 65: 92-5

مواردی از بیماری گستردگی پستانی نیز اقدام های جراحی به صورت برداشتن توده و حتی ماستکتومی به کار رفته است ، اما به نظر می رسد درمان دارویی نقش مهم تری در درمان این بیماری داشته باشد. (۱۸۰ و ۲۰۹ و ۲۱۰)

#### مراجع :

- 1.Abboud P,Banchei F,Bajulet Laudinat O,Beginot I,Wahl P,Quereux C,Breast Tuberculosis; A case of diffuse inflammatory form.J Gynecol Obes Biolo Paris 1997; 26(8): 822-4
- 2.Algaratnam TT, Ong GB. Tuberculosis of the Breast. Br J Surg 1980; 67:125-6
- 3.Apps MCP,Harrison NK,Blaut CIA. Tuberculosis of the Breast. Br Med J 1984; 228: 1874-5
- 4.Chaïsson RE,Schechter GF,Theuer CP,Rutherford GW,Echenberg D F, Hopewell PC.Tuberculosis in patient with acquired immunodeficiency syndrome. Am Rev Resp Dis 1987;136:570-4
- 5.Domingo CH,Ruiz J,Texico A,Aguilar X,Morera J,Tuberculosis of the breast: a rare modern disease. Tuberle 1990;71:221-3
- 6.Gach O, Corhey JL, Lousberg L, Bartch P. Breast abcess and pregnancy toxemia revealing multidrug resistant tuberculosis. Rev Mal Resp 1999 Nov;16(5): 842-5
- 7.Goyal M, Sharma A, Sharma R, Chumber S, Sawhney S, Berry M. Chest wall tuberculosis simulating breast carcinoma. Australia Radiology 1998; 42(1): 86-7
- 8.Hale JA, Peters JN, Cheek JH. Tuberculosis of the breast : rare but still extant. Am J Surg 1985; 150: 620-4