

## اثر ضد انعقاد گیاه مرزه در رت

افشین نظری\* دکتر بهرام دلفان\*\* دکتر یعقوب شیرخانی\*\*\* علی اصغر کیانی\*\*\*\*

### Effect of Satureja Khuzestanica on blood coagulation activity in rats

A.Nazari† B.Delfan Y.Shirkhani AA.Kiyani

#### \*Abstract

**Background:** Satureja Khuzestanica is an endemic plant of Iran widely distributed in the southern part of the country. This plant is famous for its medical applications as an analgesic and antiseptic in folk medicine.

**Objective:** To investigate the effect of oral administration of aqueous extract of Satureja Khuzestanica on hemostasis and body weight *in vivo*.

**Methods:** This research was an experimental study carried out in Lorestan Medicinal Herbs Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khoram-abad, Iran. Thirty six rats were randomly divided into 3 groups. An equivalent of 50 mg of aqueous extract of Satureja Khuzestanica/kg was orally administered. For two weeks the rats in group 1 and 2 received an equal amount of extract once and three times a day, respectively. Control group received only pure water. Animals' weights were measured every day. Following two weeks, prothrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (APTT) were determined. Data were analyzed using One-way analysis of variance (ANOVA) followed by the Tukey multiple comparison tests.

**Findings:** As compared to control, the administration of aqueous extract of Satureja Khuzestanica as 3 separate dose/day resulted in a significant prolongation of APTT by 20.7% ( $p<0.001$ ), PT by 15.7% ( $p<0.05$ ) and a reduction of body weight by % 9.24 ( $p<0.001$ ) after 2 weeks.

**Conclusion:** Regarding our data, it seems that the aqueous extract of Satureja Khuzestanica induced some changes in coagulation activity shown by increased values for APTT and PT. Loss of body weight in rats was also observed when the extract administered three times a day.

**Keywords:** Medical Plants, Anticoagulants, Mice

#### \*چکیده

**زمینه:** مرزه از گیاهان بومی ایران است که به طور وسیعی در قسمت جنوبی کشور به خصوص استان لرستان و خوزستان می‌روید و در طب سنتی به اثر ضد درد و ضد عفونت آن اشاره شده است.

**هدف:** مطالعه به منظور تعیین اثرات ضد انعقاد گیاه مرزه در رت انجام شد.

**مواد و روش‌ها:** این مطالعه تجربی در سال ۱۳۸۲ در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد که طی آن ۳۶ رت به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. مقدار ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم مرزه که قبل از طریق بررسی مقدماتی تعیین دوز شده بود، از راه خوارکی به ترتیب در گروه اول یک بار در روز، در گروه دوم سه بار در روز به مدت ۲ هفته به موش‌ها داده شد و در گروه شاهد هیچ گونه گیاهی مصرف نشد. وزن موش‌ها به طور روزانه و زمان پروتومبین (PT)، زمان پارشیال پروتومبین فعال شده (APTT) و وزن موش‌ها در پایان دو هفته اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری ANOVA یک طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شدند.

**یافته‌ها:** در گروهی که روزانه ۳ بار گیاه مصرف کرده بودند افزایش معنی دار  $15/7\%$  ( $p<0/05$ ) و  $20/7\%$  ( $p<0/01$ ) در APTT نسبت به گروه شاهده شد. وزن گروه آزمون نسبت به گروه شاهد  $9/24\%$  کاهش نشان داد ( $p<0/001$ ).

**نتیجه‌گیری:** مصرف ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم مرزه ۳ بار در روز باعث ایجاد تغییر در فعالیت انعقادی (افزایش PT و APTT) و کاهش وزن بدن رت‌ها می‌شود.

**کلیدواژه‌ها:** گیاهان شفابخش، ضدانعقادها، موش‌ها

\* کارشناس ارشد فنی‌بولوژی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

\*\* استادیار مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

\*\*\* دکتری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

\*\*\*\* کارشناس ارشد همتاولوژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

آدرس مکاتبه: خرم‌آباد، انتهای خیابان رازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، معاونت آموزشی-پژوهشی، تلفن ۳۲۰۵۰۱۵

†Email: nazary257@yahoo.com

Page (15)

### \* مقدمه :

مراتع و جنگل داری کشور در تهران تعیین هویت و به شماره ۵۸۴۱۶ در هر باریوم آن مرکز ثبت شد. پودر خشک شده برگ گیاه مرزه به میزان ۵/۰ گرم در ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل و به مدت ۲ ساعت در حمام بن ماری ۱۰۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد. پس از صاف شدن در شیشه های استریل دردار منتقل و نگهداری شد.

در این تحقیق ۳۶ رت نر سفید گونه ویستار (تهیه شده از انستیتو پاستور ایران) با محدوده وزنی ۱/۳۱۰-۰/۲۱۷/۸ گرم در قفسه های استاندارد نگهداری شدند به طوری که دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند. درجه حرارت اتاق حدود  $23 \pm 3$  درجه سانتی گراد حفظ شد. گروه آزمون شامل ۲۴ رت بود که دم کرده مرزه را دریافت می کردند و گروه شاهد که شامل ۱۲ رت بود به جای دم کرده گیاه مرزه، آب مقطر دریافت می کردند. گروه آزمون به دو زیر گروه (هر گروه ۱۲ رت) تقسیم شدند که گروه اول ۵۰ میلی گرم بر کیلو گرم دم کرده مرزه را روزی یک بار و گروه دوم همین مقدار دم کرده مرزه را روزانه ۳ بار دریافت می کردند.

لازم به ذکر است که دوز به کار رفته از طریق آزمایش های مقدماتی تعیین شده بود.


بعد از اتمام ۱۵ روزه، حیوان ها با ۱۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم کتابخانه هیدرو کلرید (Alfasan Woerden Holland) از راه داخل صفاقی (Rotex Medica Germany) بی هوش شدند. سپس عمل خون گیری از قلب حیوان انجام و خون گرفته شده با حجم های ۰/۹ سی سی خون با ۱/۰ سی سی سیترات سدیم (۳/۵ درصد) مخلوط و به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه جهت به دست آوردن پلاسما با دور ۲۰۰۰ بار در دقیقه، سانتریفیوژ (5810R - eppendorf) ساخت آلمان) شد. برای اندازه گیری زمان پروترومبین (PT) مطابق روش Quick از ترومبوپلاستین لیوفیلیزه

رونده انعقاد از دو راه با دو مکانیسم متفاوت شروع می شود. یکی مسیر داخلی یا راه تماسی که در آن فقط عوامل انعقادی (مسیر داخلی ۱۲، ۱۱، ۸، ۹ و ۱۰، ۲، ۵ و ۱) و یک سطح فعال انعقادی مشترک (مسیر خارجی یا عامل نسبی) لازم است و دیگری مسیر خارجی یا عامل نسبی که علاوه بر عوامل انعقادی (۷ و مسیر مشترک) به مواد مشتق از نسج نیاز است تا با ترکیب یکدیگر انعقاد را شروع نمایند.<sup>(۱)</sup> داروهای مختلف مصنوعی و شیمیایی و گیاهی وجود دارند که در فرآیندهای انعقادی (مسیر داخلی، خارجی و پلاکتی) مؤثرند. از جمله این گیاهان، مرزه (Satureja Khuzestanica) است که به طور وسیعی در قسمت جنوبی کشور به خصوص استان لرستان و خوزستان می روید.<sup>(۲)</sup> گونه ساتوریا متعلق به خانواده Lamiace و زیر مجموعه Neptodeae و از گروه Mentha است. مطالعه هایی که درباره گونه های مختلف ساتوریا در خاورمیانه انجام شده به کارواکرول و فلاونوئیدها به عنوان ترکیب های مهم و عمدۀ مرزه اشاره می کند.<sup>(۳)</sup> در مطالعه ای درباره اثر این گیاه روی دیسمونره، مشاهده شد که علاوه بر اثرات اسپاسمولیتیک، ضد درد و ضد التهاب، باعث افزایش خون ریزی در بیماران می شود.<sup>(۴)</sup> لذا این مطالعه با هدف تعیین اثر مرزه بر روند انعقاد با توجه به زمان پروترومبین و APTT انجام شد.

### \* مواد و روش ها :

این مطالعه تجربی در سال ۱۳۸۲ در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. جمع آوری سربرگ گیاه مرزه و خشک نمودن آن توسط شرکت خرمان واقع در شهرک صنعتی خرم آباد لرستان صورت گرفت. این گیاه توسط مرکز تحقیقات گیاهان دارویی سازمان

**نمودار ۲- مقایسه تغییرات وزن در رت‌های دریافت‌کننده مرزه (۳ بار به میزان ۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم)**



**\* بحث و نتیجه‌گیری :**

مطالعه حاضر نشان داد که مصرف ۱۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم مرزه دارای تأثیرات ضد انعقادی از طریق افزایش PT و APTT و کاهش دهنده وزن است. علاوه بر تأثیرات ذکر شده، این گیاه دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی، ضد دیابتی و کاهش دهنده تری‌گلیسریدها است.<sup>(۸)</sup> افزایش PT می‌تواند در نتیجه کاهش در هر یک از عوامل درگیر در مسیرهای خارجی یا مسیر مشترک انعقاد خون یا وجود مهارکننده‌های هر کدام از این عوامل باشد.<sup>(۹)</sup> ارتباط مستقیمی بین عامل ۷ انعقادی و چربی‌های خون به خصوص در سطح تری‌گلیسریدها وجود دارد.<sup>(۱۰)</sup> عصاره روغنی مرزه می‌تواند سطح تری‌گلیسرید را در رت‌های مبتلا به دیابت و افزایش چربی خون کاهش دهد.<sup>(۱۱)</sup> این احتمال وجود دارد که کاهش سطح تری‌گلیسرید، باعث کاهش عامل انعقادی ۷ شود و از این طریق دم کرده مرزه می‌تواند باعث افزایش PT شود.


در این مطالعه مصرف مرزه باعث افزایش معنی‌دار APTT شد. آزمایش APTT آزمایشی حساس برای برسی عوامل ۷، ۱۱، ۹، ۱۲ و عوامل مسیر مشترک انعقادی شامل عوامل ۱۰، ۱۱، ۱۲ است.<sup>(۱۲)</sup> در این آزمایش افزایش APTT می‌تواند در نتیجه تأثیر دم کرده این گیاه روی مسیر داخلی و مسیر مشترک

شده از مغز خرگوش همراه کلسیم استفاده شد.<sup>(۶)</sup> اندازه‌گیری زمان پارشیال ترومبوپلاستین (APTT) مطابق روش Bell با استفاده از محلول ترومبوسیل فعال شده و کلرید کلسیم ۰/۰۲۵ مول بر لیتر انجام شد.<sup>(۷)</sup> نتایج حاصله به صورت میانگین و خطای استاندارد، همراه با ذکر تعداد موش‌های مورد بررسی در هر آزمایش ارائه شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری ANOVA یک‌طرفه و توکی با یکدیگر مقایسه و p کمتر از ۰/۰۵ معنی‌دار در نظر گرفته شد.

**\* یافته‌ها :**

میانگین PT در گروهی که روزانه ۳ بار مرزه مصرف می‌کردند  $15/64 \pm 1/95$  ثانیه بود که افزایش معنی‌داری به میزان  $15/7$  درصد در مقایسه با گروه شاهد نشان داد ( $p < 0/05$ ). همچنین میانگین APTT در این گروه  $23 \pm 3/5$  ثانیه بود که افزایش معنی‌داری به میزان  $20/7$  درصد در مقایسه با گروه شاهد نشان داد ( $p < 0/001$ ). (نمودار شماره ۱).

**نمودار ۱- مقایسه زمان پروتوبومبین و زمان پارشیال ترومبوپلاستین فعال شده در گروه‌های مورد مطالعه**



$$p < 0/05 **$$

صرف مرزه به مدت ۲ هفته باعث کاهش معنی‌دار وزن به میزان  $9/24$  درصد در گروه دوم ( $251/19 \pm 25/25$  گرم) در مقایسه با گروه شاهد ( $274/89 \pm 29/7$  گرم) شد ( $p < 0/001$ ). (نمودار شماره ۲).

- Lorestan University of Medical Science and health service, Iran, 1998
6. Horsti J. Has the Quick or Owren prothrombin time method the advantage in harmonization for the international normalized ratio system?. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2002 Oct; 13(7): 641-6
  7. Martin BA, Branch DW, Rodgers GM. Sensitivity of activated partial thromboplastin time, the dilute Russell's viper venom time, and the kaolin clotting time for the detection of lupus anticoagulant a direct comparison using plasma dilutions. *Blood Coagul Fibrinolysis* 1996 Jun; 7(1): 31-8
  8. Abdollahi M, Salehnia A, Mortazavi S, Ebrahimi M, Shafiee A, Fouladian F, Keshavarz Sorouri S, Khorasani R, Kazemi A. Antioxidant, anti diabetic, antihyperlipidemic, reproduction stimulatory properties and safety of essential oil of Satureja Khuzestanica in rat in vivo: a toxico pharmacological study. *Med Sci Monit* 2003; 9(9): 331-5
  9. De gruchy GC. Clinical and haematology in medical practice. Black Well Scientific Publications, UK, 1983, 695
  10. Zhao Y, Liu B, Bai H. Screening of hypercoagulability related gebes in aorta of hypertriglyceridemic rats. *Sichuan Danxue Xue Bao Yixue Ban* 2003 Jul; 34 (3): 401-4
  11. Chadarevian R, Bruckert E ,Dejager S,Presberg P, Turping G. Relationship between triglyceride and factor VII c and plasminogen activator, inhibitor type-1: lack of threshold value. *Thromb Res* 1999 Nov 1; 96 (3): 175-82
  12. Furie B, Furie BC. Molecular and cellular biology of blood coagulation. *New Engl J Med* 1992; 326, 800-6

انعقادی باشد. چون میزان افزایش APTT بیشتر از PT بود این طور به نظر می‌رسد که دمکرده این گیاه بیشترین اثر را روی مسیر داخلی نسبت به مسیر مشترک و خارجی انعقاد خون داشته باشد. تجویز خوارکی دمکرده مرزه باعث کاهش قابل توجه وزن موش‌ها شد. اسانس روغنی این گیاه توانسته باعث کاهش گلوكز و سطح تری‌گلیسریدهای خون شود و نیز دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی است.<sup>(۸)</sup> کاهش وزن در این مطالعه می‌تواند در نتیجه تأثیر دم کرده این گیاه بر چربی‌ها، کربوهیدرات‌ها یا پروتئین‌ها یا متابولیسم آنها باشد.

مطالعه‌های بیشتری برای تعیین تأثیر دقیق دم کرده مرزه (ساتوریا خوزستانیکا) بر روی فعالیت انعقادی و وزن بدن مورد نیاز است.

### \* سپاسگزاری :

بدین وسیله از همکاری خانم سپهوند و آقایان زرین‌جویی، بهرامی و فرهادی قدردانی می‌شود.

### \* مراجع :

۱. طبرستانی مجتبی. خون‌شناسی پزشکی، مشهد، سازمان چاپ و نشر مشهد، ۱۳۶۴، ۸۲۷-۸۳
۲. زرگری علی. گیاهان دارویی، تهران، انتشارات تهران، ویرایش چهارم، ۱۳۶۹، ۴۲-۵
3. Sanchez de Rojas VR, Somoza B et al. Isolation of vasodilatory active flavonoide from the traditional remedy Satureja obovata. *Planta Med* 1996; 62: 272-4
4. Exarchou V, Nenadis N, Tsimidou M et al. Antioxidant activities and phenolic composition of extracts of from Greek oregano, Greek sage, and summer savory. *Agric Food Chem* 2002; 50: 5294-9
5. Marzuoghi E. Effect of infusion Satureja Khuzestanica on dysmenorrhea in young women. Thesis of general physician,