

Effect of PPAR γ His447His polymorphism on oocytes and fertilization in IVF

M. Sahmani *

M. Noori **

M. Sirati-Saabet *****

E. Sakhinia ***

R. Najafipour *****

L. Farzadi ****

*MSc of Biochemistry, Molecular and Cellular Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
 **Associate Professor of Biochemistry, Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

***Assistant Professor of Genetics, Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

****Associate Professor of Gynecology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

*****Assistant Professor of Biochemistry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

*****Assistant Professor of Genetics, Molecular and Cellular Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

*Abstract

Background: Genetic factors play an important role in women fertility and embryonic development which may contribute to the efficacy of assisted reproduction techniques.

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPAR γ) His447His polymorphism on oocytes and fertilization in women undergoing IVF.

Methods: Blood samples were obtained from 98 IVF patients referred to Tabriz Alzahra Hospital. Samples were analyzed for the PPAR γ gene polymorphism using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism-based methods. Multivariate analyses were used to test the independence of associations between the number of mature oocytes and the number of oocytes fertilized as outcome variables and polymorphism of PPAR γ gene.

Findings: Correlation analysis showed a significant inverse correlation between the age of women and the number of mature oocytes retrieved ($r=-0.37$, $P=0.001$) and oocytes fertilized ($r=-0.25$, $P=0.015$). The ratio of the number of mature oocytes to oocytes fertilized was significantly ($P<0.05$) increased in carriers of the rare alleles than homozygous wild-type genotypes. The association of His447His polymorphism ($P=0.003$) remained statistically significant after adjustment for confounding factors in the multivariate analyses.

Conclusion: This study presents evidences that the His447His polymorphism of PPAR γ plays an important independent role in fertilization in vitro and thus possibly in female fertility.

Keywords: in vitro Fertilization, PPAR, His447His Polymorphism

Corresponding Author: Reza Najafipour, Molecular and Cellular Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

E-mail: r_najafipour@yahoo.com

Tel: +98-9127991442

Received: 1 May 2010

Accepted: 2 Nov 2010

اثر پلیمورفیسم PPAR γ His447His بر روی اوسویت‌ها و باروری در لقاح خارج رحمی

* مهدی سهمانی ** دکتر محمد نوری
 **** دکتر ابراهیم سخنیا *** دکتر لیلا فرزدی
 ***** دکتر مجید سیرتی ثابت **** دکتر رضا نجفی پور

* مری و عضو هیأت علمی گروه بیوشیمی و ژنتیک مرکز تحقیقات سلوی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

** دانشیار بیوشیمی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

*** استادیار ژنتیک مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

**** دانشیار زنان و نازابی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

***** استادیار بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

***** استادیار ژنتیک مرکز تحقیقات سلوی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آدرس نویسنده مسؤول: قزوین، بلوار شهید باهنر، مرکز تحقیقات سلوی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تلفن: ۰۹۱۲۷۹۹۱۴۴۲

Email: r_najafipour@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۸۹/۸/۱۱ تاریخ پذیرش: ۸۹/۸/۱۱

چکیده*

زمینه: عوامل ژنتیکی در باروری زنان و نمو جنینی نقش مهمی دارند و این امر می‌تواند موجب افزایش میزان تأثیرگذاری روش کمک باروری شود.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر پلیمورفیسم PPAR γ His447His بر روی اوسویت و میزان باروری زنان داوطلب لقاح خارج رحمی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی نمونه‌های خون از ۹۸ بیماری که به بیمارستان الزهرا تبریز مراجعه کرده بودند جمع‌آوری شد. نوع پلیمورفیسم نمونه‌ها توسط روش چند شکلی طول قطعه محدود (PCR-RFLP) تعیین شد. برای بررسی ارتباط مستقل بین تعداد تخمک‌های بالغ و تعداد تخمک‌های بارور شده و نوع پلیمورفیسم PPAR γ از آنالیزهای چند متغیره استفاده شد.

یافته‌ها: ارتباط معکوس معنی‌داری بین سن زنان و تعداد تخمک‌های بالغ ($P=0.001$) و میزان تخمک‌های بارور شده ($P=0.025$) وجود داشت. نسبت تعداد تخمک‌های بالغ و تخمک‌های بارور شده افزایش معنی‌داری ($P<0.005$) در حاملین الل نادر نسبت به ژنوتیپ هموزیگوت نرمال نشان داد. ارتباط پلیمورفیسم His447His بعد از همسان‌سازی عوامل مداخله‌گر در آنالیزهای چند متغیره از نظر آماری معنی‌دار باقی ماند ($P=0.003$).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها به نظر می‌رسد پلیمورفیسم PPAR γ His447His به عنوان یک عامل مستقل، در میزان لقاح خارج رحمی و احتمالاً باروری زنان نقش مهمی دارد.

کلید واژه‌ها: لقاح خارج رحمی، PPAR γ ، پلیمورفیسم His447His

* مقدمه:

درمان ناباروری را در شرایط آزمایشگاهی فراهم می‌نماید. امروزه IVF برای درمان ناباروری با علت‌های متفاوت کاربرد دارد. مراحل اصلی روش IVF شامل تحریک تخمک‌گذاری، برداشت تخمک، تلقیح، لقاح، کشت جنین و انتقال جنین است.^(۱) یک عامل مهم در درمان موفق توسط IVF، میزان بلوغ تخمک و میزان باروری تخمک‌ها توسط اسپرم است.^(۲)

حدود ۱۰-۱۵ درصد زوج‌ها در سنین باروری نازا هستند. علت ناباروری متعدد است و روش درمان نازابی به نوع نارسایی بستگی دارد.^(۱) هم‌زمان با ظهور فناوری لقاح خارج رحمی (IVF) در سال ۱۹۷۸، امکان باروری برخی از زوج‌هایی که گامت داشتند ولی از داشتن فرزند محروم بودند، فراهم شد. IVF روشی از کمک باروری است که امکان لقاح اسپرم و تخمک زوج متقاضی برای

همان اسید آمینه می‌شود. میزان آل T با کاهش فعالیت PPAR γ و کاهش سنتز آندروژن‌های تخمدانی و افزایش خطر ابتلا به PCOS ارتباط داده شده است.^(۱۲) هر چند ارتباط این پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNP) با میزان باروری زنان متناقض است.

مطالعه‌های اخیر نشان داده‌اند که فعالیت PPAR γ در تخمدان به طور مستقیم بر روی ترشح و بلوغ فولیکول‌ها اثر دارد.^(۱۳) این فرضیه‌ها پیشنهاد می‌کند که تغییر در میزان بیان ژن PPAR γ یا کاهش فعالیت آن طی پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی ممکن است باعث افزایش خطر ابتلا به ناباروری شود. به این ترتیب مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر پلی‌مورفیسم His447His ژن PPAR γ بر روی اتوسیست و میزان باروری زنان داوطلب لفاح خاج رحمی انجام شد.

* مواد و روش‌ها:

در این مطالعه تحلیلی پس از موافقت کمیته اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۹۸ نفر از زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا تبریز که داوطلب IVF و بدون هیچ‌گونه عالیم بیماری بودند با میانگین سنی ۳۲ سال انتخاب شدند. دارا بودن همسر سالم با اسپرم‌گرام طبیعی و بدون عادت به مصرف سیگار از معیارهای ورود به مطالعه بود. وجود هرگونه اختلال رحمی، سابقه ابتلا به بیماری‌های غدد و التهابی از قبیل اختلال‌های تیروئیدی، آدنال، اختلال در سیستم ایمنی و هورمون‌های جنسی جزو معیارهای خروج از مطالعه قرار گرفت. تمام نمونه‌ها در روز چهاردهم از سیکل قاعدگی بیماران اخذ شد.


برای تحریک تخمدان، ابتدا سیکل قاعدگی خانم‌ها حدود یک ماه با دارو متوقف می‌شد. سپس برای به دست آوردن تخمک‌های متعدد، تخمدان با استفاده از داروهای شبه هورمون تحریک کننده فولیکول (rFSH, Gonal-F; Serono, Switzerland) در روز سوم سیکل قاعدگی تحریک می‌شد. پس از مشاهده رشد فولیکول‌ها توسط سونوگرافی (۲۰-۱۸ میلی‌متر)، ۱۰۰۰

مطالعه‌های مختلف نشان داده‌اند که یکی از عوامل مؤثر در این فرآیند نقش ژن‌های است.^(۴) یکی از ژن‌های مهم در این زمینه، ژن PPAR γ (Peroxisome Proliffrative-Activated Receptor Gamma) است که در سال ۱۹۹۰ شناسایی شد. این ژن در ناحیه ۲۵ بازوی کوتاه کروموزوم شماره ۳ قرار دارد و حاوی ۹ اگزون است.^(۵) PPAR‌ها جزو گروهی از گیرنده‌های داخل سلولی (هسته‌ای) هستند که در تنظیم متابولیسم گلوکز و چربی‌ها و همچنین در تمایز سلولی نقش مهمی دارند. PPAR‌ها دارای زیرگروه‌های α , β/δ و γ هستند و در قسمت‌های مختلف سیستم تولید مثل (تخمدان، رحم و بیضه‌ها) بیان می‌شوند. زیر گروه γ در گلوكونئوژن، برداشت، سنتز و ذخیره و تجزیه چربی‌ها نقش مهمی دارد. PPAR γ میزان حساسیت انسولینی را افزایش می‌دهد و باعث کاهش میزان گلوکز خون در افراد دیابتی نوع دو می‌شود.^(۶) نشان داده شده است که کاهش فعالیت PPAR γ با کاهش سنتز زیستی هورمون‌های آندروژنی تخمدان ارتباط دارد.^(۷) آنتوین و همکاران نشان دادند که PPAR γ یک ژن تعديل کننده مهم در جمعیت عمومی است، اما در بیماران مبتلا به تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) اینطور نیست.^(۸) در مطالعه‌ای دیگر کوی و همکاران مشاهده کردند اگر چه در نمونه‌های حیوانی که ژن PPAR γ آنها حذف شده اوولاسیون طبیعی است، ولی میزان ترشح پروژسترون و در نتیجه میزان لانه گزینی جنین به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.^(۹) ارتباط بین PPAR γ و ناباروری متناقض است.^(۱۰) موتاسیون ژن PPAR γ بر روی باروری خانم‌ها اثر منفی دارد.^(۱۱) مطالعه‌های انسانی نشان داده‌اند که حداقل ۷ نوع پلی‌مورفیسم در مورد ژن PPAR γ وجود دارد که یکی از شایع‌ترین آنها His447His است. این پلی‌مورفیسم در اثر جای‌گزینی نوکلئوتیدی C > T در اگزون شماره ۶ و یک موتاسیون خاموش (Silent) است که باعث کده کردن His به

درجه طویل سازی (extension) به مدت ۳۰ ثانیه و در نهایت طویل سازی نهایی (final extension) در ۷۲ درجه به مدت ۷ دقیقه. به منظور انجام PCR-RFLP ۱۰ میکرولیتر محصول PCR در مجاورت ۱ میکرولیتر آنزیم PmII و ۲ میکرولیتر بافر مخصوص آنزیم آنزیم (10XFast Digest BUFFER) (تهیه شده از Fermentase) و ۱۷ میکرولیتر آب، با حجم نهایی ۳۰ میکرولیتر بعد از مخلوط کردن به مدت یک شب در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد قرار گرفت.

محصولات PCR پس از انجام RFLP بر روی ژل آگاروز ۳ درصد الکتروفورز و با ایتیدیوم بروماید رنگ آمیزی شدند. پس از برش در ژن PPAR γ قطعه هایی به طول ۳۹ bp و ۳۶ bp حاصل می شد. برای تشخیص باندها در روی ژل از DNA Ladder، ۵۰ bp استفاده شد که از شرکت Fermentas خریداری گردید. برای هر نوبت کاری مقدار ۱/۵ میکرولیتر از آن در روی ژل قرار داده شد و مقدار ۲۰ میکرولیتر هم از نمونه در هر چاهک ژل load شد(شکل شماره ۱).

داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS11 و آزمون های آماری تی، آنالیز همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. ارزش احتمالی کمتر از ۰/۰۵ معنی دار تلقی شد.



شکل ۱- برش قطعه های تکثیر شده با آنزیم PmII (ردیف ۱ نشان گر؛ ردیف های ۲ تا ۴ هتروزیگوت؛ ردیف ۵ هموزیگوت (wild type)

واحد بین المللی هورمون hCG به صورت داخل عضلانی تجویز می شد. پس از ۳۶ ساعت، مایع فولیکولی طی عمل لایپراسکوپی خارج و تخمک های جمع آوری شده از مایع فولیکولی در انکوباتور ۳۷ درجه با ۶ CO₂ درصد به مدت ۴ ساعت انکوبه و بلوغ تخمک ها بر اساس حجم، تجمع سلول های کومولوس، حضور جسم قطبی و کرونای اطراف آنها تعیین می شد.^(۱۴) اسپرم ها با روش swim-up جهت بارور کردن تخمک ها برای عمل لقاح در IVF آماده و هر تخمک در مجاورت ۲۵۰۰۰۰ اسپرم قرار داده می شد. بعد از ۲۴ ساعت، گرانولوزاسل ها از اطراف جنین جدا و بالا فاصله مرحله تقسیم 2PN (تخمک های بارور شده ای که دارای دو هسته پرونوکلئوس هستند) مورد مطالعه قرار می گرفت. بعد از ۲۴ ساعت، ۳ عدد جنین ۴ تا ۸ سلولی انتخاب و به وسیله کاتتر به داخل رحم منتقل و حاملگی بالینی با اندازه گیری β -hCG در روز چهاردهم بعد از انتقال جنین مشخص می شد.

از تمام افراد مورد مطالعه در حین لایپراسکوپی ۳ سی سی خون جهت آزمایش های مولکولی به لوله آزمایش حاوی EDTA منتقل شد. نمونه ها پس از لیز شدن گلbul های سفید خون با بافر مناسب، به روش استاندارد فنل - کلروفرم استخراج^(۱۵) و با استفاده از دستگاه نانودرایپ، مقدار و کیفیت آن تخمین زده شد. پلی مورفیسم PPAR γ ژن His447His نمونه ها با PCR-RFLP با استفاده از دستگاه ترموسایکلر (ABI مدل VERITY - آمریکا) به روش زیر تعیین شد. ابتدا یک قطعه از ژنومی شامل ۱۸۱ bp به روش PCR توسط پرایمرهای ۵'-CCAGAAAATGACAGACCTCAGACA- F: ۳' و ۵'-CAGAATAGTGCAACTGGAAAGAAGG- R: ۳' تکثیر شد. شرایط دمایی ترموسایکلر پس از بهینه سازی عبارت بود از: مرحله واسرشت اولیه ۹۵ (initial denaturation) درجه به مدت ۵ دقیقه، سیکل ۹۴ درجه ای (denaturation) به مدت ۳۰ ثانیه، ۵۷ درجه آنیل (annealing) به مدت ۳۰ ثانیه و ۷۲

* بحث و نتیجه‌گیری:

این مطالعه نشان داد که پلی‌مورفیسم His447His ژن PPAR γ می‌تواند در باروری زنان داوطلب IVF اثر مهمی داشته باشد. اثر سن بر روی تعداد تخمک‌های به دست آمده موافق با مطالعه‌های قبلی بود که نشان داد سن بالا می‌تواند باعث کاهش میزان باروری در زنان شود.^(۱۵) هر چند که در مطالعه حاضر، افراد سن کمتری در مقایسه با مطالعه‌های مشابه داشتند^(۱۶) که احتمالاً باعث کم شدن اثر سن بر روی سیستم تولید مثل می‌شود.

در مطالعه موتسابایشی و همکاران، نسبت تعداد تخمک‌های بارور به تعداد تخمک‌های بالغ حدود ۷۰ درصد و در مطالعه‌ای میزان حاملگی ۴۵ درصد گزارش شد.^(۱۷) هر دو آمار نسبت به یافته‌های مطالعه حاضر بیشتر است. این ممکن است به علت وجود شرایط سخت محیطی یا عوامل خطر ژنتیکی بین افراد در سنین تولید مثل در جمعیت مورد مطالعه باشد. فعالیت PPAR γ در فرآیندهایی از قبیل تعدیل در برداشت اسیدهای چرب، متабولیسم چربی‌ها و مصرف انرژی در کبد نقش کلیدی دارد.^(۱۸) همچنین در تنظیم رشد و نمو فولیکول‌های تخدمان، اوولاسیون و بلوغ تخمک (از طریق القا و مهار در مراحل استروئیدوژن)، آنتیوژن و حتی آپوپتوزیس نیز مؤثر است.^(۲۰) این مراحل برای نمو و توسعه فولیکول و باروری در زنان ضروری است. به نظر می‌رسد مراحل نمو و توسعه فولیکول و باروری در زنان تحت تأثیر واریانت‌های ژنتیکی PPAR γ باشند که ممکن است باعث تغییر در میزان بیان ژن یا در فعالیت این گیرنده هسته‌ای گردد.

در مطالعه حاضر، نسبت باروری در گروهی که پلی‌مورفیسم دیده نشد، در مقایسه با بیماران هتروژیگوت 447His کمتر بود. مطالعه‌ها نشان داده‌اند که فعال کننده‌های PPAR γ باعث مهار بیان و فعالیت آنزیم آروماتاز در انسان در رده سلولی گرانولوزا می‌شوند.^(۲۱) علاوه بر آن فعال کننده PPAR γ باعث القای تغییر مسیر

* یافته‌ها:

میانگین سنی زنان مورد مطالعه $۳۱/۴ \pm ۵$ سال بود و ارتباط معکوس معنی‌داری بین سن زنان و تعداد تخمک‌های بالغ ($P=0.001$) و تعداد تخمک‌های بارور شده ($P=0.015$) وجود داشت (جدول شماره ۱).

جدول ۱ - مشخصات عمومی و آزمایشگاهی افراد مورد مطالعه و اسپرموگرام همسر

سن (سال)	$۳۱/۴ \pm ۵$ (۲۰-۴۰)
نمای توده بدنی (kg/m ²)	$۳۲/۶۸ \pm ۱/۴$ (۲۰-۲۸)
تعداد تخمک بالغ	$۹/۲ \pm ۵/۲$ (۱-۲۰)
تعداد تخمک بارور شده	$۴/۹۸ \pm ۳/۲$ (۱-۱۴)
درصد حاملگی	۳۲/۳
تعداد اسپرم (10 ⁶ /ml)	$۶۱/۴ \pm ۱۵/۸$ (۲۵-۹۰)
درصد تحرک	$۷۸/۴ \pm ۹/۱$ (۶۰-۱۰۰)

هیچ ارتباط معنی‌داری بین پلی‌مورفیسم با تعداد تخمک‌های بالغ و یا بارور دیده نشد. هر چند نسبت باروری در پلی‌مورفیسم ژن به طور معنی‌داری $(P=0.041)$ بیشتر بود. بعد از همسان‌سازی از نظر سن، تعداد اسپرم و تحرک اسپرم، این اختلاف بیشتر معنی‌دار شد (جدول شماره ۲).

جدول ۲ - میانگین پارامترهای باروری در گروه‌های ژنتیکی مورد مطالعه

His447His	تعداد	تخمک‌های بالغ	تخمک‌های بارور شده	نسبت باروری
CC (هتروژیگوت)	۸۰	$۹/۷۱ \pm ۵/۰۳$	$۵/۱۱ \pm ۳/۲۴$	$۰/۵۳ \pm ۰/۱۹$
CT (هموزیگوت (wild type	۱۸	$۷/۷۲ \pm ۵/۶۱$	$۴/۳۹ \pm ۳/۱۶$	$۰/۶۹ \pm ۰/۲۷$
P		$۰/۰۷۳$	$۰/۳۹۳$	$۰/۰۲۱$
P*		$۰/۲۳۸$	$۰/۷۲۰$	$۰/۰۰۶$

* مقادیر بعد از همسان‌سازی با سن، شاخص توده بدنی، تعداد و تحرک اسپرم

- primary and secondary infertility. Geneva: WHO Programme on Maternal and Child Health and Family Planning, Division of Family Health 1991
2. Rees WD, McNeil CJ, Maloney CA. The roles of PPARs in the fetal origins of metabolic health and disease. *PPAR Res* 2008; 2008: 459030
 3. Fournier T, Tsatsaris V, Handschuh K, et al. PPARs and the placenta. *Placenta* 2007 Feb-Mar; 28(2-3): 65–76
 4. Gremlich S, Fratta S, Rebellato E, et al. Interleukin-1 receptor antagonist gene (IL-1RN) polymorphism is a predictive factor of clinical pregnancy after IVF. *Hum Reprod* 2008 May; 23(5): 1200–6
 5. Froment P, Gizard F, Defever D, et al. Peroxisome proliferator-activated receptors in reproductive tissue: from gametogenesis to parturition. *J Endocrinol* 2006 May; 189(2): 199-209
 6. Minge CE, Robker RL, Norman RJ. PPAR gamma: coordinating metabolic and immune contributions to female fertility. *PPAR Res* 2008; 2008: 243791
 7. Chinetti-Gbaguidi G, Fruchart JC, Staels B. Role of the PPAR family of nuclear receptors in the regulation of metabolic and cardiovascular homeostasis: new approaches to therapy. *Curr Opin Pharmacol* 2005 Apr; 5(2): 177-83
 8. Perret B, Mabile L, Martinez L, et al. Hepatic lipase: structure/function relationship, synthesis, and regulation. *J Lipid Res* 2002 Aug; 43(8): 1163-9
 9. Antoine HJ, Pall M, Trader BC, et al. Genetic variants in peroxisome proliferator-activated receptor gamma influence insulin resistance and testosterone levels in normal women, but not those with polycystic ovary syndrome. *Fertil Steril* 2007 Apr; 87(4): 862-9

از سنتر آندروژن به سنتر زیستی پروژتین در سلول‌های تکا می‌شود که این قابل مقایسه با وضعیت انتقالی استروئیدوژنیک در محیط داخل رحمی متعاقب افزایش میزان LH است.^(۲۳) این وضعیت پیشنهاد می‌کند که پاسخ گرانولوزا سل‌ها به آگونیست‌های PPAR γ ممکن است به مراحل تمایز فولیکولی وابسته باشد.^(۲۴)

پلیمورفیسم His447His که با نسبت باروری ارتباط دارد یک پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی کدون هم معنی در اگزون ۶ است. اگرچه پلیمورفیسم C→T در کدون ۴۴۷ نمی‌تواند باعث تغییر اسید آمینه در ساختار پروتئین شود، ولی در یک جایگاه مهم در دومنهای عمل کننده ژن PPAR γ واقع شده است که می‌تواند به طور مستقیم بر روی ساختار پروتئین و سطح بیان ژن آن اثر داشته باشد.^(۲۵)

PPAR γ به عنوان یک عامل رونویسی حساس به لیگاند می‌تواند در تنظیم بیان ژن‌های ضروری در یک مرحله به خصوص طی مراحل اوولاسیون و همچنین بر روی میزان باروری تخمک‌ها و در نتیجه نمو و توسعه آنها در بلاستوسیت‌ها اثرگذار باشد.

به طور کلی این مطالعه مدارک جدیدی از اثرات مفید و معنی دار پلیمورفیسم His447His بر روی PPAR γ با نسبت باروری را نشان داد. این ارتباط نشان داد که با مطالعه نشان‌گرهای ژنتیکی می‌توان زمینه‌های مطالعه‌های بعدی را فراهم کرد تا گام مهمی در بهبود و پیشرفت IVF با کارایی بیشتر در درمان ناباروری داشته باشیم.

*سپاس گزاری:

از شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دانشگاه علوم پزشکی تبریز که هزینه این طرح تحقیقاتی مشترک را تقبل نموده‌اند، صمیمانه سپاس گزاری می‌شود.

*مراجع:

1. World Health Organization. Infertility, a tabulation of available data on prevalence of

10. Cui Y, Miyoshi K, Claudio E, et al. Loss of the peroxisome proliferation-activated receptor gamma (PPARgamma) does not affect mammary development and propensity for tumor formation but leads to reduced fertility. *J Biol Chem* 2002 May 17; 277(20): 17830-5
11. -Minge CE, Robker RL, Norman RJ. PPAR Gamma: Coordinating Metabolic and Immune Contributions to Female Fertility. *PPAR Res* 2008; 2008: 243791-243791.
12. Gu BH, Baek KH. Pro12Ala and His447His polymorphisms of PPAR-gamma are associated with polycystic ovary syndrome. *Reprod Biomed Online* 2009 May; 18(5): 644-50
13. Minge CE, Ryan NK, Van Der Hoek KH, et al. Troglitazone regulates peroxisome proliferator-activated receptors and inducible nitric oxide synthase in murine ovarian macrophages. *Biol Reprod* 2006 Jan; 74(1): 153-60
14. Tok EC, Aktas A, Ertunc D, et al. Evaluation of glucose metabolism and reproductive hormones in polycystic ovary syndrome on the basis of peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)-gamma2 Pro12Ala genotype. *Hum Reprod* 2005 Jun; 20(6): 1590-5
15. Weiss NS, Ure CL, Ballard JH, et al. Decreased risk of fractures of the hip and lower forearm with postmenopausal use of estrogen. *N Engl J Med* 1980 Nov 20; 303(21): 1195-8
16. Thyzel E, Siegling S, Tinneberg HR, et al. Age dependent assessment of TFPI levels in follicular fluid of women undergoing IVF. *Clin Chim Acta* 2005 Nov; 361(1-2): 176-81
17. Matsubayashi H, Sugi T, Arai T et al. IgG-antiphospholipid antibodies in follicular fluid of IVF-ET patients are related to low fertilization rate of their oocytes. *Am J Reprod Immunol* 2006 May; 55(5): 341-8
18. Von Wald T, Monisova Y, Hacker MR, et al. Age-related variations in follicular apolipoproteins may influence human oocyte maturation and fertility potential. *Fertil Steril* 2010 May 1; 93(7): 2354-61
19. Auwerx J, Cock TA, Knouff C. PPAR-gamma: a thrifty transcription factor. *Nucl Recept Signal* 2003; 1: e006
20. Froment P, Gizard F, Defever D, et al. Peroxisome proliferator-activated receptors in reproductive tissues: from gametogenesis to parturition. *J Endocrinol* 2006 May; 189(2): 199-209
21. Kwintkiewicz J, Nishi Y, Yanase T, et al. Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma mediates bisphenol A inhibition of FSH-stimulated IGF-1, aromatase, and estradiol in human granulosa cells. *Environ Health Perspect* 2010 Mar; 118(3): 400-6
22. Mu YM, Yanase T, Nishi Y, et al. Insulin sensitizer, troglitazone, directly inhibits aromatase activity in human ovarian granulosa cells. *Biochem Biophys Res Commun* 2000 May 19; 271(3): 710-3
23. Schoppee PD, Garmey JC, Veldhuis JD. Putative activation of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma impairs androgen and enhances progesterone biosynthesis in primary cultures of porcine theca cells. *Biol Reprod* 2002 Jan; 66(1): 190-8
24. Komar CM, Curry TE Jr. Inverse relationship between the expression of messenger ribonucleic acid for peroxisome proliferator-activated receptor gamma and P450 side chain cleavage in the rat ovary. *Biol Reprod* 2003 Aug; 69(2): 549-55
25. He W. PPARgamma2 polymorphism and human health. *PPAR Res* 2009; 2009: 849538