

## ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی

بهاره پاکباطن (M.Sc)، رضا مجیدزاده هروی<sup>\*</sup> (Ph.D)، حسن کرمانشاهی (Ph.D)، محمدهادی سخاوتی (Ph.D)، علی جوادمنش (Ph.D)  
گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

### چکیده

سابقه و هدف: پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های مفیدی هستند که در طی قرن‌ها در بهبود مواد غذایی و هم‌چنین ارتقاء سلامت استفاده می‌شوند. امروزه پروبیوتیک‌های نوترکیب به عنوان وسیله انتقال برای بیان و انتقال هدفمند مولکول‌های بومی یا نوترکیب به سطوح مخاطی دستگاه گوارش در تغذیه و سلامت استفاده می‌شوند. لاکتوکوکوس لاکتیس یک کاندیدای بالقوه برای تولید پروتئین‌های زیستی مفید است. از آنجا که برای این باکتری ناقل مناسبی که دارای توالی سیگنال برای ترشح خارج سلولی باشد وجود ندارد لذا هدف ما از این مطالعه افزایش راندمان بیان پروتئین‌های نوترکیب در خارج از سلول با استفاده از وارد کردن توالی سیگنال پیتید 45 usp45 به ناقل پلاسمیدی pBU003 است.

مواد و روش‌ها: سیگنال پیتیدی دارای ۸۱ باز است که در مطالعات زیادی به عنوان افزایش دهنده بیان نیز معرفی شده است. در این مطالعه توالی سیگنال usp45 ساخته شد و سپس با استفاده از واکنش لیگاسیون به پلاسمید pBU003 انتقال یافت. پس از آن به باکتری اشريشياکلي سويه MC1061 منتقل شد. پلاسمید نوترکیب به pFUM003 نام‌گذاری شد.

یافته‌ها: تعیین توالی پلاسمید حاوی usp45 نشان داد که دارای ساختار پلاسمیدی و توالی سیگنال صحیح است و تطابق کامل با توالی‌های الگو (EU382094.1) گزارش شده در بانک ژنی NCBI دارد. نتیجه‌گیری: پلاسمید نوترکیب ساخته شده به pFUM003 نام‌گذاری شد. این پلاسمید نوترکیب به لحاظ ساختاری صحیح و جهت انتقال به پروبیوتیک‌ها مناسب می‌باشد.

### واژه‌های کلیدی: توالی سیگنال، وکتورهای ژنتیکی، لاکتوکوکوس لاکتیس

انتروکوکوس فاسیوم، لاکتوکوکوس لاکتیس، لوکونوستوک مزانتروئیدس، پیدیوکوکوس اسیدیلاکتی، استرپتوكوکوس ترموفیلوس از میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک می‌باشند. باکتری‌های اسیدلاکتیک توانایی تولید اسیدلاکتیک از قندها در طی مرحله تخمیر را دارند [۳]. سويه‌های لاکتوکوکوس از تولیدکننده‌های اسیدلاکتیک می‌باشند که در شیر ترش وجود دارند و چندین سويه از آن‌ها پروبیوتیک می‌باشند. از این میان لاکتوکوکوس لاکتیس به دلیل داشتن مزایایی از قبیل

### مقدمه

امروزه نقش پروبیوتیک‌ها برای همگان مشخص است. سازمان خواروبار جهانی (فأو) تعریفی به این مضمون دارد که پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که وقتی به مقدار کافی مصرف می‌شود باعث حفظ سلامتی میزبان می‌شود که در این تعریف تمام ویژگی‌های یک باکتری پروبیوتیک ذکر شده است [۲،۱]. انواع باکتری‌های اسیدلاکتیک شامل گونه‌های لاکتوباسیلوس، گونه‌های بیفیدوباکتریوم، گونه‌های

است. از آنجا که هدف از تولید یک پروتئین نوترکیب می‌تواند ترشح یک آنژیم یا یک آنتیژن در محیط دستگاه گوارش باشد، توانایی ترشح خارج سلولی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. در موارد فوق بروتئین نوترکیب باید به خارج سلول هدایت گردد تا اثربخش باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد با قرارگیری یک سیگنال پیتید که قادر به انتقال پروتئین نوترکیب به خارج از سلول میزبان باشد بتوان کارایی پروتئین نوترکیب را افزایش داد. برای حل این مشکل از پروتئین هدایت‌کننده usp45 استفاده شد که همزمان باعث افزایش بیان و نیز ترشح خارج سلولی می‌شود [۴]. در مطالعات انجام شده نشان داده شد که از میان چندین پروتئین هدایت‌کننده (Signal peptide) وکتورهای دارای پروتئین هدایت‌کننده usp45 قابل استفاده در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس است و همچنان موجب ترشح خارج سلولی پروتئین مورد نظر می‌شود [۱۲، ۱۱، ۱۰].

لوئرسی و همکاران (۲۰۱۵) بیان کردند که usp45 یکی از محدود سیگنال پیتیدهای مخصوص لاکتوکوکوس لاکتیس است و تنها سیگنال پیتیدی است که پروتئین را به مقدار کافی در ژل رنگ آمیزی شده با کوماسی بلو شناسایی می‌کند [۱۳]. شیگموری و همکاران (۲۰۱۴) نیز از سیگنال پیتید usp45 pNZ8148 استفاده و بیان بالایی را مشاهده کردند [۱۴]. در pNZ3004 از جایگزین bp512 که شامل پرموتور و توالی سیگنال Sal I است در پلاسمید PGKV210 در جایگاه Sal I-Sal A ساخته شده است. پلاسمید PGKV210 خود از تلقیق EcoR I ساخته شده است. پلاسمید pE194 cop-6 و pWVO1 که حامل ژن مقاوم به اریترومایسین است و سایت کلونینگ پلاسمید M13mp11 و در نهایت بخشی از پلاسمید pPL603 که حامل ژن مقاوم به کلرامفینیکل است ساخته شده [۸] که قدرت تکثیر در باکتری‌های گرم مثبت و بعضی از سویه‌های اشرشیاکلی را دارند و مکانیسم تکثیر آن‌ها به صورت کپی‌برداری دایره‌ای است [۹].

نیف و همکاران (۲۰۱۵) با جایگزین کردن سیگنال پیتید usp45 در پلاسمیدهای pNG4110، pNG4210 و pNG4210 موفق به ساخت وکتوری با قابلیت ترشح خارج سلولی شدند و گزارش کردند وکتورهای حاضر در ترکیب با لاکتوکوکوس لاکتیس ابزار قدرتمندی در زمینه بیان، خالص‌سازی و ترشح خارج سلولی در باکتری‌ها است [۱۵].

تولید باکتریوسین نایسین (Nisin) مورد توجه در درمان بیماری‌هایی از قبیل ناراحتی‌های روده‌ای و متعادل‌کننده میکروفلور روده است [۴]. نایسین، پیتید ضد میکروبی طبیعی که توسط سویه‌هایی از لاکتوکوکوس لاکتیس تولید می‌شود و به طور مؤثر باعث مهار رشد باکتری‌های گرم مثبت و تا حدودی گرم منفی می‌شود. علاوه بر آن به عنوان نگهدارنده‌های طبیعی و عامل بالقوه ضد میکروبی در داروسازی، دامپزشکی و محصولات بهداشتی کاربرد دارد. نایسین با ایجاد شکاف‌هایی در غشاء پلاسمایی، باعث از بین رفتن باکتری‌ها می‌شود [۵]. همچنین لاکتوکوکوس لاکتیس قادر به بیان پروتئین‌هایی با وزن بین ۱۰ تا ۱۶۰ کیلودالتون می‌باشد [۶]. پلاسمید pBU003 استفاده شده در این مطالعه که در لاکتوکوکوس لاکتیس بیان می‌گردد فاقد توانایی ترشح پروتئین به خارج از سلول است. پلاسمید مذکور از جایگزین کردن جایگاه کلونینگ پلاسمید pPET21(b+) در پلاسمید pNZ3004 ساخته شده است [۷]. از جایگزین کردن یک قطعه bp512 که شامل پرموتور و توالی سیگنال Sal I است در پلاسمید PGKV210 در جایگاه Sal I-Sal A ساخته شده است. پلاسمید PGKV210 خود از تلقیق EcoR I ساخته شده است. پلاسمید pE194 که حامل ژن مقاوم به اریترومایسین است و سایت کلونینگ پلاسمید M13mp11 و در نهایت بخشی از پلاسمید pPL603 که حامل ژن مقاوم به کلرامفینیکل است ساخته شده [۸] که قدرت تکثیر در باکتری‌های گرم مثبت و بعضی از سویه‌های اشرشیاکلی را دارند و مکانیسم تکثیر آن‌ها به صورت کپی‌برداری دایره‌ای است [۹].

منشأ پلاسمید pBU003 لاکتوکوکوس لاکتیس بوده لذا مشکلات مربوط به تجزیه توسط نوکلئازهای سلولی را در لاکتوکوکوس و همچنین لاکتوپاسیل‌ها را ندارد. یکی از مشکلاتی که در وکتور pBU003 وجود دارد این است که پروتئین تولید شده از طریق این پلاسمید قادر به انتقال به خارج سلول نیست و این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که سیگنال پیتیدی برای این پلاسمید طراحی نشده

رقیق گردید و سپس زنجیره پیرو و پیشرو به نسبت مساوی با بافر R (شرکت-Thermo شماره کاتالوگ BR5) مخلوط شد و مطابق برنامه زیر داخل ترموسایکلر (T-Personal Germany) قرار گرفت: ۱ دقیقه ۳۰، ۹۵°C ثانیه C ۸۰°، ۳۰ ثانیه C ۷۰°، ۳۰ ثانیه C ۵۰°، ۲۵°C این روش (Annealed Oligo Cloning) زنجیره پیرو و پیشرو را به هم جفت می‌کند [۱۵]. سپس این مخلوط به نسبت ۱ به ۱۰۰ رقیق گردید و با استفاده از پرایمرهای طراحی شده برای usp45 تحت PCR قرار گرفت پرایمر رفت ACAGTCGACCATGAAAAAAAGATTATC شامل دارای جایگاه آنزیمی I Sal و پرایمر برگشت شامل ATCTCTCGAGAGCGTAAACACCTGACA جایگاه آنزیمی I Xho می‌باشد. مراحل اول واکنش با C ۹۴° در ۱۰ دقیقه شروع و با ۳۵ سیکل شامل C ۹۴° در ۳۰ ثانیه در ۵۹°C در ۳۰ ثانیه C ۷۲° در ۳۰ ثانیه و با ۵ دقیقه در C ۷۲° خاتمه یافت. محصول واکنش روی ژل آکارز ۱٪ الکتروفوروز شد.

برش آنزیمی: در ادامه برش آنزیمی پلاسمید و قطعه با آنزیم‌های I و I Sal Usp45 انجام گرفت و صحت قطعات برش خورده توسط الکتروفوروز روی ژل آکارز ۱٪ تایید شد.

لیگاسیون: پس از استخراج پلاسمید برش خورده از ژل، واکنش لایگیشن پلاسمید و قطعه به وسیله آنزیم T4 DNA ligase (شرکت-Thermo شماره کاتالوگ EL0014) انجام شد.

ترانسفورماتیون: محصول لایگیشن به اشرشیاکلی سویه MC1061 به روش سمبروک و همکاران (۲۰۰۱) ترانسفرم گردید [۱۷] و سپس جهت انتخاب کلنسی مناسب به محیط کشت حاوی اریترومایسین ( $400 \mu\text{g}/\mu\text{l}$ ) منتقل شد. بعد از ۱۶ ساعت کلنسی‌ها روی محیط پدیدار شدند. جهت شناسایی کلنسی حاوی پلاسمید نوترکیب، ۱۲ کلنسی انتخاب و به محیط جامد حاوی اریترومایسین منتقل گردید.

در مطالعه‌ای دو سیگنال پیتید P (EntP) و hiracin با سیگنال پیتید JM79 (HirJM79) با نتیجه فعالیت ضد میکروبی برای بакتریوسین و در نتیجه فعالیت ضد میکروبی برای لاکتوکوکوس لاکتیس با ورود سیگنال پیتید usp45 به جای P و بهبود نزدیک به دو برابری در عمل کرد ضد میکروبی لاکتوکوکوس لاکتیس هنگامی که usp45 جایگزین سیگنال پیتید HirJM79 نشان داده شد [۱۱].

در مطالعه‌ای دیگر ترشح پروتئین بین دو سیگنال usp45 (SPUsp) Nuc signal peptide (SPNuc) و پیتید (SPUsp) مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصل بهبود چشمگیری در عمل کرد سیگنال پیتید usp45 (SPUsp) در مقابل Nuc signal peptide (SPNuc) از آن‌جا که پلاسمیدهای قابل بیان در بакتری‌های لاکتیک اسید مثل pNZ8008, pNZ8149 و pNZ8123, pNZ8124 از قابلیت ترشح خارج سلولی (pSH71) پلاسمیدهایی با منشاء سلولی حساس بوده و پایداری مناسبی ندارند لذا دستورزی این پلاسمیدها در آزمایشگاه به دلیل این حساسیت همواره با مشکلات همراه بوده است در مطالعه حاضر سعی شده تا با ساخت یک پلاسمید بیانی با امکان ترشح خارج سلولی پروتئین در لاکتوکوکوس لاکتیس، امکان تولید پروتئین نوترکیب در بакتری‌های اسید لاکتیک فراهم گردد.

## مواد و روش‌ها

بакتری و پلاسمیدهای استفاده شده در این مطالعه در جدول ۱ آمده است.

توالی سیگنال usp45 با شماره ژن بانک EU382094.1 که اندازه آن ۸۱bp بود برای سنتز به صورت دو زنجیره جداگانه پیرو و پیشرو به شرکت Bioneer کره جنوبی ارسال گردید. دو جایگاه آنزیمی I Sal و I Xho در دو انتهای توالی سیگنال نیز طراحی شد. توالی سیگنال سنتز شده به میزان  $100 \text{ pmol}/\mu\text{l}$

پلاسمید (شرکت Thermo شماره کاتالوگ K0502) از آن انجام شد.


**آنالیز آنزیمی:** جهت تایید وجود قطعه جایگزین در پلاسمید مورد نظر، برش آنزیمی توسط آنزیم‌های *Xba*I و *Sal*I انجام گرفت و صحت واکنش با استفاده از الکتروفوروز ژل آگارز ۲٪ تعیین گردید.

تعیین توالی: برای تایید صحت توالی قطعه داخل وکتور، تعیین توالی به روش سنگر (شرکت Bioneer کره جنوبی) انجام شد. نتیجه تعیین توالی با استفاده از روش BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov/blast) بررسی شد.

**Colony PCR:** به دلیل ماهیت پلاسمید مورد نظر امکان استفاده از روش‌های معمول همچون روش القا و انتخاب کلندی‌های آبی و سفید وجود نداشت لذا جهت انتخاب باکتری نوترکیب مناسب با استفاده از پرایمرهای اختصاصی پلاسمید، کلندی PCR بر روی ۱۲ کلندی‌های انجام گرفت. سپس محصول PCR به لحاظ طول قطعه روی ژل آگارز ۱٪ کنترل گردید. ۴ کلندی از ۱۲ کلندی تایید شد و به منظور استخراج پلاسمید نوترکیب به محیط مایع حاوی اریترومایسین منتقل شدند. باکتری‌های کشت شده در محیط مایع بعد از ۱۸ ساعت رشد کرده و بلا فاصله استخراج پلاسمید توسط کیت استخراج

جدول ۱. باکتری و پلاسمید‌های استفاده شد در این مطالعه

	باکتری‌ها و پلاسمیدها	ویژگی‌ها	منبع
باکتری	<i>Escherichia coli</i> MC1061	araD139, Δ(ara, leu)7697, ΔlacX74, galU, galK, hsr, hsm+, strA	MoBiTec GmbH, Germany
	pBU003	Cm <sup>r</sup> Em <sup>r</sup> ; <i>Escherichia coli-lactobacillus</i> shuttle vector; 4.947 kb	منتشر نشده
	pFUM003	Cm <sup>r</sup> Em <sup>r</sup> ; pBU003 containing Usp45; 5.028 kb	در این مطالعه



شکل ۱. محل قرار گیری سایت کلونینگ usp45 (فلش صورتی) و ساخت پلاسمید نوترکیب

سپس واکنش لیگاسیون برای اتصال قطعه usp45 و پلاسمید برش خورده انجام گرفت. پس از ترانسفرم، از کلندی‌های رشد یافته ۱۲ کلندی انتخاب شده و با روش Colony

## نتایج

در این مطالعه به جای ساخت یک پارچه قطعه usp45 که بسیار هزینه‌بر بود از روش معمول اتصال زنجیره پیرو و پیشو و استفاده شد که هزینه‌ها حدود ۶ برابر کاهش پیدا کرد. در روش کلونینگ الیگومرهای مکمل شده قطعه مورد نظر به صورت دو قطعه پیرو و پیشو و طراحی و سپس با توجه به مکمل بودن دو قطعه به هم متصل شدند. جایگزینی قطعه usp45 به صورت شماتیک در شکل ۱ نشان داده شد.

الکتروفورز قطعه مکمل شده usp45 روی ژل آگارز ۱ درصد نشان داد که قطعه به طول ۸۱ جفت باز، به خوبی جفت شده است (شکل ۲). سپس هضم آنزیمی قطعه usp45 با *Sal*I و *Xba*I انجام شد.

هضم آنزیمی پلاسمید pBU003 با *Sal*I و *Xba*I بر روی ژل آگارز ۱٪ مشاهده و تایید شد (شکل ۳ الف). وزن مولکولی پلاسمید برش خورده برابر با 4950 bp می‌باشد و غلظتی برابر با ۱۰ نانوگرم در میکرولیتر برای آن تعیین شد.


الکتروفورز پلاسمیدهای تخلیص شده بر روی ژل آگاراز ۱٪ نشان داد که هر چهار پلاسمید سایز یکسان و مورد انتظار را داشتند.

در آنالیز آنزیمی جهت تایید انتقال ژن usp45 برشی در ناحیه I و Sal I و Xho I انجام شد که منجر به خروج قطعه کلون شده از پلاسمید pBU003 شد که می‌تواند شاهدی بر صحبت انتقال توالی سیگنال usp45 باشد (شکل ۳-ب).


قطعه جایگزین شده تعیین توالی گردید. نتیجه تعیین توالی با استفاده از برنامه n-blast (vr XML2) جهت تطابق با ژن usp45 گزارش شده به شماره EU382094.1 در بانک ژنی بررسی شد و ۱۰۰٪ همپوشانی نشان داد.

پس از اثبات انتقال قطعه جدید در پلاسمید pBU003 نام آن به pFUM003 تغییر یافت (FUM برگرفته از دانشگاه فردوسی مشهد است که محل انجام آزمایش است).

PCR بررسی گردید. از میان کلنی‌های مثبت ۴ کلنی انتخاب و پس از کشت شبانه در دمای ۳۷ درجه استخراج پلاسمید شد.



شکل ۲. نتیجه مکمل کردن قطعات پیرو و پیشرو 81bp بر روی ژل آگاراز٪. ستون ۱: قطعه usp45. ستون ۲: نشانگر وزنی 100 bp



شکل ۳: الف: هضم آنزیمی pbu003 در ناحیه Sal I-Xho I ستون S3: نشانگر وزنی 1kb ستون S2: پلاسمید برش نخورده ستون S1: پلاسمید برش خورده با Sal I و Xho I . ب: هضم آنزیمی با Sal I-Xho I برای خروج قطعه usp45 ستون S3: نشانگر وزنی 1kb. ستون S2: پلاسمید هضم شده ستون S1: نشانگر وزنی 100bp

[3] Deirde PL, Elke KA. The use and effects of lactic acid bacteria in malting and brewing with their relationships to antifungal activity myocotoxins and gushig: A Review. *J Inst Brew* 2004; 110: 163-180.

[4] Borerro J, Jimenez J. Protein expression vector and secretion signal peptide optimization to drive the production, secretion, and functional expression of the bacteriocin enterocin A in lactic acid bacteria. *J Biotechnol* 2011; 156: 76-86.

[5] Mierau I, Kleerebezem M. 10 years of the nisin-controlled gene expression system (NICE) in *Lactococcus lactis*. *J Appl Microbiol Biotechnol* 2005; 68: 705-717.

[6] Le Loire Y, Azevedo V, Oliveira S, Freitas A, Miyoshi A, Bermúdez-Humarán A, et al. Protein secretion in *Lactococcus lactis*: an efficient way to increase the overall heterologous protein production, 2005. *Microbiol Cell Factories* 2005; 4: 2.

[7] Majidzadeh R. Investigate the possibility of producing recombinant probiotic strains with the ability to degradation plant phytate in broiler chickens [dissertation]. Anim Sci Ferdowsi Univ 2010. (Persian).

[8] van der Vossen JM, van der Lelie D, Venema G. Isolation and characterization of streptococcus cremoris Wg2-Specific Promoters. *Appl Environ Microbiol* 1978; 53: 2452-2457.

[9] Lutful Kabir SM. The role of probiotics in the poultry industry. *Int Mol science* 2009; 10: 3531-3546.

[10] van Rooijen JR, Gasson MJ, de Vos WM. Characterization of the *Lactococcus lactis* lactose operon promoter: contribution of flanking sequences and LacR repressor to promoter activity. *J Bacteriol* 1992; 174: 2273-2280.

[11] Borerro J, Jimenez J. Use of the usp45 lactococcal secretion signal sequence to drive the secretion and functional expression of enterococcal bacteriocins in *Lactococcus lactis*. *J Appl Genet Mol Biotechnol* 2011; 89: 131-143.

[12] Leiloir Y, Nouaille S, Commissaire J, Brétigny L, Gruss A, Langella P. Signal peptide and propeptide optimization for heterologous protein secretion in *Lactococcus lactis*. *Appl Environ Microbiol* 2001; 67: 4119-4127.

[13] Luerce TD, Azevedo MS, Leblance JG, Azevedo V, Miyoshi A, Pontes DS. Recombinant *Lactococcus lactis* fails to secrete bovine chymosine. *Bioengineered* 2014; 5: 363-370.

[14] Shigemori S, Oshiro K, Wang P, Yamamoto Y, Wang Y, Sato T, et al. Generation of dipeptidyl peptidase-IV-inhibiting peptides from  $\beta$ -Lactoglobulin secreted by *Lactococcus lactis*. *Biomed Res Intern* 2014; 2014: 393598.

[15] Neef J, Milder JF, Koedijk D, Klaassense M, Heeziuse E, van Strijp J, et al. Versatile vector suite for the extracytoplasmic production and purification of heterologous His-tagged proteins in *Lactococcus lactis*. *Appl Microbiol Biotechnol* 2015; 99: 9037-9048.

[16] Higuchi R, Krummel B, Saiki R. A general method of in vitro preparation and specific mutagenesis of DNA fragments: study of protein and DNA interactions". *Nucleic Acids Res* 1988; 16: 7351-7367.

[17] Sambrook J, Russell DW. Molecular Cloning: A laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, 2001.

[18] van Asseldonk M, Rutten G, Oteman M, Siezen RJ, de Vos WM, Simons G. Cloning of usp45, a gene encoding a secreted protein from *Lactococcus lactis* subsp, *lactis*. *Gene* 1990; 95: 155-160.

## بحث و نتیجه‌گیری

در این مطالعه انتقال سیگنال سکونس usp45 در پلاسمید pBU003 با موفقیت انجام شد که بر اساس مطالعات گذشته پیش‌بینی می‌شود افروزن usp45 به این پلاسمید باعث افزایش بیان و همچنین افزایش ترشح خارج سلولی پروتئین‌های نوترکیب در آزمایشات بیان پروتئین شود [۱۱، ۱۲، ۱۸]. در نتایج به دست آمده حاصل از مقایسه سیگنال پیتیدهای مختلف از قبیل SP310, usp45, SpNuc و E7 در بакتری لاكتوکوکوس لاکتیس مشخص شد که usp45 دارای بهترین بازده برای ترشح پروتئین می‌باشد [۶].

این مطالعه یک گام بنیادین برای بهبود بیان پروتئین در تحقیقات مربوط به تولید پروپیوتیک‌های نوترکیب است به طوریکه این پلاسمید احتمالاً سلول را قادر به ترشح خارج سلول خواهد کرد که یکی از اهداف ساخت این نوع پروپیوتیک‌ها است. پیشنهاد می‌شود که در تحقیقات بعدی کارآیی پلاسمید ساخته شده در ترشح خارج سلولی پروتئین بیان شده، با پلاسمید فاقد توالی سیگنال و پلاسمیدهایی با توالی سیگنال غیر از usp45 مقایسه گردد که توسط نویسندها در حال انجام می‌باشد.

## تشکر و قدردانی

نویسندها این مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بخاطر حمایتهای مالی از طرح و همچنین از مدیریت آزمایشگاه رئیسیک گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد بخاطر همکاری صمیمانه کمال تشکر و سپاسگزاری را دارند.

## منابع

[1] Crawford JS. Probiotic in animal nutrition. Proceeding of Arcansas Nutrition Conference 1979; PP;45-55

[2] Afshar Mazandaran N, Rajab A. Probiotics and their application in animal nutrition. Noorbakhsh publish 2002. (Persian).

# Construction of pFUM003 expression vector with extracellular secretion properties

Bahareh Pakbaten (M.Sc), Reza Majidzadeh Heravi (Ph.D)<sup>\*</sup>, Hassan Kermanshahi (Ph.D), Mohammad Hadi Sekhavati (Ph.D), Ali Javadmanesh (Ph.D)

I – Dept. of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

(Received: 23 Oct 2015; Accepted: 22 Feb 2016)

**Introduction:** Probiotics are beneficial microorganisms that have been used in food production as well as health promotion over the centuries. Recombinant probiotics are used to express and transfer native or recombinant molecules to mucosal surface of digestive tract to promote efficiency in nutrition and health. *Lactococcus lactis* is a potential candidate for the production of useful biological proteins. Since there is not any vector nominated for this bacterium to show the extracellular protein secretion properties, therefore the aim of this study was to increase the efficiency of expression and secretion of recombinant proteins by adding transmission signal peptide usp45 to pBU003.

**Materials and Methods:** usp45 signal peptide has 81 nucleotides and previous studies indicated that it can also cause increase in the gene expression. In this study, after synthesising usp45 signal sequence, it was ligated into pBU003. Then the vector was transformed to Ecoli (MC1061). The recombinant plasmid named pFUM003 after “plasmid Ferdowsi University of Mashhad 003”.

**Results:** Sequencing of recombinant plasmid containing usp45 showed that the plasmid had correct construction and the inserted sequence had exact match with the reference sequence (EU382094.1) reported in NCBI's GenBank.

**Conclusion:** The recombinant plasmid was named pFUM003. This recombinant plasmid structurally was correct and can be used to transmit into probiotics make them to benefit from extracellular protein production properties.

**Keywords:** Protein Sorting Signals, *lactococcus lactis*, Genetic vectors

\* Corresponding author. Tel: +98 51 38805747

rmajidzadeh@um.ac.ir