

تغییرات فشار داخل چشم ناشی از مصرف ساکسینیل کولین و آتراکوریوم قبل و بعد از عمل جراحی با بیهوشی عمومی

غلامرضا دارائی* (M.D)

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، بیمارستان امیرالمؤمنین(ع)، گروه چشم

خلاصه

سابقه و هدف: فشار داخل چشمی (IOP) فشاری است که در اثر ترشح مایع زلایه و تغییر حجم کروئید و تونوسیتی عضلات خارج چشمی ایجاد می‌شود. مقدار متوسط آن ۱۵ میلی‌متر جیوه است. عوامل زیادی روی IOP اثر می‌گذارند که سن، جنس و نوع داروی بیهوشی از جمله آنها می‌باشد. با توجه به این‌که افزایش IOP در حین عمل باعث عارضه خطربناک و گاهی جبران ناپذیر خونریزی ناگهانی از کروئید آتراکوریوم و ساکسینیل کولین (که در بیهوشی عمومی استفاده می‌شوند) روی IOP می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی بیماران ۵۰ سال و یا کمتر که برای عمل جراحی مراجعت کرده بودند انتخاب و افراد با زمینه‌های مؤثر بر IOP و سابقه عمل جراحی چشم حذف شدند. تعداد ۷۰ نمونه بدست آمد که در دو گروه همگن از نظر سن و جنس و سایر شرایط قرار گرفتند. یک گروه ساکسینیل کولین و گروه دیگر آتراکوریوم گرفتند. فشار چشم در سه مرحله قبل، حین و بعد از بیهوشی عمومی با تونومتر اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: تغییرات IOP در افرادی که آتراکوریوم گرفتند از مرحله اول به دوم ($P=0.714$) و از مرحله دوم به سوم ($P=0.44$) و از مرحله اول به سوم ($P=0.58$) معنی‌دار نبود. تغییرات IOP در گروه ساکسینیل کولین از مرحله اول به دوم ($P=0.002$) و از مرحله دوم به سوم ($P=0.001$) معنی‌دار بود و تغییرات از مرحله اول به سوم ($P=0.77$) معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: یافته‌های فوق نشان می‌دهند که ساکسینیل کولین (یک داروی دپولاریزان) باعث تغییرات بیشتری و آتراکوریوم (یک داروی غیردپولاریزان) تغییرات کمتری در فشار داخل چشم در حین عمل جراحی می‌شود.

واژه‌های کلیدی: فشار داخل چشم، بیهوشی عمومی، آتراکوریوم، ساکسینیل کولین

مقدمه

می‌شود [۶]. پرخون ترین لایه کره چشم کروئید می‌باشد. هنگام اعمال جراحی چشم وقتی چشم باز می‌شود فشار داخل آن به صفر می‌رسد. کاهش ناگهانی فشار چشم ممکن است منجر به خونریزی ناگهانی از کروئید (Expulsive hemorrhage) گردد [۲].

هر روز تعداد قابل توجهی از بیماران، مورد عمل جراحی چشم قرار می‌گیرند و یکی از عمدۀ ترین جراحی‌های چشم کاتاراكت است. افزایش یا کاهش ناگهانی فشار چشم باعث بروز ضایعات چشمی

بین ۵/۵ تا ۴۳/۷ میلیمتر جیوه کاهش پیدا می‌کند. از این رو، در جراحی‌های کوچک استفاده از ماسک حنجره‌ای ایمن تر است [۵].

با توجه به این که داروهای ساکسینیل کولین و آتراکوریوم در دسترس هستند و به تناب از آنها استفاده می‌شود در این مطالعه اثرات آنها روی تغییرات فشار چشم بررسی شد.

مواد و روش‌ها

بیماران ۷۰ بیمار با سن ۵۰ سال یا کمتر که در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۱۳۷۹ جهت عمل جراحی چشم و غیرچشمی به اطاق عمل بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) سمنان مراجعه کردند مورد مطالعه قرار گرفتند. افراد بالای ۵۰ سال به دلیل افزایش شانس هیپرتانسیون و آترواسکلروزیس و نیز افرادی که زمینه‌های مؤثر روی IOP مثل جراحی قبلی چشم و یا گلوكوم داشتند حذف شدند. همه بیماران در حین عمل در وضعیت خوابیده قرار داشتند.

روش کار. بیماران به دو گروه دریافت کننده آتراکوریوم (یک داروی شل‌کننده عضلانی غیر دپولاریزان) و گروه دریافت کننده ساکسینیل کولین (یک داروی شل‌کننده عضلانی دپولاریزان) تقسیم شدند و دو گروه از نظر سن، جنس و سایر شرایط همگن بودند. همه بیماران پیش داروی یکسان دریافت کردند و در همه آنها IOP چشم راست در سه مرحله؛ قبل از شروع بیهوشی، بعد از القاء بیهوشی ترجیحاً بعد از لوله‌گذاری و بعد از اتمام بیهوشی یا یک دستگاه شیوتزر اندازه‌گیری شد. میانگین سه بار اندازه‌گیری در هر بیمار به عنوان یافته آن بیمار در نظر گرفته شد.

سایر داروهای مورد نیاز برای القای بیهوشی مثل هالوتان، نسدونال، اپیوئید و N2O در دو گروه یکسان بودند (همه این داروها IOP را کم می‌کنند).

آنالیز آماری. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آزمون ۱ و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.

در اثر این عارضه فضای زیر رتین پر از خون خواهد شد و در صورتی که سریع درمان نشود رتین و محتويات چشم از محل برش جراحی خارج می‌گردد و چشم باز دست خواهد رفت. همچنین عمل جراحی روی چشم باز با فشار بالا محدودیت‌ها و مشکلات دیگری را در حین عمل ایجاد خواهد کرد. یکی از راه‌های مهم پیشگیری از این عارضه کاستن فشار داخل چشم قبل از شروع عمل می‌باشد. از آنجایی که داروهای بیهوشی روی فشار داخل چشم اثر دارند و با توجه به کثیر اعمال جراحی داخل چشم و جدی بودن عوارض فوق، در این مطالعه اثر رایج ترین داروهای مورد استفاده در هنگام بیهوشی عمومی شامل ساکسینیل کولین و آتراکوریوم روی تغییرات IOP بررسی شد.

ساکسینیل کولین حدود ۴-۶ دقیقه بعد از استفاده سبب افزایش IOP می‌دهد و فشار بعد از ۱۰-۲۰ دقیقه به حد نرمال می‌رسد. مکانیسم افزایش IOP واضح نیست ولی ممکن است بعلت انقباض میووفیبریل‌ها و یا انبساط گذرای عروق خونی کروئید باشد و بستگی به دوز، پاسخ تونیک عضلات خارج چشمی و یا اثر روی حجم کروئید دارد. به همین دلیل ساکسینیل کولین داده شده در طی بیهوشی ممکن است از نظر تئوری در بیرون ریختن محتويات داخل چشم بیماران با آسیب‌های باز نقش داشته باشد. [۱، ۲، ۳]. Libonati Bیهوشی ۷۳ بیمار با جراحی چشم باز که محتويات چشم بیرون نریخته و ساکسینیل کولین گرفته‌اند بررسی کرده و نتیجه‌گیری کرده که استفاده از ساکسینیل در بیماران با چشم باز با کنترل سریع القای بیهوشی که شامل یک پیش دارو و شل کننده غیر دپولاریزانیون می‌باشد یک روش قابل قبول است [۲].

محققین دیگر در سال ۱۹۹۶ با بررسی تغییرات IOP و پاسخ همودینامیک در حین استفاده از ماسک حنجره‌ای یا لوله تراشه در طی عمل کاتاراكت نشان دادند که در گروه بالوله تراشه فشار چشم سالم ۱۵ میلیمتر جیوه و فشار چشم بیمار ۱۳/۶ میلیمتر جیوه افزایش پیدا می‌کند و در گروه با ماسک حنجره‌ای فشار

نتایج

(P=۰/۵۸) معنی دار نبود.

۳- تغییرات IOP در افرادی که ساکسینیل کولین دریافت کرده بودند از مرحله اول به دوم (P=۰/۰۰۲) و از مرحله دوم به سوم (P=۰/۰۰۱) معنی دار بود ولی تغییرات IOP از مرحله اول به سوم معنی دار نبود (P=۰/۷۷). بین میانگین تغییرات IOP در دو گروه آتراکوریوم و ساکسینیل کولین از مرحله اول به دوم (P=۰/۰۵۸) و از مرحله دوم به سوم (P=۰/۰۵۷) و از مرحله اول به سوم (P=۰/۸۹) اختلاف معنی دار وجود نداشت (جدول ۱).

۴۶/۷ درصد استفاده کنندگان از آتراکوریوم و ۴۷/۵ درصد استفاده کنندگان از ساکسینیل کولین زن بودند. میانگین سنی افراد دریافت کننده ساکسینیل کولین ۳۳/۵۳ (حداکثر ۵۰ سال و حداقل ۱۳ سال) و افراد دریافت کننده آتراکوریوم ۳۲/۵۳ (حداکثر ۴۸ سال و حداقل ۱۵ سال) بود. نتیجه آزمون کای دو نشان داد که دو گروه از نظر سن و جنس همگن هستند.

۲- تغییرات IOP در افرادی که آتراکوریوم دریافت کرده بودند از مرحله اول به دوم (P=۰/۷۱۴)، از مرحله دوم به سوم (P=۰/۴۴) و از مرحله اول به سوم

جدول ۱. مقایسه میانگین و انحراف معیار تغییرات IOP قبل، حین و بعد از عمل جراحی در دو گروه آتراکوریوم و ساکسینیل کولین

نوع دارو	تعداد نمونه	تغییرات IOP از مرحله اول به سوم				تغییرات IOP از مرحله دوم به سوم				تغییرات IOP از مرحله اول به دوم			
		P-value	انحراف معیار	میانگین	P-value	انحراف معیار	میانگین	P-value	انحراف معیار	میانگین			
آتراکوریم	۳۰	۰/۸۹	۲/۷۹	۰/۲۸	۰/۰۵۷	۴/۳۸	۰/۶۳	۰/۰۵۸	۵/۱۲۷	۰/۳۷۴			
ساکسینیل کولین	۴۰	۳/۶۹	۰/۱۷		۵/۲۳	۰/۹۲			۵/۱۷	۲/۷۵			

ندارد.

فشار داخل چشمی در اثر عوامل زیادی تغییر می‌کند. افزایش فشار چشم در حین عمل باعث محدودیت، اشکال و گاهی عوارض جدی خواهد شد. در بیهوشی عمومی هدف از تجویز شل کننده‌های عضلانی لوله‌گذاری در نای است. برای شروع اثر سریع و فلنج کوتاه مدت عصبی عضلانی از ساکسینیل کولین که یک دپولاریزان است استفاده می‌شود. وقتی شروع اثر سریع لازم نیست از شل کننده غیر دپولاریزان استفاده می‌شود. دوز موثر ساکسینیل کولین mg/kg ۰/۵-۱/۵.

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که در گروه ساکسینیل کولین تغییرات فشار داخل چشم در مرحله دوم (حین عمل) نسبت به مرحله اول (قبل از بیهوشی) و مرحله سوم (بعد از بیهوشی) نسبت به مرحله دوم افزایش معنی داری داشته است ولی در گروه آتراکوریوم در هر سه مرحله افزایش فشار چشم معنی دار نبوده است. همچنین بین میانگین تغییرات IOP در دو گروه آتراکوریوم و ساکسینیل کولین از مرحله اول به دوم و از مرحله دوم به سوم و از مرحله اول به سوم اختلاف معنی دار وجود

جراحی به این قسمت‌های مهم افزایش خواهد یافت. این موضوع علاوه بر ایجاد محدودیت‌های قابل توجه در هنگام ترمیم پارگی، ممکن است منجر به ایجاد کاتاراکت در لنز شفاف، سوراخ شدن شبکیه و خونریزی کروئید شود. از این‌رو، بهتر است از ساکسینیل‌کولین که یک داروی دپولاریزان است در جراحی چشم باز و در مواردی که هنگام عمل به فشار داخل چشمی کمتری نیاز است استفاده نشود و از آتراکوریوم که یک داروی غیر دپولاریزان است و تغییرات فشار چشم ایجاد نمی‌کند استفاده شود.

به طور خلاصه، به منظور پیشگیری از عوارض افزایش فشار داخل چشم ناشی از مصرف ساکسینیل‌کولین در حین عمل جراحی چشم باز بهتر است از داروهای غیر دپولاریزان مثل آتراکوریوم که تغییراتی در فشار داخل چشم ایجاد نمی‌کنند استفاده شود.

تقدیر و تشکر

از آقای دکتر قربانی در بخش آمار و آقای دکتر لباف در بخش بیهودی و خانم دکتر میراج و خانم دکتر حبیبیان به دلیل همکاری بسی دریغ تشکر و قدردانی می‌شود.

منابع

- [1] Cook, J.H., The effect of suxamethonium, *Anaesthesia*, 36 (1981) 359-365.
- [2] Cunningham, A.J. and Barry, P., Intraocular pressure: physiology and implication for anaesthetic management, *Can. J. Anaesth.*, 33 (1986) 195.
- [3] Hall, S.C. Lerman, J., Should succinylcholine be used in child with an open eye injury and full stomach? *Anesth. Rev.*, 20 (1993) 98.
- [4] Indu, B., Batra, Y.K. and Puri, G.D., Nifedipine attenuates the intraocular

است و فلج عضله اسکلتی ناشی از آن ۵-۱۰ دقیقه طول می‌کشد و افزایش فشار ۶-۴ دقیقه بعد از تزریق ایجاد می‌شود و بعد از ۲۰-۱۰ دقیقه به حد نرمال می‌رسد [۱، ۳، ۴]. دوز شلکنده غیر دپولاریزان مثل آتراکوریوم ۰/۳-۰/۶ mg/kg است و این میزان به مدت ۳۵-۱۵ دقیقه شلی عضلانی ایجاد می‌کند [۱].

Libonati در مطالعه خود چنین به این نتیجه رسید که در اعمال جراحی چشم باز، استفاده از ساکسینیل‌کولین با کنترل سریع القاء بیهودی مشکلی ایجاد نخواهد کرد [۷]. در گزارش McGoldrick هیچ شواهدی مبنی بر بیرون ریختن محتويات چشم به علت اثر ساکسینیل‌کولین منتشر نشده است و از این نظر این دارو می‌تواند در چشم‌های باز استفاده شود [۸]. بر اساس نتایج مطالعات Kelly و Cook ساکسینیل‌کولین در طی ۵ دقیقه اول موجب حداکثر فشار داخل چشم می‌شود و بعد از ۲۰-۱۰ دقیقه فشار چشم به حد طبیعی می‌رسد [۱]. بعد از قطع عضلات خارج چشمی، باز هم ساکسینیل‌کولین باعث افزایش فشار چشم می‌شود [۵].

کوشش‌های Meyer و همکاران در مهار افزایش فشار داخل چشمی توسط ساکسینیل‌کولین موثر نبوده است در حالی که دیگران با استفاده از داروهای شلکنده غیر دپولاریزان افزایش فشار داخل چشم توسط ساکسینیل‌کولین را مهار کرده‌اند [۶، ۹، ۱۰]. از این رو موضوع هنوز اختلاف است.

علی‌رغم نظر Meyer و Libonati [۷، ۸] مبنی بر بی‌خطر بودن ساکسینیل‌کولین در چشم باز، مطالعه ما نشان می‌دهد که به ساکسینیل‌کولین به طور معنی داری فشار داخل چشم را افزایش می‌دهد. حتی اگر هم طبق نظر McGoldrick ساکسینیل‌کولین سبب خروج محتويات چشم نشود، افزایش فشار در حین عمل جراحی سبب کم عمق شدن و یا پهن شدن اطاق قدامی و نزدیکتر شدن لنز و قسمت‌های سگمان قدامی به محل پارگی قرنیه و یا نزدیک شدن شبکیه و کروئید به محل پارگی اسکلرا شده و خطر برخورد وسایل و سوزن

- Anesthesiology, 62 (1985) 637.
- [8] McGoldrick, K.E., The open globe:is an alternative to succinylcholine necessary? J.Clin. Anesth., 5 (1993) 1-4.
- [9] Miller, R.D., Way, W.L. and Hickey, R.F., Inhibition of succinylcholine induced increased intraocular pressure by non depolarizing muscle relaxants, Anesthesiology, 29 (1986) 123.
- [10] Miller, R.D., Anesthesia, Fifth Edition, Churchill Livigstone, New York, 2000, pp: 177-2178.
- [11] Murphy, D.F., Anesthesia and intraocular pressure, Anesthesiology, 64 (1985) 520.
- pressure response to intubation following succinylcholine, Can. J. Anaesth., 36 (1989) 269.
- [5] Kelly, R.E., Dinner, M., Turner, L.S., Haik, B., Abramsom, D.H. and Daines, P., Succinylcholine increases intraocular pressure in the human eye with the extraocular muscle detached, Anaesthesiology, 79 (1993) 948-952.
- [6] Konchigeri, H.N., Lee, Y.K., Venugopalk, H.M., Effect of pancuronium on intraocular pressure changes induced by succinylcholine, Can. J. Anaesth., 26 (1979) 479.
- [7] Libonati, M.M., Leahy, J.J. Ellison, N., The use of succinylcholine in open eye surgery,

Intraocular pressure changes due to Succinyl-Choline and Atracurium usage before and after operation with general anesthesia

G.R. Daraie* (M.D)

Dept. of ophthalmology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan Iran.

Introduction. Intraocular pressure (IOP) produced by the aqueous humor secretion, choroidal volume changes and tonicity of extraocular muscles. This pressure is 15 mmHg. Many factors such as age, sex and anesthetic drugs affect on IOP. Elevation of IOP during the eye operation restricts the operation and sometimes causes a serious complication of expulsive hemorrhage. In this study, the effects of two muscle relaxants Atracurium and Succinyl-Choline drugs usually used in general anesthesia on IOP were compared.

Materials and Methods. 70 candidates for operation; at the age of 50Y/O or less were selected. They were divided in two groups. The first group received Atracurium and the second ones Succinyl-Choline. IOP was measured three times; before, during and after the operation by Schiotz tonometer.

Results. IOP changes in the Atracurium group from the first to the second stage ($P=0.71$), the second to the third stage ($P= 0.44$) and the first to the third stage ($P=0.58$) were not significant. IOP change in the Succinyl-Choline group from the first to the second stage ($P=0.002$) and the second to the third stage ($P= 0.001$) were significant, but from the first to the third stage ($P= 0.77$) were not.

Conclusion. Succinyl-Choline, the depolarizing muscle relaxant, causes more IOP changes in comparison with Atracurium, the non-depolarizing muscle relaxant, during the operation.

Keywords: Intraocular pressure; General anesthesia; Atracurium; Succinyl-Choline

* Fax: 0231-3324580; Tel: 0231-3324580