

ارزیابی دو روش هماگلوبیناسیون غیرمستقیم در تشخیص لیستریوز و مقایسه آنها با روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم

بیژن صدیقی مقدم *

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی، ایمنی شناسی و انگل شناسی

خلاصه

سابقه و هدف: باکتریومی با لیستریا منوستیوژن در زنان حامله می‌تواند به عوارض مختلف در جنین از جمله سقط منجر شود. گرچه تشخیص لیستریوز می‌تواند با کشت نمونه و جداسازی باکتری صورت گیرد ولی به دلیل وقت‌گیر بودن، راندمان پایین ناشی از تعداد کم باکتری و مشکل در تشخیص افتراقی از سایر باکتری‌ها در بسیاری از آزمایشگاه‌ها از این روش به طور معمول استفاده نمی‌شود. در مقابل، روش‌های سرولوژیک مختلفی به علت سرعت، مقرن به صرفه بودن و سهولت در تشخیص لیستریوز به کار گرفته می‌شود. در این مطالعه روش هماگلوبیناسیون غیرمستقیم (IHA) با استفاده از فراکشن I حاصل از ژل کروماتوگرافی آنتی‌زن خام حاصل از سوئیکاسیون پیکر باکتری و هم‌چنین IHA به روش پاتل طراحی و حساسیت و ویژگی آنها در تشخیص لیستریوز با روش IFA که معمول ترین روش در آزمایشگاه‌ها می‌باشد، مقایسه شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ۲۰۷ زن مشکوک به لیستریوز مراجعه کننده به دانشکده بهداشت دانشگاه تهران که حداقل یک سابقه سقط جنین داشتند از نظر آنتی‌بادی‌های ضدلیستریا منوستیوژن به روش IFA تحت بررسی قرار گرفتند.

از بین این افراد دو گروه انتخاب شدند، گروه اول شامل ۹۶ نفر بودند که با روش IHA با آنتی‌زن محلول در فراکشن I در مقابل ۵۱ فرد نرمال به عنوان شاهد که هیچ سابقه‌ای از لیستریوز نداشتند، تست شدند. گروه دوم شامل ۸۲ نفر بودند که با روش IHA پاتل در مقابل ۵۶ فرد نرمال به عنوان شاهد که هیچ سابقه‌ای از لیستریوز نداشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: در روش IFA (با حساسیت ۷۰٪ و ویژگی ۰/۵۰)، ۸۳/۵٪ افراد مورد مطالعه مثبت بودند. این بررسی نشان داد که آنتی‌زن خام لیستریا و هیچ یک از سه فراکشن آنتی‌زن محلول برای انجام تست IHA مناسب نیستند؛ اما با آنتی‌زن تهیه شده به روش پاتل و روش IHA پاتل تمام افراد تست شد: تیترهای مثبت $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{256}$ را نشان دادند که حساسیت و ویژگی آن نیز به ترتیب ۳۶٪ و ۹۴٪ به دست آمد.

نتیجه‌گیری: تازمان معمول شدن روش‌های جدیدتر تشخیصی، توصیه می‌کنیم تست IFA و IHA پاتل به دلیل ویژگی بالا به طور هم زمان جهت غربالگری انجام شود.

واژه‌های کلیدی: ایمونوفلورسانس غیرمستقیم، هماگلوبیناسیون غیرمستقیم، لیستریوز

مقدمه

است که انسان و طیف وسیعی از حیوانات اهلی و وحشی را آلوده می‌کند و معمولاً از طریق مواد غذایی

لیستریا منوستیوژن باکتری گرم مثبت، میله‌ای کوتاه

روش IFA مقایسه شد.

مواد و روش‌ها

بیماران. در این مطالعه ۲۰۷ زن مشکوک به لیستریوز مراجعه کننده به دانشکده بهداشت دانشگاه تهران که حداقل یک سابقه سقط جنین داشتند از نظر آنتی‌بادی‌های ضدلیستریا منوسیتوژن به روشن IFA تحت بررسی قرار گرفتند. از بین این افراد دو گروه انتخاب شدند: گروه اول شامل ۹۶ نفر بودند که با روش IHA با آنتی‌ژن محلول در فراکشن I در مقابل ۵۱ فرد نرمال به عنوان شاهد که هیچ سابقه‌ای از لیستریوز نداشتند، تست شدند. گروه دوم شامل ۸۲ نفر بودند که با روش IHA پاتل در مقابل ۵۶ فرد نرمال به عنوان شاهد که هیچ سابقه‌ای از لیستریوز نداشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

روش کار. از تمامی افراد، ۵ میلی‌لیتر خون گرفته و پس از جدا کردن سرم و جذب آنتی‌بادی‌های هتروفیل به IHA و IFA و IHA با فراکشن I آنتی‌ژن محلول، IHA پاتل آزمایش شدند. از آنجاکه سویه 1a لیستریا منوسیتوژن از سویه‌های اصلی ایجاد عفونت لیستریایی است در این مطالعه برای پیشگیری از خطأ در IFA و هر دو روش IHA از این سویه به عنوان آنتی‌ژن استفاده شد. در روش IFA از پیکر باکتری یعنی آنتی‌ژنهای سطحی استفاده و در نتیجه، آنتی‌بادی‌های علیه این شاخص سطحی ارزیابی گردید و لی در IHA از آنتی‌ژنهای محلول حاصل از لیز پیکر باکتری استفاده شد.

تست ایمونوفلورسانس غیرمستقیم IFA. این تست براساس روش Biegeleisen انجام شد [۱]. در این روش باکتری لیوفیلیزه لیستریا منوسیتوژن سویه 1a با ۵ میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی استریل، سوسپانسیون شده و بر روی محیط بلاد آگار در 37°C به مدت ۴۸ ساعت کشت شد. یک کلنی انتخاب و تحت همان شرایط، کشت مجدد داده شد. از کشت اخیر سوسپانسیون تهیه و رقت آن طوری تنظیم گردید که در هر میدان میکروسکوپ با بزرگنمایی هزار تعداد ۴۰ تا ۶۰ باکتری دیده شود. بر

آلوده منتقل می‌شود [۱۲]. از آنجاکه این باکتری یک پاتوژن داخل سلولی است، بیشتر موارد بیماری در افرادی اتفاق می‌افتد که سیستم ایمنی آنها آسیب دیده است. در زنان حامله باکتریمی می‌تواند از طریق جفت به جنین منتقل و باعث آبسه‌ها و گرانولوماهای منتشر در اندام‌های مختلف، منژیت یا باکتریمی در جنین، سقط جنین و یا زایمان پیش از موعد شود [۱۲،۵،۳].

تشخیص لیستریوز می‌تواند با کشت نمونه مواد غذایی و محیطی مشکوک یا نمونه‌های بالینی (خون، مایع نخاع، مدفوع، جفت، ترشحات واژن و...) صورت گیرد. گرچه به دلیل کم بودن تعداد باکتری و مشکل در تشخیص افتراقی از سایر باکتری‌ها در بسیاری از آزمایشگاه‌ها از این روش به طور معمول استفاده نمی‌شود. با این وجود، اضافه کردن برخی آنتی‌بیوتیک‌ها به محیط کشت یا روش‌های اختصاصی تغییل، این راندمان را افزایش می‌دهد. ذخیره‌سازی نمونه‌ها نیز در 4°C به مدت ۲-۸ هفته (Cold enrichment) گرچه راندمان جداسازی توسط کشت را افزایش می‌دهد اما برای نمونه‌های بالینی، وقت‌گیر است [۵]. روش‌های سرولوژیک به علت سرعت، مقرن به صرفه بودن و سهولت با موفقیت نسبی در تشخیص لیستریوز به کار رفته است [۱۵، ۱۰، ۷، ۶]. اما تست‌های تثبیت کمپلمان و میکروآگلوتیناسیون به دلیل فقدان حساسیت کافی و واکنش متقاطع با سایر باکتری‌های گرم مشبت از اعتبار چندانی برخوردار نبوده است [۵]. تست IFA در برخی آزمایشگاه‌ها در ایران در حال حاضر انجام می‌شود اما حساسیت و ویژگی نتایج آن از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر متفاوت است.

در این مطالعه فراکشن‌های آنتی‌ژن محلول از طریق ستون کروماتوگرافی جدا و آنتی‌ژن محلول نیز به روش IHA پاتل تهیه شد. روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم IHA هم با فراکشن I آنتی‌ژن محلول و هم با آنتی‌ژن تهیه شده به روش پاتل، طراحی و سرم بیماران مشکوک به لیستریوز با این دو روش بررسی شدند. هم‌چنین حساسیت و ویژگی این روش‌ها در تشخیص لیستریوز با

ژل فیلتراسیون. به منظور جداسازی فراکشن‌های آنتی‌زن‌های محلول از ستون $2/5 \times 80 \text{ cm}$ و سفادکس G100 (فارماسیا) استفاده شد. به طور خلاصه، به $20 \text{ pH}=7/2$ گرم پودر سفادکس با مقدار کافی بافر PBS با $\text{pH}=7/2$ حاوی سدیم آزاد اضافه شد. پس از متورم شدن ذرات ژل با چند بار شستشو، ذرات شکسته شده حذف گردید. سپس گاز موجود در ژل را با پمپ خلاء خارج و ژل به آرامی وارد ستون گردید تا به طور یکنواخت متراکم شود. در نهایت ستون، 48 ساعت با بافر PBS شستشو شد. در نهایت کارآیی ستون به کمک دکستران بلو مشخص گردید.

جداسازی فراکشن‌های محلول لیستریا. 10 ml از محلول تغليظ شده حاصل از سونیکاسیون لیستریا که در مرحله قبل تهیه شده بود بر روی این ستون برده شد. جريان خروجی (Flow rate) 10 ml/h تنظیم و هر 3 میلی‌لیتر مایع خروجی در یک لوله جمع آوری شد. بعد از 48 ساعت جذب نوری، محتوای هر لوله با UV اسپکتروفوتومتر در طول موج 280 nm قرائت شد و بر این اساس فراکشن‌های تشکیل دهنده هر پیک تعیین و در یک لوله آزمایش جمع و میزان پروتئین آن به روش بیوره تعیین گردید.

ثبت آنتی‌زن محلول بر روی گلبول قرمز گوسفتند. محلول آلسیورس شامل $20/5$ گرم دکسترون، 8 گرم سیترات سدیم، $55/0$ گرم اسید سیتریک، $4/2$ گرم کلرید سدیم و آب مقطر تا حجم یک لیتر تهیه و $\text{pH}=7/2$ محلول با فیلتر $22/0$ میکرومتر استریل و در 4°C نگهداری شد. خون گوسفتند را با محلول آلسیورس مخلوط (به نسبت $1:1$)، 3 بار با PBS با $\text{pH}=7/2$ شستشو و سوسپانسیون $5/2$ % از گلبول قرمز گوسفتند (sRBC) در PBS تهیه گردید. 2 میلی‌لیتر از سوسپانسیون $5/2$ % sRBC با 2 میلی‌لیتر اسید تانیک $1/3000$ (W/V) مخلوط و 30 دقیقه در 37°C انکوبه و سپس ساتریفیوژ شد تا اسید تانیک اضافی خارج شود. گلبول‌های تانه شده 3 بار با PBS شسته شد و در نهایت با

روی هر لام 10 قطره 20 میکرولیتری از این سوسپانسیون میکروبی با فاصله مشخص قرار داده و فیکس شدند تا زمان آزمایش، لام‌ها در 70°C -ذخیره شد. سرم بیماران به صورت رقت‌های متوالی $\frac{1}{400}, \frac{1}{200}, \frac{1}{100}$ و.... تهیه و هر رقت به یکی از گسترده‌های میکروبی روی هر لام اضافه شد. پس از 30 دقیقه آنکوباسیون در اتفاق تاریک و مرطوب، لام‌ها دو بار توسط PBS با $\text{pH}=7/2$ هر بار به مدت 5 دقیقه شستشو شد. سپس آنتی‌هیوم کوتزروگه با فلورسینین بر روی لام‌ها اضافه و پس از 30 دقیقه انکوباسیون در اتفاق تاریک و مرطوب مانند مرتبه قبل شستشو گردید. لام‌ها با میکروسکوپ فلورسانس مشاهده شدند. آخرین تیتری که حداقل 50% باکتری‌ها رنگ سبز درخشنان گرفته باشد مثبت تلقی شد.

تهیه آنتی‌زن محلول برای هماگلوبیناسیون غیرمستقیم IHA. یک کلنی از محیط کشت به 100 میلی‌متر محیط (Brain Heart infusion) BHI broth (BHI) در 37°C ۲۴ ساعت در 250 دور داری از دیقیقه قرار داده شد. 10 ml از این کشت به 10 لیتر از محیط کشت مایع BHI broth اضافه و انکوباسیون به مدت 24 ساعت با همان شرایط ادامه یافت. سپس $(V/V) 5/0$ % فتل اضافه و پس از 24 ساعت 20 دقیقه با دور rpm 4000 رسوب گیری شد. رسوب باکتریایی، 3 بار با سرم فیزیولوژی شستشو شد تا مواد اضافی حذف گردد. 20 گرم از رسوب باکتریایی در 100 میلی‌لیتر PBS با $\text{pH}=7/2$ سوسپانسیون شد. با سونیکاتور با قدرت 10 KC و 250 W و دامنه حرکتی پروب $18-20$ میکرون سوسپانسیون فوق 60 دقیقه در 20 KHz هر بار به مدت 3 دقیقه با فواصل 10 دقیقه در شرایط حمام یخ، سونیکه گردید. مایع حاصل از سونیکاسیون سانتریفیوژ (40 دقیقه، 4°C ، 10000 rpm) شده و محلول فوقانی به عنوان آنتی‌زن محلول استفاده شد. در مرحله بعد این آنتی‌زن محلول با استفاده از کیسه دیالیز (با Cut off 10) به کمک PEG 6000 در 4°C تغليظ شد. میزان پروتئین محلول نهایی به روش بیوره اندازه گیری شد که مقدار آن $5/6 \text{ mg/ml}$ بود.

مشخص به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. کنترل منفی شامل سرم یک فرد منفی به اضافه گلبول قرمز تانه شده و تانه نشده است که در این موارد نباید آگلوتیناسیون بین آنتی بادی های هتروفیل و گلبول قرمز دیده شود. کنترل های آزمایش نیز شامل مجاورت PBS با گلبول قرمز گوسفند تانه شده و تانه نشده است. پلیت ها به آرامی و به صورت افقی تکان داده شد تا سرم و گلبول های قرمز به طور یکنواخت محلوظ شوند. پلیت ها پس از ۲ ساعت انکوباسیون در دمای اتاق و پس از ۲۴ ساعت نگهداری در یخچال، بررسی شدند. بر حسب تشکیل توده یکنواختی از RBC تا رسوب کامل گلبول های قرمز در مرکز حفره، واکنش به ترتیب از +۴ تا منفی در نظر گرفته می شود.

روش آماری. از آزمون Z در سطح معنی داری ۵٪ برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.

نتایج

جدول شماره ۱ نتایج ارزیابی آنتی بادی به روش IFA را نشان می دهد. با این روش $\frac{۳۴}{۲۰۷}$ افراد مورد مطالعه منفی و $\frac{۱۷۳}{۲۰۷}$ آنها تیتر ۱ $\frac{۱}{۲۰۰}$ را نشان دادند.

در ژل کروماتوگرافی با ستون حاوی سفادکس G100 سه پیک آنتی ژنیک (شکل ۱) به دست آمد که پس از یکی کردن و تغليظ هر فراکشن میزان پروتئین آنها اندازه گیری شد. مقدار پروتئین برای فراکشن های I، II، III به ترتیب $\frac{۱}{۸}\frac{۱}{۲}\frac{۰}{۰}\frac{۰}$ میکروگرم در میلی لیتر بود. جهت تعیین غلظت مناسب هر آنتی ژن در یک سری آزمایشات مقدماتی مقدار مناسبی از آنتی ژن خام و رقت های متوالی Twofold از هر فراکشن روی گلبول قرمز گوسفند ثبت شد و با سرم ۲۴ بیماری که تیتر مشبت با IFA داشتند تست شد. بهترین غلظت برای فراکشن I، ۲۲۵ میکروگرم در میلی لیتر و برای فراکشن های II و III به ترتیب همان غلظت اولیه ۳۰۰ و ۲۰۰ میکروگرم در میلی لیتر بود. آنتی ژن خام نیز به دلیل ایجاد همولیز ناشی از لیستریولیزین برای انجام این

اضافه کردن ۲ میلی لیتر PBS با $\frac{۱}{۲}\text{pH}=۷$ به حجم اولیه یعنی سوسپانسیون $\frac{۱}{۵}\text{٪}$ رسانده شد. ۲ میلی لیتر از آنتی ژن های محلول (فراکشن های III و II و I) به صورت جداگانه به این سوسپانسیون اضافه و ۳۰ دقیقه در ۳۷°C قرار گرفت. بعد از این مدت گلبول ها ۲ بار با PBS شسته و در مرتبه سوم شستشو با PBS با $\frac{۱}{۲}\text{pH}=۷$ حاوی ۱٪ سرم دكمپلمان خرگوش پس از ۱۰ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق انجام و رسوب حاصل به حجم اولیه رسانده شد تا سوسپانسیون $\frac{۱}{۵}\text{٪}$ به دست آید. جهت کنترل شرایط، تمام مراحل فوق با PBS به جای اسید تانیک نیز انجام شد.

تهیه آنتی ژن به روش پاتل. این روش بر اساس گزارشات قبلی انجام شد [۱۵]. یک کلنسی از باکتری بر روی پلیت حاوی قند (۱٪/۰.۰۰ گلوكز) به مدت ۲۴ ساعت در ۳۰°C کشت داده شد. کلنسی ها از سطح پلیت با ۵ میلی لیتر سرم فیزیولوژی جدا و ۳ بار شستشو گردید و سوسپانسیونی از $۱۰^۶-۱۰^۵$ باکتری در میلی متر تهیه و پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون در ۳۰°C مانند روش قبل سونیکه شد. مایع حاصل از لیز باکتری ها سانتریفیوز (۱۵۰۰ rpm ، ۴°C ، ۴۰ دقیقه) و مایع رویی به عنوان آنتی ژن استفاده شد. میزان پروتئین محلول به روش sRBC بیوره ۱ میکروگرم در میلی لیتر بود. آنتی ژن بر روی sRBC با تراکم ۲/۵٪ بدون استفاده از اسید تانیک ثبت و بقیه مراحل مانند روش قبل انجام شد.

هم‌آگلوتیناسیون غیرمستقیم IHA. ۱۰۰ میکرولیتر سرم هر بیمار ابتدا به نسبت ۱:۱ با $\frac{۱}{۲}\text{pH}=۷$ PBS رقيق و به مدت ۳۰ دقیقه در ۳۷°C دكمپلمان گردید. سپس به آن از گلبول های قرمز شسته شده گوسفند به نسبت ۱:۱ اضافه و ۳۰ دقیقه در ۳۷°C انکوبه شد تا آنتی بادی های هتروفیل جذب شوند. پس از سانتریفیوز، سرم رویی جهت تست IHA استفاده شد.

در پلیت های ۹۶ حفره ای U شکل ۲۵ لامبدا، سرم بیمار با رقت های متوالی $\frac{۱}{۱}\frac{۱}{۱}\frac{۱}{۱}\frac{۱}{۱}\frac{۱}{۱}\frac{۱}{۱}\frac{۱}{۱}\frac{۱}{۱}$ و بالاتر تهیه شد. به هر حفره ۲۵ میکرولیتر گلبول قرمز گوسفند پوشانده شده با آنتی ژن اضافه گردید. از یک سرم مشبت با تیتر


جدول ۱. فراوانی تیتر آنتی بادی در تست ایمونوفلورسانس غیرمستقیم در خانم‌های مشکوک به لیستریوز با حداقل یک سابقه سقط جنین

تیتر آنتی بادی	منفی	۱/۲۰۰	۱/۴۰۰	۱/۸۰۰	۱/۱۶۰۰	۱/۳۲۰۰	۱/۶۴۰۰	تعداد افراد مشکوک به لیستریوز $N=207$
۳	۲۰	۴۲	۳۶	۴۱	۳۱	۳۴		

جدول ۲. فراوانی تیتر آنتی بادی در تست هماگلوبیناسیون غیرمستقیم با آنتیژن محلول فراکشن I و روش پاتل در خانم‌های مشکوک به لیستریوز با حداقل یک سابقه سقط جنین

تیتر آنتی بادی	منفی	۱/۴	۱/۸	۱/۱۶	۱/۳۲	۱/۶۴	۱/۱۲۸	۱/۲۵۶	تعداد افراد مشکوک به لیستریوز $n=96$	گروه شاهد $n=51$	افراد مشکوک به لیستریوز $n=82$	پاتل IHA $n=56$
۰	۱	۱۶	۳۵	۱۲	۲۵	۴	۲					
۰	۰	۶	۲۳	۱۲	۲	۲	۵					
۱	۱۶	۱۳	۲۱	۱۷	۱۱	۳	۰					
۰	۰	۳	۵	۱۷	۱۲	۱۳	۶					

نیز ۸/۹٪ تیتر منفی و ۹۰/۲٪ تیترهای $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{64}$ را نشان دادند. آزمون آماری نشان داد که اختلاف بین گروه سالم و مشکوک به بیماری از نظر آماری معنی دار نیست. سرم ۸۲ فرد مشکوک و ۵۶ فرد نرمال به روش هماگلوبیناسیون غیرمستقیم پاتل بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که افراد مشکوک به لیستریوز، تیترهای $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{256}$ دارند. در بین افراد سالم ($n=56$) نیز $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{28$ ۲۸٪ تیتر منفی و $\frac{5}{۵۶}۰=۹۰٪$ تیترهای $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{64}$ را نشان دادند. آزمون Z با دامنه اطمینان ۹۵٪ نشان داد که این اختلاف بین گروه سالم و مشکوک به بیماری معنی دار است ($P<0.05$).



شکل ۱. ژل فیلتراسیون با استفاده از ستون سفادکس G100 و فراکشن‌های به دست آمده از آنتیژن خام پیکره لیستریزا متوسیتوژن

تست مناسب نبود. فراکشن‌های II و III به دلیل این که با سرم بیمارانی که با IFA مثبت بودند تیتر منفی یا پایین نشان دادند، از مطالعه کنار گذاشته شدند و با گلبول‌های کوت شده با فراکشن I، مطالعه ادامه داده شد. سرم ۹۶ فرد مشکوک و ۵۱ فرد نرمال به روش هماگلوبیناسیون غیرمستقیم با فراکشن I بررسی شد. نتایج بررسی نشان می‌دهد در بین افراد مشکوک به لیستریوز، $۲/۱٪$ منفی و $۹۷/۹٪$ دارای تیترهای $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{128}$ بودند. این در حالی است که افراد سالم ($n=51$)

بحث

در IHA با فراکشن I افراد مشکوک و سالم به ترتیب $۹۷/۹٪$ و $۹۰/۲٪$ تیترهای $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{128}$ را نشان دادند از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. این امر به دلیل شاخص‌های آگلوبیناسیون دهنده موجود در فراکشن I است که آنتیژن‌هایی را شامل می‌شود که واکنش‌های متقطع را در بر می‌گیرد. بنابراین فراکشن I در تشخیص، قابلیت بالایی ندارد.

در IHA انجام شده با آنتیژن روش پاتل بین گروه

سرولوژیک خواهند شد. با این وجود تا زمان معمول شدن روش‌های نوین تشخیصی توصیه می‌شود تست IFA به دلیل حساسیت بالاتر جهت غربالگری و IHA پاتل به دلیل ویژگی بالا جهت تأیید به طور هم زمان انجام شود. این امر گرچه نیاز به تبحر بیشتر در تفسیر نتایج سرولوژی دارد، اما می‌تواند به تشخیص دقیق‌تر بیماری منجر شود.

تقدیر و تشکر

این تحقیق با حمایت مادی و علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

منابع

- [1] Biegeleisen, J.Z., Immunofluorescence technique in the retrospective diagnosis, *J. Bacteriol.*, 87 (1964) 1257-58.
- [2] Bourry, A., Cochard, T. and Poutrel, B., Serological diagnosis of bovin, caprin, and ovin mastitis caused by *Listeria monocytogenes* by using an enzyme-linked immunosorbent assay, *J. Clin. Microbiol.*, 35 (1998) 1606-1608.
- [3] Bruce, G., Listeriosis, *JAMA*, 261 (1989) 1313-1330.
- [4] Chen, W., Li, D., Paulus, B., Wilson, I. and Chadwick, V.S., Detection of *Listeria monocytogenes* by polymerase chain reaction in intestinal mucosal biopsies from patients with inflammatory bowel disease and controls, *J. Gastroenterol. Hepatol.*, 15 (2000) 1145-1150.
- [5] Davis, B.D., Dulbecco, R., Eisen, H.N. and Ginsberg, H.S., *Microbiology*, 4th Edition, Lippencott Co., Philadelphia, 1990, pp.

بیماران مشکوک به لیستریوز و افراد سالم اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت. این امر نشان می‌دهد که شرایط کشت و روش تهیه آنتی‌ژن محلول در ترکیب آنتی‌ژنیک مؤثر است. تغییر در شرایط کشت و تهیه آنتی‌ژن باعث کاهش در شاخص‌هایی شده است که در فراکشن I روی گلبول‌ها کوت شده بودند و ترکیبات آنتی‌ژنیک دیگری به ویژه شاخص‌های دارای پلی‌ساقارید دخالت می‌کنند زیرا در روش پاتل بدون نیاز به اسیدتاییک این آنتی‌ژن‌ها مستقیماً روی گلبول ثبت شدن و اختلاف معنی‌دار بین IHA فراکشن I و IHA پاتل نیز وجود آنتی‌ژن‌های متفاوت از هم را در این دو روش تأیید می‌کند. عدم همبستگی بین IFA با IHA فراکشن I و IHA پاتل نیز مؤید تفاوت در ماهیت آنتی‌ژنیک در هر کدام از این تست‌های است. این عدم همبستگی قبلًاً توسط Seeliger در تفسیر تست‌های ثبت کمپلمان و آگلوتیناسیون در تشخیص لیستریوز گزارش شده است. در این مطالعه حساسیت و ویژگی IFA به ترتیب ۷۰٪ و ۵۰٪ بود در حالی که حساسیت IHA پاتل ۳۶٪ و ویژگی آن بالا و ۹۴٪ است.

در ضمن آنتی‌ژن خام Crude lysate برای انجام تست هماگلوتیناسیون مناسب نیست. این امر به دلیل غلظت نسبتاً بالای لیستریولیزین موجود است که در هنگام کوت کردن آنتی‌ژن باعث لیز گلبول قرمز می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در تست IFA گرچه حساسیت بالاست اما ویژگی آن پایین است و روش IHA پاتل با وجود ویژگی بالا حساسیت چندانی در تشخیص لیستریوز ندارد. این امر نشان می‌دهد که با وجود این که در ایران تست IFA در تشخیص به کار می‌رود به نظر می‌رسد روش‌های دقیق‌تری برای تشخیص این بیماری باید به کار رود. در حال حاضر مطالعات وسیعی برای استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز [۱۱۸، ۱۱۹]، PCR-الیزا [۱۲۰]، استفاده از آنتی‌بادی منوکلونال [۱۲۱]، الیزا [۱۲۲] و DNA هیبریداسیون [۱۲۳] در حال انجام است. قابل پیش‌بینی است که روش‌های فوق به تدریج جایگزین روش‌های قراردادی باکتریولوژیک و

- [11] Krasovskii, V.V., Pokhil, S.L., Limanskii, O.I. and Timchenko, E.N., Development and approbation of polymerase chain reaction for detection of pathogen in Listeria infection, *Klin. Lab. Diagn.*, 6 (2000) 37-41.
- [12] Robert, E., Presence and persistence of *Listeria monocytogenes* in food and water, *Food Technol.*, April (1988) 162-164.
- [13] Scheu, P., Gasch, A. and Bergouf, K., Rapid detection of *Listeria monocytogenes* by PCR-ELISA, *Applied Microbiol.*, 26 (1999) 416-420.
- [14] Solve, M., Boel, J., and Norrung, B., Evaluation of a monoclonal antibody able to detect live *Listeria monocytogenes* and *Listeria innocua*, *Int. J. Food Microbiol.*, 57 (2000) 219-224.
- [15] Tripolitova, A.A., Indirect haemagglutination test for demonstrating antibodies to *Listeria*, *J. Veterinary*, 26 (1955) 74-77.
- [6] Delvallez, M., Purification of a surface-specific soluble antigen from *Listeria monocytogenesis*, *Infect. Immun.*, 25 (1979) 971-973.
- [7] Grad, W., Clinical laboratory methods and diagnosis, 8th edition, Mosby, New York, 1980.
- [8] Jaton, K., Sahli, R. and Bille, J., Development of polymerase chain reaction assay for detection of *Listeria monocytogenes* in clinical cerebrospinal fluid samples, *J. Clin. Microbiol.*, 30 (1992) 1931-1936.
- [9] Kerdahi, K.F. and Istefanson, P.F., Rapid determination of *Listeria monocytogenes* by automated enzyme-linked immunoassay and nonradioactive DNA probe, *J. AOAC. Int.*, 83 (2000) 86-88.
- [10] Khan M.A., Immunofluorescent identification of *Listeria monocytogenes*, *Zentralbl Bakteriol Parasitenkd Infektionskr, Hygi Abta.*, 239 (1977) 62-69.

Evaluating two indirect hemagglutination methods in diagnosis of listeriosis in comparison with indirect immunoflourecens

B. Sedighi Moghaddam (M.Sc)

Dept. of Microbiology, Parasitology and Immunology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Introduction: Bacterimia resulted from *Listeria monocytogenes* leads to various complications including abortion. While culturing the specimen is a crucial method in diagnosing of listeriosis, it has low sensitivity (because of the few number of bacteria in specimens) and takes long time. Serological methods are used routinely in many diagnostic laboratories because of improved time and sensitivity.

Materials and methods: IHA (indirect hemagglutination) was performed using fraction 1, obtained from gel chromatography of sonicated *listeria monocytogenes* crude antigens. IHA through potel's method was carried on. Sensitivity and specificity of these methods compared with current IFA (immunoflourecens assay) in diagnosing the Listeriosis. The titers of antibody against *Listeria monocytogenes* were determined in serums of 207 women having at least one abortion. Among this group serums of 96 women by IHA with soluble antigens in fraction 1 and 82 women by IHA with soluble antigen in potel's method were tested.

Results: In IFA (sensitivity 70% and specificity 50%), 83.5% had valuable titers of antibody. Neither crude antigen nor three fractions were suitable for IHA, but all 82 serums (potel's method) showing 1/4 to 1/256 titers (sensitivity 36% and specificity 96%).

Conclusion: IFA is the most current method but, because of high sensitivity and low specificity a more confident method is required. This study shows antigenic fractions of *listeria monocytogenes* are not suitable for IHA, while changing the condition of culture in potel's method leads to the applicable antigen for IHA. Lack of correlation between IFA and potel's IHA indicate that the nature of antigens are different in both methods. Thus it is recommended to use IFA for screening and simultaneously potel's IHA (because of high specificity).

Keywords: Indirect immunoflourecens (IFA); Indirect hemagglutination (IHA); Listeriosis

* Fax: 0231-3331551; Tel: 0231-3332080; E.mail: sedighimoghaddam@yahoo.com