

## بررسی وضعیت سطح لیپیدهای سرم و اختلالات آن در جمعیت ۷۰-۳۰ ساله استان سمنان

- مجتبی ملک<sup>۱</sup> (M.D)، راهب قربانی<sup>۲</sup> (Ph.D)، علی رشیدی پور<sup>۳</sup> (Ph.D)، رحیمه اسکندریان<sup>۴\*</sup> (M.D)
- ۱- دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات غدد (فیروزگر)
- ۲- دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی
- ۳- دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی
- ۴- دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز آموزشی درمانی فاطمیه، گروه داخلی

### چکیده

سابقه و هدف: بیماری‌های قلبی شایع‌ترین علت مورتالیتی و موربیدیتی در جامعه کنونی است. اختلالات چربی خون یکی از زمینه‌های اساسی بیماری عروق کرونر می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی جامع اختلالات چربی در جامعه شهری و روستایی استان سمنان بود تا با بهره‌برداری از این اطلاعات و طرح‌بیزی برنامه‌های مداخله‌ای بعدی بتوان سطح سلامت جامعه را ارتقا داد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه اپیدمیولوژیک به صورت مقطعی بر روی افراد ۳۰-۷۰ ساله استان سمنان در سال ۱۳۸۴ انجام شد. نمونه‌گیری به روش مرحله‌ای و در شهرستان‌های سمنان، دامغان، شهرکرد و گرمسار انجام شد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه انجام گرفت. سپس با راهنمائی قبلی نمونه‌گیری با ناشستائی ۱۲ ساعته جهت اندازه‌گیری سطح سرمی تری‌گلیسرید، کلسترول، HDL و LDL در جنس زن و مرد و در جامعه شهری و روستایی استان انجام شد.

یافته‌ها: در بررسی ۳۷۹۹ نفر میانگین سنی نمونه‌ها  $41 \pm 10$  سال و  $44/6$  درصد آن‌ها مرد بودند. تری‌گلیسرید بالا در  $29/1$  درصد، LDL بالا در  $11/8$  درصد، HDL پائین در  $30/7$  درصد افراد مورد مطالعه دیده شد. شیوع انواع اختلالات چربی در شهر شهرکرد شایع‌تر بود.

نتیجه‌گیری: شیوع اختلالات چربی در استان سمنان بالا است. بنابراین، برنامه‌های آموزشی و پیش‌گیری جامع درباره اختلالات چربی و بیماری‌های وابسته به آن ضروری است.

واژه‌های کلیدی: لیپیدها، کلسترول با چگالی بالا، تری‌گلیسریدها، کلسترول با چگالی پائین، جمعیت شهری، جمعیت روستایی، افزایش چربی‌های خون، سمنان

### مقدمه

بیماری‌های قلبی شایع‌ترین علت مورتالیتی و موربیدیتی در جامعه کنونی است. در دو دهه اخیر توزیع جغرافیایی بیماری‌های قلبی تغییر کرده و لذا سازمان بهداشت جهانی پیش‌گیری از این بیماری‌ها در کشورهای در حال توسعه جز

تری‌گلیسیرید ۱۳۲ و متوسط HDL-C ۵۳ بود [۱۵] در بررسی دیگری این میزان در اصفهان و استان مرکزی در ۳۰/۶ درصد زنان و ۳۵/۸ درصد مردان در جامعه شهری و در ۲۹/۶ درصد زنان و ۳۱/۲ درصد مردان در اصفهان و در ۴۶/۶ درصد زنان و ۲۲/۹ درصد مردان در شهرها و ۲۱/۶ درصد زنان و ۳۲/۵ درصد مردان LDL بالادر روستاهای استان مرکزی داشتند. ۱۹/۳۵ زنان و ۲۹/۶ درصد مردان در شهر و ۱۷/۱ درصد زنان و ۲۷/۷ درصد مردان در روستا در اصفهان و ۲۵/۶ درصد مردان و ۳۵/۹ درصد مردان در شهر و ۱۹/۶ درصد زنان و ۲۶/۴ درصد مردان در روستاهای استان مرکزی HDL پایین داشتند. در مورد تری‌گلیسیرید بالا در اصفهان در حدود ۳۳ درصد موارد و در مرکزی در ۲۷ درصد جامعه شهری و ۱۹ درصد جامعه روستایی دیده شد [۱۶]. در فنلاند نیز بهدلیل آمار بالای مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی پس از مطالعات و برنامه‌های مداخله‌ای وسیع توانستند ابتلاء به بیماری قلبی و مرگ ناشی از آن را ۶۳ درصد کاهش دهند [۱۷] و برنامه مشابه دیگری نیز در کشورهای دیگر شروع شد. با توجه به آمار بالای اختلال چربی در استان‌های دیگر کشور ما و مشاهده اختلال لیپید بالا در مراجعه بیماران کلینیک‌های درمانی و نداشتن اطلاعات در این زمینه، هدف این مطالعه بررسی جامع اختلال چربی در جامعه شهری و روستائی در استان بود و امیدواریم که این اطلاعات در جهت برنامه‌ریزی برای مداخله و بالا بردن سطح سلامت جامعه مفید باشد.

## مواد و روش‌ها

این مطالعه اپیدمیولوژیک به صورت مقطعی در جامعه شهری و روستائی استان سمنان در افراد ۳۰-۷۰ ساله انجام شد. نمونه‌گیری به روش چندمرحله‌ای (خوشای-تصادفی) شد. اطلاعات آماری از چهار شهر استان شامل شهرهای سمنان، دامغان، شهرود و گرمسار و همچنین روستاهای انجام شد. تعداد نمونه بر اساس مطالعه مقدماتی و بر اساس شیوع ۲۵ درصد و دقت ۱/۵ درصد و اطمینان ۹۵ درصد ۳۲۰۲ نفر

می‌باشد. اکنون معتقدند که اختلالات چربی خون هم در ایجاد و رشد پلاک اترواسکلروز و هم در پاره شدن و ایجاد ترومبوس نقش دارد. هم‌چنین اختلالات چربی خون موجب افزایش سطح فیبرینوزن و تجمع پلاکتی نیز می‌گردد [۲]. افزایش سطح LDL یک فاکتور شناخته شده اترواسکلروزی می‌باشد و HDL پائین نیز یک ریسک فاکتور مستقل و مهم در ایجاد بیماری قلبی است [۵-۳]. تری‌گلیسیرید (TG) بالا در اکثر بیماری‌های مربوط به اختلال چربی نقش مهمی دارد. علت افزایش TG ناشی از هیپرتری‌گلیسیریدی فامیلیال و یا ثانویه به مصرف سیگار، الكل، دیابت، چاقی، مصرف کربوهیدرات بالا، نارسایی کلیه و استرس زیاد می‌باشد. نیکوتین ناشی از مصرف سیگار باعث ترشح آدرنالین گردیده که موجب افزایش غلظت سرمی اسیدهای چرب می‌گردد و این اسیدهای چرب موجب سنتز کبدی و ترشح تری‌گلیسیرید می‌گردد. اترواسکلروز توسط فاکتورهای مختلف از قبیل مصرف چربی، الكل، فشارخون بالا، دیابت و مصرف سیگار ایجاد می‌گردد و با توجه به این که زمینه‌های اختلال لیپیدی در مردان بالاتر است در زنان دلایل دیگری نیز مانند عدم تحرک عامل مهمی می‌باشد [۶-۹].

مطالعات متعددی سطوح مختلف چربی خون را در جوامع گوناگون بررسی کردند در اصفهان در افراد بالای ۱۹ سال، هیپرکلسترولمی در ۳۳ درصد، تری‌گلیسیرید بالا در ۲۵ درصد و HDL-C پائین در ۴۹ درصد افراد دیده شد [۱۰]. در مطالعه‌ای در کشور مکزیک، شیوع هیپرتری‌گلیسیرید در ۴۰/۵ درصد مردان و در ۱۶ درصد زنان و HDL-C پائین در ۴۶/۲ درصد مردان و ۲۷/۸ درصد زنان و کلسترول بالا در ۱۱/۲ درصد افراد دیده شد [۱۱]. در کشورهای ترکیه [۱۲] و کشورهای آسیائی مثل بنگلادش و پاکستان [۱۳] نیز نتایج مشابه مکریک بوده است. در نیپال که در آن میزان افزایش LDL در ۵ درصد و HDL پائین در ۲۳ درصد تری‌گلیسیرید بالا در ۷۰ درصد موارد دیده شده است [۱۴]. در بررسی دیگری در هندوستان متوسط توتال کلسترول ۱۹۰،

انجامید. پس از جمع آوری داده‌ها و آماده شدن جواب آزمایشات، تمامی داده‌ها در نرم‌افزار SPSS وارد گردید و با استفاده از آزمون‌های *t*-student، نسبت و کای اسکوئر و آنالیز واریانس یک‌طرفه در سطح معنی‌داری ۵ درصد، تحلیل داده‌ها انجام گرفت.

قبل از شروع کار، طرح در کمیته اخلاق مطرح و تایید گردید و جهت کلیه افراد مورد مطالعه طرح توضیح داده شد و در صورت تمایل وارد طرح گردیدند.

## نتایج

از ۳۷۹۹ نفر مورد بررسی، ۲۳/۸ درصد نمونه‌ها از سمنان و ۲۱/۱ درصد از دامغان ۲۱/۰ درصد از گرمسار ۳۴/۱ درصد از شاهروд بودند. میانگین سنی نمونه‌ها  $41 \pm 10/2$  سال و  $44/6$  درصد آن‌ها مرد بودند. در جدول ۱ اطلاعات پایه‌ای افراد شامل توزیع فراوانی سنی، جنس و محل سکونت دیده می‌شود.

میانگین و انحراف معیار LDL، TG و HDL و کلسترول توتال به تفکیک سن و جنس در جمعیت ۳۰-۷۰ ساله استان سمنان در سال ۱۳۸۴ جدول ۲ نشان داده شده است.

میزان TG قبل از ۵۰ سالگی در مردان بالاتر بوده ( $p=0/01$ ) و در سن بین ۵۹-۵۰ سالگی در زنان بالاتر بوده ( $p=0/003$ ) و پس از آن تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت ( $p=0/086$ ). میزان LDL در تمام سنین در زنان به صورت معنی‌داری بالاتر از مردان بود ( $p=0/001$ ). میزان HDL قبل از ۵۰ سالگی در زنان بالاتر از مردان بوده ( $p=0/001$ ) و بعد از آن تفاوت معنی‌داری ندارد ( $p=0/101$ ). میانگین کلسترول در سنین بالاتر از ۵۰ سال بین زن و مرد تفاوت معنی‌دار بود ( $p=0/001$ ).

در این بررسی همچنین میانگین و انحراف معیار TG، LDL و HDL و کلسترول در شهر و روستاهای سمنان و دامغان و گرمسار و شاهروд نیز بررسی گردید (جدول-۳). میانگین TG در سمنان ( $p=0/013$ ) و گرمسار ( $p=0/023$ ) بین روستائیان و شهرنشینان اختلاف معنی‌دار داشت.

تعیین شد. اما چون نمونه‌گیری چندمرحله‌ای بود ۳۷۹۹ نفر مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس جمعیت شهری و روستایی هر شهرستان تعداد نمونه‌های آن تعیین شد. با استفاده از خانوارهای مراکز بهداشتی ۷۶۰ سرخوشه به روش سیستماتیک انتخاب شد و در هر سرخوشه به سمت چپ (در صورت مواجهه با آپارتمان به سمت بالا) تا ۵ خانوار واجد شرایط بررسی شدند. به این صورت که در صورت وجود فرد ۳۰-۷۰ ساله در خانوار یک نفر به طور تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه تحقیق برای وی تکمیل شد و در صورت عدم وجود فرد واجد شرایط، یا عدم تمایل جهت شرکت در طرح، خانوار دیگر با همان قاعده انتخاب شدند. افرادی که تحت درمان داروهای پایین آورنده چربی بودند نیز وارد مطالعه شدند. خانمهای حامله و زنان شیرده از مطالعه خارج شدند. پس از تکمیل پرسش‌نامه، معرفی نامه‌ای به فرد منتخب داده شد تا به آزمایشگاه مشخص (قبلاً در هر شهر با آزمایشگاه معینی برای انجام آزمایش‌های طرح هماهنگی شده بود) در سطح شهر مراجعه و آزمایش‌های لازم انجام شود. آزمایش‌ها با ناشتاپی ۱۲ ساعته انجام شد. جهت آزمایش تری گلیسرید و کلسترول از دستگاه اتوآنالیزر Lysis ساخت کشور سوئیس و با کیت Man و به روش آزمایش‌تکنیک end point انجام شد. آزمایش LDL کلسترول توتال با همان دستگاه اندازه‌گیری شد. میزان LDL در صورت تری گلیسرید کمتر از ۴۰۰ میلی‌گرم با فرمول  $\text{F} = \frac{\text{LDL}}{\text{Total}} \times 100$  محاسبه گردید و در صورت تری گلیسرید بیشتر از ۴۰۰ میلی‌گرم با کیت Zest انجام شد. در این بررسی میانگین و انحراف معیار TG، LDL و HDL و کلسترول به تفکیک سن و جنس و به تفکیک شهر و روستا انجام شد و سطوح مختلف کلسترول و تری گلیسرید و HDL و LDL در جنس زن و مرد اندازه‌گیری شد. تقسیم‌بندی سطوح مختلف لیپید بر اساس ATP III بود [۶]. کنترل کیفی دستگاهها ابتدا و در حین و انتها انجام گردید. آزمایشات با صحت  $r=0/995$  و دقت  $c.v<4.0\%$  انجام شد. جمع آوری داده‌ها از مهر ۱۳۸۴ لغایت بهمن ۱۳۸۴ به طول

جدول ۱. توزیع فراوانی سن، جنس و محل سکونت در استان سمنان

شهرود		گرمسار		دامغان		سمنان		محل سکونت	
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	متغیر	
۴۳/۲	۵۶۰	۴۹/۵	۲۹۵	۴۶/۱	۳۷۱	۴۰/۹	۳۶۹	زن	جنس
۵۶/۸	۷۳۵	۵۰/۵	۴۰۳	۵۳/۸	۴۲۲	۵۹/۱	۵۳۴		
۲۴/۱	۴۴۲	۲۸/۹	۲۲۱	۲۲/۹	۲۷۲	۲۳/۸	۲۰۵		
۲۷/۷	۳۵۹	۳۰/۷	۲۴۵	۲۲/۸	۲۶۲	۳۳/۳	۳۰۱		
۲۴/۷	۳۲۰	۲۷/۳	۲۱۸	۲۴	۱۹۳	۱۹/۶	۱۷۷		
۱۳/۵	۱۷۴	۱۲/۱	۱۰۴	۹/۳	۷۵	۱۲/۳	۱۲۰		
۶۲/۱	۸۰۴	۷۵/۸	۶۰۵	۷۵/۶	۶۰۷	۷۷/۴	۶۶۹	شهر	محل سکونت
۳۷/۹	۴۹۱	۲۴/۲	۱۹۳	۲۴/۴	۱۹۶	۲۲/۶	۲۰۴	روستا	
۴۵/۵۲±۱۰/۲۳	۴۶/۶۴±۹/۸۹	۴۵/۳۱±۹/۲۲	۴۵/۳۰±۹/۷۸	شهر					
۴۶/۰۵±۱۰/۶۸	۴۶/۸۸±۱۰/۰۵	۴۵/۳۰±۱۰/۴۴	۴۵/۷۶±۱۰/۸۲	روستا					
۰/۳۸۲	۰/۷۷۵	۰/۷۴۲	۰/۵۸۵	P-value					

جدول ۲. میانگین و انحراف معیار TG, LDL و HDL و کلسترول به تفکیک سن و جنس در جمعیت ۳۰-۷۰ ساله استان سمنان در سال ۱۳۸۴

کلسترول		HDL		LDL		TG		تعداد	جنس	سن (سال)
میانگین	انحراف معیار									
۴۳/۶	۱۹۱/۷	۷/۴	۴۹/۵	۴۵/۲	۱۱۸/۰	۸۲/۸	۱۴۶/۷	۷۳۸	زن	۳۰-۳۹
۴۳/۶	۱۸۷/۹	۵/۶	۴۷/۱	۳۲/۳	۱۱۱/۹	۱۰۱/۲	۱۷۵/۳	۵۱۲	مرد	
۰/۲۰۵		<۰/۰۰۱		۰/۰۰۴		<۰/۰۰۱		--	P Value	
۳۷/۸	۱۹۵/۶	۲۹/۹	۵۱/۴	۳۲/۵	۱۱۹/۲	۸۴/۷	۱۶۴/۶	۶۵۶	زن	
۳۹/۷	۱۹۲/۴	۹/۷	۴۸/۰	۳۲/۴	۱۱۲/۱	۱۱۲/۶	۱۸۶/۹	۵۱۲	مرد	
۰/۰۵		<۰/۰۰۱		۰/۰۰۱		۰/۰۱۰		--	P Value	
۴۳/۴	۲۱۴/۴	۹/۳	۴۸/۶	۳۲/۷	۱۳۱/۵	۱۰۸/۶	۱۹۳/۵	۴۹۷	زن	۴۰-۴۹
۳۷/۹	۱۹۲/۷	۲۳/۱	۴۹/۰	۳۰/۶	۱۱۴/۰	۹۸/۷	۱۷۵/۴	۴۱۱	مرد	
<۰/۰۰۱		۰/۱۰۱		<۰/۰۰۱		۰/۰۰۳		--	P Value	
۵۳/۱	۲۲۲/۵	۸/۵	۴۸/۶	۴۱/۳	۱۳۸/۰	۹۲/۳	۱۷۷/۲	۲۱۲	زن	
۶۴/۵	۱۹۸/۱	۲۸/۳	۴۹/۳	۵۰/۲	۱۲۱/۲	۱۰۷/۴	۱۷۱/۵	۲۶۰	مرد	≥۶۰

بود ( $p=0/001$ ) LDL بالا در زنان به صورت معنی داری بالاتر از آقایان ( $p=0/001$ ) و HDL پایین در زنان به صورت واضح بالاتر از آقایان ( $p=0/001$ ) و تریگلیسرید کمتر از ۲۰۰ میلی گرم در زنان بیشتر و بالای ۲۰۰ در مردان بیشتر بود ( $p=0/001$ ).

میانگین کلسترول فقط در سمنان و HDL ( $p=0/001$ ) فقط در شهرود (۰/۰۰۷) و LDL فقط در سمنان ( $p=0/023$ ) بین روستائیان و شهرنشینان معنی دار بود. سطوح مختلف کلسترول و تریگلیسرید و LDL, HDL, بر اساس جنسیت آنالیز گردید (جدول ۴) و مشخص گردید کلسترول بالا در زنان به صورت معنی داری بالاتر از آقایان

جدول ۳. میانگین و انحراف معیار TG, LDL و HDL و کلسترول در جمعیت ۷۰-۳۰ ساله استان سمنان به تفکیک شهری و روستائی

LDL میلی گرم در دسی لیتر		HDL میلی گرم در دسی لیتر		کلسترول میلی گرم در دسی لیتر		TG میلی گرم در دسی لیتر		تعداد	محل زندگی	شهرستان
انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین			
۲۷/۹	۱۱۷/۴	۳۱/۶	۴۱/۹	۴۸/۳	۱۹۵/۶	۸۸/۵	۱۷۳/۲	۶۹۹	شهر	سمنان
۲۶/۸	۱۲۴/۲	۶/۳	۴۹/۱	۵۱/۲	۲۰۸/۵	۱۱۱/۰	۱۹۴/۳	۲۰۴	روستا	
۲۷/۷	۱۱۸/۹	۲۷/۹	۵۱/۲	۴۹/۲	۱۹۸/۵	۹۴/۴	۱۷۷/۹	۹۰۳	کل	
۰/۰۲۳		۰/۲۲۱		۰/۰۰۱		۰/۰۱۳		--	P Value	
۲۸/۴	۱۱۱/۶	۲۲/۰	۵۰/۹	۴۷/۴	۱۹۳/۸	۱۰۷/۱	۱۹۹/۵	۶۰۷	شهر	
۲۸/۹	۱۱۰/۹	۳/۰	۴۹/۶	۴۱/۱	۱۹۰/۸	۱۰۸/۴	۱۸۶/۲	۱۹۶	روستا	
۲۸/۵	۱۱۱/۴	۱۹/۲	۵۰/۶	۴۶/۰	۱۹۳/۰	۱۰۷/۵	۱۹۶/۳	۸۰۳	کل	
۰/۷۸۴		۰/۳۸۷		۰/۴۳۰		۰/۱۳۱		--	P Value	دامغان
۴۵/۸	۱۱۱/۹	۹/۴	۵۰/۳	۳۷/۸	۱۸۹/۳	۹۹/۰	۱۷۶/۷	۶۰۵	شهر	
۲۸/۰	۱۱۳/۹	۲/۹	۴۹/۵	۳۵/۲	۱۸۷/۳	۹۶/۲	۱۵۸/۱	۱۹۳	روستا	
۴۲/۲	۱۱۲/۴	۸/۳	۵۰/۱	۳۷/۲	۱۸۸/۸	۹۸/۶	۱۷۲/۲	۷۹۸	کل	
۰/۵۶۹		۰/۰۵۲		۰/۰۲۱		۰/۰۲۳		--	P Value	
۳۹/۲	۱۳۱/۰	۹/۹	۴۶/۵	۴۲/۶	۲۰۲/۹	۹۰/۱	۱۵۳/۴	۸۰۴	شهر	
۲۷/۲	۱۲۷/۸	۷/۷	۴۵/۱	۴۳/۵	۲۰۵/۸	۹۴/۰	۱۴۹/۱	۴۹۱	روستا	گرمسار
۲۸/۰	۱۲۹/۰	۹/۱	۴۶/۰	۴۳/۰	۲۰۴/۰	۹۱/۶	۱۵۱/۷	۱۲۹۵	کل	
۰/۱۲۷		۰/۰۰۷		۰/۲۲۳		۰/۴۱۳		--	P Value	

جدول ۴. توزیع سطوح مختلف کلسترول و تریگلیسرید و LDL، HDL به تفکیک جنسیت در جمعیت ۷۰-۳۰ ساله استان سمنان در سال ۱۳۸۴

P Value	جمع		مرد		زن		جنسیت	متغیر	
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد			
<0.001	۵۶/۲	۲۱۲۶	۶۲/۱	۱۰۵۳	۵۱/۵	۱۰۸۳	<۲۰۰	کلسترول میلی گرم در دسی لیتر	
	۵۹/۷	۱۱۲۹	۲۷/۰	۴۵۸	۳۱/۹	۶۷۱	۲۰۰-۲۳۹		
	۱۴/۱	۵۳۴	۱۰/۹	۱۸۴	۱۶/۶	۲۵۰	≥۲۴۰		
<0.001	۳۲/۳	۱۲۲۸	۳۸/۱	۶۴۵	۲۷/۷	۵۸۳	<۱۰۰	LDL میلی گرم در دسی لیتر	
	۳۲/۰	۱۲۱۶	۳۲/۱	۵۴۴	۳۱/۹	۶۷۲	۱۰۰-۱۲۹		
	۲۳/۹	۹۰۷	۲۱/۳	۳۶۱	۲۶/۰	۵۴۶	۱۳۰-۱۵۹		
	۹/۰	۳۴۱	۶/۴	۱۰۹	۱۱/۰	۲۳۲	۱۶۰-۱۸۹		
<0.001	۲/۸	۱۰۷	۲/۱	۳۶	۳/۴	۷۱	≥۱۹۰	HDL میلی گرم در دسی لیتر	
	۳۰/۷	۱۱۶۸	۸/۷	۱۴۸	۴۸/۵	۱۰۲۰	غیر نرمال*		
	۶۹/۳	۲۶۳۱	۹۱/۳	۱۵۴۷	۵۱/۵	۱۰۸۴	نرمال		
<0.001	۵۱/۸	۱۹۶۶	۴۹/۶	۸۴۰	۵۳/۵	۱۱۲۶	<۱۵۰	TG میلی گرم در دسی لیتر	
	۱۹/۰	۷۲۲۳	۱۸/۰	۳۰۵	۱۹/۹	۴۱۸	۱۵۰-۱۹۹		
	۱۳/۰	۴۹۵	۱۲/۵	۲۲۸	۱۲/۷	۲۶۷	۲۰۰-۲۴۹		
	۱۴/۸	۵۶۴	۱۷/۴	۲۹۵	۱۲/۸	۲۶۹	۲۵۰-۴۹۹		
	۱/۳	۵۱	۱/۶	۲۷	۱/۱	۲۴	≥۵۰۰		

\* کمتر از ۴۰ برای مردان و کمتر از ۵۰ برای زنان HDL

[۱۶]. در مطالعه قند و لیپید تهران در ۳۱ درصد آقایان و ۱۳ درصد خانم‌ها HDL پائین دیده شد (که از نظر جنسی با مطالعه ما تفاوت معنی‌داری دارد [۱۸] اما در بعضی از کشورها این میزان بسیار بالاتر است، از جمله در مکریک که در ۵۳ درصد مردان و ۲۶ درصد زنان دیده شد [۱۲]. در ترکیه [۱۳] نیز این نسبت بالا بود. در مطالعه نیپال ۲۳/۳ درصد [۱۵] و در هندوستان ۵۴/۹ درصد [۱] موارد HDL پائین داشتند که در مردان بالاتر از زنان بود. با توجه به این اختلاف واضح شیوع و اختلاف جنسی واضح عواملی از قبیل فاکتورهای ژنتیکی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. مصرف بالای کربوهیدرات‌ساده یک دلیل مهم دیگر افزایش تری‌گلیسرید و HDL پائین است [۱۶]. علت اختلاف واضح از نظر جنسی می‌تواند به چند دلیل باشد: چاقی و افزایش BMI که در خانم‌ها شیوع بالاتری داشته است و افزایش چاقی شکمی در خانم‌ها و سن بالاتر گروه انتخاب شده نسبت به مطالعات دیگر و عدم تفاوت در میزان تحرک در این افراد می‌تواند دلیل اصلی این اختلاف باشد.

در مورد انواع اختلالات چربی در جامعه شهری و روستائی در اکثر موارد اختلاف واضح در مورد LDL بود که در جمعیت روستایی شهر سمنان بالاتر بود و این بر خلاف تصور بود و نشان می‌دهد که عاملی غیر از فعالیت بدنی و تحرک جسمانی از جمله تغذیه نقش اساسی در بروز این مشکل دارد.

اختلال لیپید به خصوص هیپرتری‌گلیسریدی و HDL پائین در استان سمنان شایع می‌باشد. شیوع LDL بالا در این استان نسبت به مطالعات شهرهای دیگر پائین‌تر بود ولی نسبت به بسیاری از کشورها بالاتر بود. با توجه به این که اختلالات چربی یکی از زمینه‌های اصلی اترواسکلروز می‌باشد، بنابراین ریشه‌یابی و برنامه‌ریزی برای اقدامات پیش‌گیری از جمله آگاهی به افراد جامعه از طریق رسانه‌های عمومی و مراکز بهداشتی و درمانی در مورد انجام آزمایشات بهموقعاً و شناسائی افراد در معرض خطر و آموزش‌های لازم مانند انجام

## بحث و نتیجه‌گیری

در این بررسی مشخص گردید تری‌گلیسرید بالا در ۲۹/۱ درصد، LDL بالا در ۱۱/۸ درصد، HDL پائین در ۳۰/۷ درصد در استان سمنان دیده شد. شایع‌ترین اختلال در استان HDL پائین بود. شیوع انواع اختلالات چربی در شهر شاهرود شایع‌تر بود.

شیوع LDL بالا در مطالعه ما ۱۱/۸ درصد (در زنان ۱۴/۴ درصد و در مردان ۸/۵ درصد) بود. در استان اصفهان بالای ۳۰ درصد و در مردان بالاتر از زنان بود ولی در روستاهای استان در زنان بالاتر بود. در استان مرکزی شیوع در جامعه شهری حدود ۳۰ درصد و در زنان بالاتر از مردان در جامعه روستایی بالای ۴۰ درصد و در زنان بالاتر از مردان بود [۱۶]. در کشور نیپال میزان LDL بالا در ۵ درصد موارد وجود داشت و در مردان بالاتر از زنان بود [۱۵] و در مطالعه‌ای در هندوستان ۳۷ درصد LDL بالا داشتند [۱].

در مطالعه ما در اکثر موارد LDL بالا به صورت ایزوله می‌باشد. بنابراین، عوامل ایجادکننده LDL بالا در این استان هم‌خوانی زیادی با علل HDL پائین و یا تری‌گلیسرید بالا ندارد. تری‌گلیسرید بالا در ۲۹/۱ درصد در استان سمنان دیده شد در حالی که این میزان در استان مرکزی کمتر از ۳۰ درصد و در اصفهان حدود ۳۵ درصد بود [۱۶]. شیوع هیپرتری‌گلیسریدی در مکزیک در ۳۳ درصد موارد [۱۲] و در کشورهای آسیائی مثل بنگلادش، پاکستان و ترکیه [۱۴، ۱۳] نیز شیوع مشابه می‌باشد ولی در بررسی نیپال در ۳۱/۵ درصد [۱۵] و در هندوستان در ۳۰/۶ درصد دیده شد [۱]. با توجه به مورد فوق به نظر می‌رسد فاکتورهای ژنتیکی و فاکتورهای محیطی از قبیل مصرف کربوهیدرات، غذاهای محتوی چربی، مصرف تتبکو و میزان تحرک بدنی در استان‌های دیگر ایران و همچنین کشورهای مسلمان نشین دیگر مشابه است. نقاط بررش (cut off points) در کلیه مطالعات مشابه بود.

HDL پائین: در بررسی ما میزان HDL پائین ۳۱/۵ درصد بود. این میزان با نتایج اصفهان و مرکزی مطابقت دارد

- [3] Rubins HB. Triglycerides and coronary heart disease: implications of recent trials. *J Cardiovascular Risk* 2000; 7: 339-345.
- [4] Assmann G, Schulte H. Relation of high-density lipoprotein cholesterol and triglycerides to incidence of atherosclerotic coronary artery disease (the PROCAM experience). Prospective Cardiovascular Münster study. *Am J Cardiol* 1992; 70: 733-737.
- [5] Larsen ML. Hyper triglyceride and low HDL therapeutic consideration. *Curr Opin Lipidol* 1994; 5: 42-47.
- [6] Third report of the national cholesterol education program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III) final report. *Circulation* 2002; 106: 3143-3421.
- [7] Rubins HB, Robins SJ, Collins D, Fye CL, Anderson JW, Elam MB, et al. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. veterans affairs high-density lipoprotein cholesterol intervention trial study group. *N Engl J Med* 1999; 341: 410-418.
- [8] Bergstrand L, Olsson AG, Erikson U, Holme I, Johansson J, Kaijser L, et al. The relation of coronary and peripheral arterial disease to the severity of femoral atherosclerosis in hypercholesterolemia. *J Intern Med* 1994; 236: 367-375.
- [9] Danesh J, Collins R, Peto R. lipoprotein(a) and coronary heart disease; meta-analysis of prospective studies. *Circulation* 2000; 102: 1082-1085.
- [10] Sarrafzdegan N, Mohammadifard N, Rafiy M. A survey of prevalence of hypertriglyceridemia and low HDL in the population of Isfahan with age over 20 years. *Tehran Univ Med J* 1998; 56: 49-56. (Persian).
- [11] Aguilar-Salinas CA, Olaiz G, Valles V, Torres JM, Gómez Pérez FJ, Rull JA, et al. High prevalence of low HDL cholesterol concentrations and mixed hyperlipidemia in a mexican nationwide survey. *J Lipid Res* 2001; 42: 1298-1307.
- [12] Mahley RW, Palaoglu KE, Atak Z, Dawson-Pepin J, Langlois AM, Cheung V, et al. Turkish heart study: lipids, lipoproteins and apolipoproteins. *J Lipid Res* 1995; 36: 839-859.
- [13] Bhopal R, Unwin N, White M, Yallop J, Walker L, Alberti KG, et al. Heterogeneity of coronary heart disease risk factors in Indian, Pakistan, Bangladeshi and European origin populations: cross sectional study. *BMJ* 1999; 319: 215-220.
- [14] Limbu YR, Rai SK, Ono K, Kurokawa M, Yanagida JI, Rai G, et al. Lipid profile of adult Nepalese population. *Nepal Med Coll J* 2008; 10: 4-7.
- [15] Goswami K, Bandyopadhyay A. Lipid profile in middle class bengali population of kolkata. *Indian J Clin Biochem* 2003; 18: 127-130.
- [16] Mohamadi-fard N, Sadri GH, Sarraf-zadegan N, Baghaie AM, Shahrokh SH, Hoseini SH, et al. The prevalence of cardiovascular risk factors in rural and urban population of Isfahan & Markazi provinces. *JQUMS* 2003; 7: 5-14. (Persian).
- [17] Rose G. Causes of the trends and variations in CHD mortality in different countries. *Int J Epidemiol* 1989; 18: s174-179.
- [18] Azizi F, Raiszadeh F, Salehi P, Rahmani M, Emami H, Ghanbarian A, Hajipour R. Determination of serum HDL-C level in a Tehran urban population: the Tehran lipid and glucose study. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2002; 12: 80-89.

فعالیت‌های ورزشی منظم، کاهش وزن و کم کردن مصرف چربی به خصوص چربی‌های حیوانی ضروری می‌باشد. ارزش‌ها و محدودیت‌ها: این مطالعه نسبتاً بزرگ که در جامعه شهری و روستایی استان سمنان انجام شد مقدمه‌ای برای مطالعات وسیع‌تر در ایران به خصوص در استان‌های مختلف با فرهنگ غذایی و روش‌های زندگی مختلف می‌باشد. و هم‌چنین می‌تواند مقدمه‌ای برای بررسی‌های مداخله‌ای باشد. اما انجام آن در سطح استان به خصوص در روستاهای مشکلات اجرایی بالا از جمله عدم همکاری لازم در جهت اطلاعات افراد و هم‌چنین انجام آزمایش و ارسال آن به شهرها جهت انجام هم راه بود.

## تشکر و قدردانی

این طرح با حمایت مالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق استان سمنان انجام شده است، لذا بدین وسیله مجریان طرح مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسئولین محترم ذیرپط اعلام می‌دارند. هم‌چنین از کلیه همکارانی که در جمع‌آوری داده‌ها در شهرستان‌های سمنان، گرمسار، دامغان و شهرود همکاری نمودند، نهایت تشکر و قدردانی را اعلام می‌نمایند.

## منابع

- [1] Genest J, Libby P. Lipoprotein disorders and cardiovascular disease .in:bonow R,Mann D,Zipes D,Libby P.editors. Braunwalds heart disease .9nd ed .Sunders press .2012 p.975-990.
- [2] Braunwald E. Cardiology, the past the present and the future. *Am Coll Cardiol*, 2003; 42: 2031-2041.

# Serum lipids status and its disorders among 30-70 years old population in Semnan province, Iran

Mojtaba Malek (M.D)<sup>1</sup>, Raheb Ghorbani (Ph.D)<sup>2</sup>, Ali Rashidy-Pour (Ph.D)<sup>3</sup>, Rahimeh Askandarian (M.D)<sup>\*4</sup>  
1 - Endocrine Research Center (Firouzgar), Institute of Endocrinology and Metabolism, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 - Dept. of Social Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

3 - Research Center and Dept. of Physiology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

4 - Dept of Cardiology, Fatemeh Hospital, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

(Received: 14 Feb 2011 Accepted: 14 Oct 2011)

**Introduction:** Cardiovascular diseases are the most common cause of mortality and morbidity in new societies. Dyslipidemia is one of the main causes of coronary artery disease. Since there is not comprehensive information about this subject, we aimed to survey dyslipidemia in urban and rural communities/areas in Semnan province.

**Material & Methods:** An epidemiologic cross-sectional study was conducted among 3799 persons who were 30-70 years old in Semnan Province, Iran. Multistage cluster sampling was performed, and subjects were selected from urban and rural populations of Semnan, Shahroud, Garmsar and Damghan. Data were collected through questionnaires, then a blood sample was collected from selected patients with 12 hours fasting for evaluation of triglyceride (TG), cholesterol, high density lipoproteins (HDL) and low density lipoproteins (LDL) levels in urban and rural communities.

**Results:** Totally, 3799 persons enrolled in this study with mean age  $41 \pm 10.2$  years that 44.6% of them were male. High TG was seen in 29.1%, high LDL in 11.8% and low HDL in 30.7%. Prevalence of all kinds of dyslipidemia was higher in Shahroud.

**Conclusion:** In conclusion, prevalence of dyslipidemia among 30-70 years old was higher than expected. So that, comprehensive preventive and educational programmes on lipid disorders and related diseases are necessary.

**Keywords:** Lipids, HDL, LDL, Triglycerides, Cholesterol, Urban Population, Rural Population, Hyperlipidemias, Semnan

\* Corresponding author: Fax: +98 231 3322242; Tel: +98 9123310660  
rheskandarian@yahoo.com