

# بررسی اثرات ۳،۴ متیلن دی اکسی مت-آمفتامین (اکستازی) بر ساختار بافتی کبد در موش صحرایی

اعظم باقری حقیقی<sup>۱</sup> (M.Sc)، اسماعیل فتاحی<sup>۲\*</sup> (Ph.D)، محسن فروزانفر<sup>۳</sup> (Ph.D)، وحید حمایت خواه جهرمی<sup>۱</sup> (Ph.D)

۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، گروه زیست شناسی

۲- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت... آملی، گروه زیست شناسی

۳- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه زیست شناسی

## چکیده

سابقه و هدف: اکستازی یا متیلن دی اکسی مت-آمفتامین، ماده محرکی است که عوارض زیادی بر روی سیستم عصبی، قلب و عروق و سیستم ایمنی بدن بر جای می گذارد. بافت های بدن نیز تحت تاثیر این ماده قرار گرفته و می تواند باعث مرگ سلول ها شود. با توجه به ضرر احتمالی آن بر روی بافت های بدن، تاثیر آن بر روی بافت کبد در موش های صحرایی نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی، ۵۰ سرموش نژاد ویستار با سنی حدود ۶-۵ هفته، به شکل تصادفی در پنج گروه (شاهد، شم و سه گروه آزمایشی) قرار داده شدند. گروه های آزمایشی ۱، ۲ و ۳. به ترتیب دوزهای ۲mg/kg، ۴mg/kg و ۸mg/kg، اکستازی را به صورت داخل صفاقی و به مدت دو هفته متوالی دریافت نمودند. گروه شم تنها نرمال سالین دریافت کرده و گروه شاهد نیز تزریقی نداشتند. حیوانات ۱۲ ساعت بعد از آخرین تزریق کشته شده و از کبد آن ها نمونه بافتی تهیه گردید. برش های بافتی بعد از رنگ آمیزی هماتوکسین انوزین، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: تعداد سلول های هیپاتوسیت، در گروه های آزمایشی، نسبت به گروه شاهد، کاهش چشم گیری را نشان داد ( $p < 0.05$ ). کاهش تعداد سلول های هیپاتوسیت در دوزهای بالاتر بیش تر بود. وزن کبد زیاد شده و تعداد سلول های کوپفر افزایش یافتند. تفاوت خاصی بین گروه های شاهد و شم مشاهده نگردید. نتیجه گیری: دوز مکرر و دریافت زیاد داروی اکستازی، احتمال صدمه به بافت کبدی را افزایش داده و باعث تخریب سلول های آن می گردد. این مطالعه نظارت بیش تر و مدیریت صحیح در مصرف این ماده را پیشنهاد می نماید.

واژه های کلیدی: موش، یا متیلن دی اکسی مت-آمفتامین (اکستازی)، هیپاتوسیت، کبد

## مقدمه

امروزه مصرف مواد اعتیاد آور، نظیر اکستازی یا قرص های شادی آور تا حدودی رواج پیدا کرده است. برخی از مردم به دلایل گوناگون از جمله حس کنجکاوی، رها شدن از فشارهای روحی و روانی و یا اجتماعی، به این گونه مواد روی می آورند. جایگاه اصلی تاثیر داروهای روان گردان، سیستم اعصاب مرکزی به ویژه نورون های سروتونینیک است.

به همین دلیل این مواد در گروه ترکیبات نورتوکسیک قرار می گیرد [۱]. داروهای روان گردان بر روی بافت های مختلف بدن از جمله قلب، کلیه و کبد، اثرات سوئی بر جای گذاشته و باعث تحریک سیستم غدد درون ریز بدن، محور هیپوفیز-هیپوتالاموس-تیروئید و غده آدرنال می شوند. هم چنین با مصرف آن، دمای بدن زیاد شده و ترشح ACTH و کورتیزول افزایش پیدا می کند [۲،۱]. بسیاری از این گونه ترکیبات

داروها، آنزیم‌های ترانس آمیناز، نیتریک اکسید سینتاز و سطح پراکسید هیدروژن را کاهش داده و با اکسید کردن پروتئین‌ها و آنزیم‌های میتوکندری باعث کاهش تولید انرژی و نهایتاً مرگ سلول‌ها خواهند شد [۱۲]. در این خصوص باید در نظر داشت که بافت کبد به عنوان بزرگ‌ترین غده و سیستم تنظیم‌کننده مواد شیمیایی بدن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در عمل‌کردهای متابولیتی، نقش بسزایی را بر عهده دارد. سلول‌های کبدی، بسیاری از ترکیباتی را که بالقوه سمی هستند را از طریق اکسیداسیون احیا و کونژوگاسیون با استفاده از آنزیم‌های شبکه آندوپلاسمیک تغییر می‌دهد. به همین دلیل ممکن است ترکیبات حاصل از این کار، بر ساختار و یا عمل‌کرد بافت کبدی اثرات نامطلوبی داشته باشد. این مطالعه اثرات داروی اکستازی بر روی بافت کبدی در دوزهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد.

## مواد و روش‌ها


حیوانات آزمایشگاهی. ۵۰ سر موش صحرایی نابالغ از نژاد ویستار با وزن متوسط  $100 \pm 5$  گرم و حدود سنی ۵ تا ۶ هفته، از مرکز پرورش حیوانات دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شده و به طور تصادفی در پنج گروه مساوی کنترل، شام، و سه گروه آزمایشی ۱ و ۲ و ۳ قرار گرفتند. موش‌ها در شرایط استاندارد دمایی  $23 \pm 2$  درجه سانتی‌گراد و با دسترسی آزاد به مقادیر دل‌خواه آب و غذا نگهداری شدند. همگی تحت شرایط ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی قرار داشتند. اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی زیر نظر کمیته نظارت بر حقوق حیوانات آزمایشگاهی مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، انجام پذیرفت.

تزریق داروی اکستازی. در این مطالعه از قرص اکستازی نوع شنل آبی که از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی فسا تهیه گردید مورد استفاده قرار گرفت. میزان ماده موثر آن در این قرص ۱۰۰ میلی‌گرم تعیین گردید. قرص اکستازی پودر شده با غلظت‌های مشخص در نرمال سالین حل شده و پس از تعیین  $LD_{50}$  (۱۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم)، روزانه در یک


مشتقاتی از آمتامین‌ها هستند که جزء داروهای محرک بدن محسوب می‌شوند. آمتامین‌ها گروهی از مواد محرک عصبی هستند که برای مصارف طبی و درمانی ساخته شده‌اند [۳]. یکی از انواع آن متیلن‌دی‌اکسی‌مت-آمتامین (MDMA) است که با نام تجاری اکستازی شناخته می‌شود. اکستازی به شکل‌های مختلف، مانند پودر، کپسول یا قرص و با رنگ‌های متفاوت تولید شده و به صورت خوراکی مصرف می‌شوند. جذب گوارشی این دارو بسیار پایین بوده و دو ساعت بعد از مصرف به غلظت حداکثری خود در خون می‌رسد [۴، ۵]. این ماده وقتی وارد بدن انسان شود، بر روی گیرنده‌های ناقل‌های عصبی مونوآمین که از اهمیت خاصی برخوردار هستند (۵- هیدروکسی تریپتامین، دوپامین و نورآدرنالین) اثر منفی می‌گذارد [۶]. بسیاری از مطالعات حاکی از آن است که دوزهای مختلف اکستازی بر روی مواد وراثتی و DNA مربوط به اندام‌های بدن اثر متفاوتی را بر جای خواهد گذاشت. این دارو از طریق تولید انواع اکسیژن‌های واکنش‌پذیر و نیز آسیب به اندام‌های درون سلولی از جمله میتوکندری و لیزوزوم‌ها، باعث نقص در عمل‌کرد سلول‌ها شده و به همین دلیل این گونه مواد را در رده ترکیبات زئوتوکسیکوسیتی و سیتوتوکسیکوسیتی طبقه‌بندی می‌کنند [۷، ۸]. عده‌ای از محققین معتقدند که این ماده باعث مهار آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز شده و به دنبال آن باعث اکسیداسیون پروتئین‌های سیتوپلاسمی می‌شود و با افزایش استرس اکسیداتیو، مرگ سلولی را در بافت‌ها، القا می‌کند [۹]. گرچه مکانیسم مربوط به تاثیر اکستازی چندان مشخص نیست، ولی گزارشات حاکی از آن است که این گونه ترکیبات، دستگاه تولید مثل را تحت تاثیر قرار داده و مصرف طولانی مدت آن بر روی محور هیپوفیز- گوناد، اثرات مخربی را بر جای می‌گذارد. محققین قائل به این هستند که از طریق ایجاد اختلال در سیستم هورمونی و تاثیر بر روی اندام‌های تناسلی جنس نر، باعث صدمه به DNA اسپرم، ادم بافت بیضه و کاهش در حرکت اسپرم شده و افراد را به سمت ناباروری سوق می‌دهند [۱۰، ۱۱]. عده‌ای هم با مطالعه بر روی موش‌های صحرایی نشان دادند که این گونه

مشاهده گردید که، تعداد این سلول‌ها بین دو گروه شاهد و شم، تفاوت معنی‌داری پیدا نکرده است (شکل ۱).

تعداد سلول‌های کوپفر. تعداد سلول‌های کوپفر در گروه‌های آزمایشی نسبت به دو گروه کنترل و شم افزایش معنی‌داری پیدا کرده است ( $p < 0.05$ ). هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه کنترل و شم وجود نداشت. افزایش تعداد سلول‌های کوپفر در دوز ۸ میلی‌گرم نسبت به گروه‌های دیگر گرچه بیشتر بوده ولی معنی‌دار نبود (شکل ۲). وزن کبد. با اندازه‌گیری وزن کبد در هر پنج گروه مشخص گردید که، میانگین آن در گروه‌های آزمایشی نسبت به گروه‌های کنترل و شم افزایش معنی‌داری پیدا کرده است ( $p < 0.05$ ) (شکل ۳).



شکل ۱. مقایسه میانگین تعداد سلول‌های هپاتوسیت در تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف اکستازی در بافت کبد موش‌های صحرایی بعد از دو هفته ( $P < 0.05$ ،  $**P < 0.001$ )



شکل ۲. مقایسه میانگین تعداد سلول‌های کوپفر در تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف اکستازی در بافت کبد موش‌های صحرایی بعد از دو هفته ( $P < 0.05$ ،  $**P < 0.001$ )

ساعت معین و طی دو هفته متوالی و به صورت تزریق داخل صفاقی مورد استفاده قرار گرفت. موش‌ها در گروه‌های آزمایشی ۱، ۲ و ۳، داروی اکستازی را به ترتیب با دوزهای ۲، ۴ و ۸ میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن، دریافت نمودند [۱۳]. گروه شم تنها نرمال سالدین گرفته و گروه کنترل نیز هیچ‌گونه تزریقی نداشتند. تمام حیوانات در شرایط اپتیموم نگهداری شده و دوازده ساعت پس از آخرین تزریق کشته شدند. سپس نمونه برداری انجام پذیرفت.


تهیه نمونه بافتی. برای ارزیابی نمونه‌های بافتی، کبد موش‌ها پس از کشتن از بدن خارج گردید و در داخل فرمالین ۱۰٪ قرار داده شد. بعد از انجام مراحل تهیه بافت، با استفاده از میکروتوم برش‌هایی به ضخامت پنج میکرون تهیه شده و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ‌آمیزی گردیدند [۱۴]. سپس با استفاده از صفحه چشمی شطرنجی (Eye piece) که بر روی میکروسکوپ نوری (مدل نیکون ECLIPSEE 200 ساخت کشور ژاپن) سوار می‌شود، سلول‌های کبدی در واحد سطح شمارش شدند. میزان آسیب بافتی نیز، توسط یک مقیاس نیمه کمی جهت مقایسه شدت آن بین گروه‌ها، انجام پذیرفت و از بخش‌های آسیب دیده بافت کبدی با میکروسکوپ تصاویری تهیه گردید.

آنالیز آماری. برای تحلیل داده‌ها از برنامه آماری SPSS ویرایش ۱۳ استفاده شد. داده‌های به دست آمده، به صورت میانگین  $\pm$  انحراف استاندارد ارائه شده و با استفاده از تست‌های One way ANOVA و آزمون Duncan مورد ارزیابی قرار گرفتند.

## نتایج


تعداد هپاتوسیت‌ها. با شمارش سلول‌های هپاتوسیت در نمونه‌های مربوط به گروه‌های آزمایشی مشاهده گردید، که تعداد آن‌ها در مقایسه با گروه‌های کنترل و شم، به صورت معنی‌داری در واحد سطح کاهش یافته و تغییرات به وجود آمده در دوزهای بالاتر بیشتر بوده است ( $p < 0.05$ ). هم‌چنین

تیمار با اکستازی، از جمله درجات مختلفی از واکنش دژنراتیو بود که عمدتاً به صورت تورم سلولی نمایان گردید. اندازه هیاتوسیت‌ها در برخی نواحی با حالتی متورم شده و با سیتوپلاسمی دانه‌دار دیده شدند. برخی از هیاتوسیت‌ها نیز به صورت دسته جمعی و انفرادی نکروزه شدند. تغییر قابل ملاحظه دیگر در کبد، حضور سلول‌هایی بود که به صورت نفوذ لوکوسیتی لنفوسیتی در اطراف عروق نمایان شدند. در موارد شدید، نکروز سلول‌های کبدی در اطراف وریدچه مرکزی نیز مشاهده می‌شد. سلول‌های کوپفر در جدار داخلی دیواره سینوزوئیدها افزایش یافته و با ارتشاح تک هسته‌ای‌ها در فضاهای پورتال و پرخونی سینوزوئیدها همراه بودند (شکل ۴). در گروه‌های کنترل و شام نیز، هیچ‌گونه تغییرات هیستوپاتولوژیکی مشاهده نشد.



شکل ۳. مقایسه میانگین وزن کبد موش‌های صحرایی در تزریق داخل صفاقی دوزهای مختلف اکستازی ( $P < 0.05$ )

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک. تغییرات مشاهده شده در بافت کبدی، شامل تغییرات عروقی است که به صورت پرخونی و در بعضی موارد به شکل خون‌ریزی‌های کانونی در کبد مشاهده شد. تغییرات دژنراتیو کبدی در هر سه گروه تحت



شکل ۴. نمای میکروسکوپی ساختار کبد رنگ‌آمیزی شده با هماتوکسیلین و ائوزین (بزرگ‌نمایی برابر با ۴۰). A: اتساع عروق، پرخونی شدید، افزایش بافت پیوندی در گروه آزمایشی ۳ قابل مشاهده است. B: از بین رفتن مرز سلولی (نشانگر ۱)، نکروز سلول‌های کبدی، نفوذ سلول‌های آماسی تک هسته‌ای اطراف عروق (نشانگر ۲) و از بین رفتن سیتوپلاسم (نشانگر ۳) را در گروه آزمایشی ۱ نشان می‌دهد. C: نکروز سلول‌های کبدی (نشانگر ۱) و نفوذ سلول‌های آماسی تک هسته‌ای (نشانگر ۲) در گروه آزمایشی ۲ مشخص می‌باشد. D: بزرگ شدن هیاتوسیت‌ها و هسته‌ها، از بین رفتن سیتوپلاسم (نشانگر ۱) و افزایش تعداد سلول‌های کوپفر (نشانگر ۲) در گروه آزمایشی ۳ قابل ملاحظه است.

## بحث و نتیجه گیری

بررسی‌های انجام شده در این مطالعه حاکی از آن است که اکستازی باعث افزایش معنی‌داری در وزن و تعداد سلول‌های کوبفر در کبد گردیده است. تعداد سلول‌های هیپاتوسیت نیز در موش‌های دریافت‌کننده اکستازی، در مقایسه با موش‌های گروه کنترل و شم، کاهش معنی‌داری پیدا کرده است. هم‌چنین بعد از دریافت دوزهای مختلف اکستازی، تغییرات هیستوپاتولوژی نیز در بافت کبد گروه‌های آزمایشی نسبت به گروه کنترل و شم مشاهده شد. این تغییرات به صورت نفوذ لوکوسیت در نواحی پورتال، پرخونی و خون‌ریزی شدید، تغییرات دژنراتیو در هیپاتوسیت بافت کبد در موش‌های دریافت‌کننده اکستازی مخصوصاً در دوز بالا مشاهده گردید. بافت کبد به دلیل توانایی در خنثی‌سازی مواد سمی و یا تغییر شکل بیولوژیک آن‌ها، جزء اندام‌هایی است که دائماً در تماس با ترکیبات سمی است. باید در نظر داشت که توانایی کبد در تغییرات متابولیسمی محدود است لذا مواجه شدن بافت کبد با سموم مختلف اگر بیش از یک اندازه معینی باشد که نتواند آن‌را به‌نوعی دفع و یا تغییر دهد، لاجرم اختلالاتی را در ساختار و عمل‌کرد کبد ایجاد می‌کند [۱۵]. کاهش در تعداد سلول‌های هیپاتوسیت احتمالاً مربوط به تولید رادیکال‌های آزاد از قبیل سوپراکسید و انواع اکسیژن‌های واکنش‌پذیری است که باعث پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و هم‌چنین اسیدهای چرب غیراشباع داخل سیتوپلاسمی می‌شوند. این عمل در نهایت موجب از بین رفتن غشاء سلول و آسیب به سلول‌های کبدی خواهد شد [۱۶، ۱۷]. البته معیار سنجش پراکسیداسیون لیپیدها، مقدار مالون دی‌آلدئید تولید شده‌ای است که موجب غیرفعال شدن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی از قبیل سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوکاتایون پراکسیداز شده و متعاقب آن رادیکال‌های آزاد از قبیل اکسیژن‌های واکنش‌پذیر به صورت بی‌رویه افزایش یافته که در آسیب به سلول‌های کبدی نقش دارند [۱۸]. حال با توجه به این مکانیسم به نظر می‌رسد، القای مرگ سلولی ناشی از اکستازی منجر به کاهش سلول‌ها از جمله سلول‌های هیپاتوسیت می‌شود. این ترکیب با

آسیب به DNA، کاهش در تولید انرژي از طریق نقص در عمل‌کرد آنزیم‌های میتوکندری، افزایش فعالیت آنزیم‌های لیزوزومی و اکسیداسیون پروتئین‌های سیتوپلاسمی، می‌تواند سلول‌های هیپاتوسیت را به سمت مرگ سوق دهد [۱۹]. گلوکاتایون ردوکتاز یک آنزیم سیتوزولی کبدی است که در کاهش گلوکاتایون اکسید به عنوان محصول نهایی فعالیت آنزیم گلوکاتایون پراکسیداز نقش دارد [۲۰]. مطالعات مختلف نشان می‌دهد اکستازی فعالیت گلوکاتایون ردوکتاز و تشکیل گلوکاتایون احیاء و سم‌زدایی متابولیت‌های فعال را در موش کاهش می‌دهد. با توجه تحقیقات مختلف به نظر می‌رسد که اکستازی اثرات تخریبی خود را در آسیب کبدی موش صحرایی از طریق کاهش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و افزایش رادیکال‌های آزاد اعمال می‌کند [۱۹]. پرخونی بافت کبد یکی دیگر از نتایج هیستوپاتولوژی مطالعه ما بود که با گزارش بعضی از محققین که علت آن را افزایش فعالیت کبدی می‌دانند، مطابقت داشت. چون کبد با افزایشی که در تعداد میتوکندری‌های آن اتفاق می‌افتد و با فعالیت زیاد خود، به طور مداوم اکسیژن خون را مصرف کرده و سبب بروز هیپوکسی در خود بافت کبد می‌گردد [۲۱]. هم‌چنین به دلیل این‌که کبد محل اصلی متابولیسم مواد مختلف در بدن بوده و کار آن سم‌زدایی داروهاست، لذا مصرف MDMA سبب القاء مسمومیت کبدی می‌شود و متعاقباً از پرخونی کبد چنین استنباط می‌شود که افزایش میزان خون کمک می‌کند تا مواد متابولیتی راحت‌تر از بدن خارج شوند. در پژوهش حاضر، افزایش معنی‌دار وزن کبد و در پی آن وزن نسبی در موش‌های مصرف‌کننده MDMA در مقایسه با گروه‌های کنترل و شم مشاهده شد که این نتیجه با یافته‌های بعضی از محققین [۲۳]، مبنی بر این‌که مصرف MDMA باعث عوارضی چون هیپاتوتوکسیک، زردی، هیپاتومگالی، نکرور لوبول‌های مرکزی، هیپاتیت، فیروز سلول‌های کبدی، بالا رفتن دمای بدن، آزاد شدن نوروترانسمیترها و اکسایش آمین‌های بیورنی را باعث می‌شود، مطابقت دارد. با توجه به نتایج به‌دست آمده در این مطالعه که کاهش تعداد هیپاتوسیت‌ها را به دنبال داشته است،

## تشکر و قدردانی

از معاونت محترم پژوهشی و کارشناسان آزمایشگاه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم تقدیر و تشکر می‌شود.

## منابع

- [1] Sprague JE, Banks ML, Cook VJ, Mills EM. Hypothalamic-pituitary-thyroid axis and sympathetic nervous system involvement in hyperthermia induced by 3,4-methylenedioxymethamphetamine (Ecstasy). *J Pharmacol Exp Ther* 2003; 305: 159-166.
- [2] Gerra G, Bassignana S, Zaimovic A, Moi G, Bussandri M, Caccavari R, et al. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis responses to stress in subjects with 3,4 - methylenedioxymethamphetamine ('ecstasy') use history: correlation with dopamine receptor sensitivity. *Psychiatry Res* 2003; 120: 115-124.
- [3] Faria R, Magalhães A, Monteiro PR, Gomes-Da-Silva J, Amélia Tavares M, Summavielle T. MDMA in adolescent male rats: decreased serotonin in the amygdala and behavioral effects in the elevated plus-maze test. *Ann N Y Acad Sci* 2006; 1074: 643-649.
- [4] Gelder M, Mayou R, Geddes J. Oxford core texts psychiatry. 2<sup>nd</sup> ed. Puračkari N, translator. Tehran: Golban Medical Publication. 2003; pp. 202-204.
- [5] Mas M, Farré M, de la Torre R, Roset PN, Ortuño J, Segura J, Camí J. Cardiovascular and neuroendocrine effects and pharmacokinetics of 3, 4-methylenedioxymethamphetamine in humans. *J Pharmacol Exp Ther* 1999; 290: 136-145.
- [6] Docherty JR, Green AR. The role of monoamines in the changes in body temperature induced by 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, ecstasy) and its derivatives. *Br J Pharmacol* 2010; 160: 1029-1044.
- [7] Alvarenga TA, Ribeiro DA, Araujo P, Hirotsu C, Mazaro-Costa R, Costa JL, et al. Sleep loss and acute drug abuse can induce DNA damage in multiple organs of mice. *Hum Exp Toxicol* 2011; 30: 1275-1281. [Abstract].
- [8] Pourahmad J, Eskandari MR, Nosrati M, Kobarfard F, Khajeamiri AR. Involvement of mitochondrial/lysosomal toxic cross-talk in ecstasy induced liver toxicity under hyperthermic condition. *Eur J Pharmacol* 2010; 643: 162-169.
- [9] Upreti VV, Moon KH, Yu LR, Lee IJ, Eddington ND, Ye X, et al. Increased oxidative-modifications of cytosolic proteins in 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, ecstasy)-exposed rat liver. *Proteomics* 2011; 11: 202-211.
- [10] Barenys M, Gomez-Catalan J, Camps L, Teixido E, de Lapuente J, Gonzalez-Linares J, et al. MDMA (ecstasy) delays pubertal development and alters sperm quality after developmental exposure in the rat. *Toxicol Lett* 2010; 197: 135-142.
- [11] Hesami Z, Khatamsaz S, Mokhtari M. The effects of ecstasy on pituitary-gonadal axis and spermatogenesis in mature male rats. *Tabib-e-Shargh* 2008; 10: 207-218. (Persian).
- [12] Moon KH, Upreti VV, Yu LR, Lee IJ, Ye X, Eddington ND, et al. Mechanism of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA, ecstasy)-mediated mitochondrial dysfunction in rat liver. *Proteomics* 2008; 8: 3906-3918.
- [13] Cerretani D, Bello S, Cantatore S, Fiaschi AI, Montefrancesco G, Neri M, et al. Acute administration of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) induces oxidative stress, lipoperoxidation and TNF $\alpha$ -mediated apoptosis in rat liver. *Pharmacol Res* 2011; 64: 517-527.
- [14] John D, Bancorft M, editors. Theory and practice of Histology Techniques. New York, 5<sup>th</sup> ed; 2002.
- [15] McManus JFA, Mowry RW. Staining methods. histological and histochemical. New York: Happer and Row; 1999: p. 57.
- [16] Ninković M, Malicević Z, Selaković V, Simić I, Vasiljević I. N-methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine-induced hepatotoxicity in rats: oxidative stress after acute and chronic administration. *Vojnosanit Pregl* 2004; 61: 125-131.

بایستی وزن کبد کاهش می‌یافت. ولی باید در نظر داشت که کبد در اثر صدمه و یا از دست دادن سلول‌های خود سعی به جبران آن دارد و این کار را از طریق افزایش حجم سلول‌های کبد یا هیپرتروفی انجام می‌دهد لذا این عمل باعث می‌گردد تا حجم زیادی از مایعات در بافت آن تجمع پیدا کرده و باعث افزایش وزن کبد گردد. این موضوع همان نتیجه‌ای است که در بررسی حاضر بدان دست پیدا کردیم. در برخی از موارد نیز هجوم سلول‌های دفاعی مانند سلول‌های کوپفر باعث بزرگ شدن کبد و افزایش حجم آن می‌شوند. لذا با توجه به نتایجی که در این تحقیق به دست آمده است، می‌توان افزایش وزن کبد را ناشی از هیپرتروفی کبد دانست. هر چند در برخی از گزارشات، هیچ‌گونه ارتباطی بین اثر اکستازی و میزان دوز آن اشاره‌ای نشده است، ولی با توجه به مطالعه حاضر احتمال آسیب‌دیدگی بافت کبد در دوزهای بالاتر اکستازی قوت بیشتری می‌گیرد. البته بعضی از مطالعات حاکی از آن است که هرچه دوز اکستازی بالاتر باشد، تغییرات بافتی نیز بیشتر خواهد بود و میزان دوز مصرفی می‌تواند یکی از عوامل اصلی موثر در آسیب بافتی باشد [۲۳، ۲۲]. حال اگر افزایش سلول‌های کوپفر که از جمله ماکروفاژی بالغ در جدار سینوزویدهای کبد محسوب می‌شوند را ناشی از حضور اکستازی فرض نماییم، به نظر می‌رسد که افزایش سلول‌های کوپفر با توجه به نقش بیگانه‌خواری آن‌ها، ممکن است برای هضم آن گروه از سلول‌های کبدی که در اثر اکستازی از بین رفته‌اند، ارتباط داشته باشد.

با توجه به نتایج به‌دست آمده به نظر می‌رسد که داروی اکستازی می‌تواند بر بافت کبد و متعاقباً بر کارایی آن اثر سوء داشته باشد. نتایج کلی این مطالعه نشان داد که تاثیر هیستوپاتولوژیک حاصل از مصرف اکستازی، به دوز آن بستگی دارد. با توجه به تغییرات حاصل از مصرف اکستازی می‌توان گفت که اکستازی به عنوان یک عامل هپاتوتوکسیک مطرح است. لذا نتایج حاصل از این مطالعه کنترل و نظارت بیشتر در مصرف این قبیل داروها را پیشنهاد می‌نماید.

- [20] Naik SR, Panda VS. Hepatoprotective effect of Ginkgoselect Phytosome in rifampicin induced liver injury in rats: evidence of antioxidant activity. *Fitoterapia* 2008; 79: 439-445.
- [21] Alvarenga TA, Andersen ML, Ribeiro DA, Araujo P, Hirotsu C, Costa JL, et al. Single exposure to cocaine or ecstasy induces DNA damage in brain and other organs of mice. *Addict Biol* 2010; 15: 96-99.
- [22] Fleury MB, Neudörffer A, Felim A, Blanco M, Monnet FP, LARGERON M. Metabolites of ecstasy and cytotoxicity effects. *Ann Pharm Fr* 2009; 67: 91-96.
- [23] Carvalho M, Pontes H, Remião F, Bastos ML, Carvalho F. Mechanisms underlying the hepatotoxic effects of ecstasy. *Curr Pharm Biotechnol* 2010; 11: 476-495.
- [17] Zhou JF, Chen P, Zhou YH, Zhang L, Chen HH. 3,4-Methylenedioxy- methamphetamine (MDMA) abuse may cause oxidative stress and potential free radical damage. *Free Radic Res* 2003; 37: 491-497.
- [18] Ji LL, Stratman FW, Lardy HA. Antioxidant enzyme systems in rat liver and skeletal muscle. Influences of selenium deficiency, chronic training, and acute exercise. *Arch Biochem Biophys* 1988; 263: 150-160.
- [19] Montiel CV, Rey MO, Prieto JA, Zabalza MJ, Beitia G, Cenarruz E. et al. Methylenedioxymethamphetamine ("Ecstasy") induced apoptosis of cultured rat liver cells. *Biochimica Biophysica Acta* 2002; 1588: 26-32.

## Effects of of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (ecstasy) on rat liver structure

Azam Bagheri Haghghi (M.Sc)<sup>1</sup>, Esmail Fattahi (Ph.D)<sup>\*2</sup>, Mohsen Forozanfar (Ph.D)<sup>3</sup>, Vahid hemayatkhah Jahromi (Ph.D)<sup>1</sup>

1 –Dept. of Biology, Islamic Azad University, Jahrom, Iran

2 – Dept. of Biology, Islamic Azad University, Amol, Iran

3 – Dept. of Biology, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

(Received: 19 Apr 2011 Accepted: 25 Oct 2011)

**Introduction:** Ecstasy (methylenedioxymethamphetamine) is a stimulant drug that has various side effects on nerve system, cardiovascular and immune system. This substance affects body tissues and can cause their death. Therefore, in the present study, we investigated the effects of ecstasy on liver tissues in Wistar rats.

**Materials and Methods:** Fifty Wistar rats, ranging 5-6 weeks of age, were divided into five groups (n=10) including control, sham, experimental 1, 2 and 3. In the experimental groups, the animals were injected with the consecutive doses of ecstasy (2, 4 and 8 mg/kg, I.P, for two weeks). The sham group received normal saline and the control group had no injection. Animals were sacrificed 12 hours after the latest injection of ecstasy. Liver tissues sections were provided and stained by hematoxylin-eosin to investigate the histopathological changes.

**Results:** Hepatocytes cells significantly decreased in experiment groups as compared with the control and sham groups ( $p < 0.05$ ). This decrease was more severe with higher doses. The results showed that numbers of kuppfer cells and liver weight were increased and the degree of changes depended on the dose.

**Conclusion:** According to the results, ecstasy might cause damages on liver tissue in higher and consecutive doses. So, this study suggests more attention on using of these kinds of drugs.

Keywords: Rats, 3,4 methylenedioxyamphetamine (Ecstasy), Hepatocyt, Liver.

---

\* Corresponding author: Fax: +98 121 2517319; Tel: +98 121 2517320  
e.fattahi@iauamol.ac.ir