

بررسی ارتباط ژنتیکی میکروستلاتیت‌های منتخب با برخی مولفه‌های سندروم متابولیک در خانواده‌های فارس و آذربایجان

نیما حسین‌زاده^{۱*} (M.Sc)، یادالله محرابی^۲ (Ph.D)، مریم السادات دانشپور^۳ (Ph.D)، حمید علوی‌مجد^۱ (Ph.D)، فریدون عزیزی^۴ (M.D)

۱- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی، گروه آمار زیستی

۲- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی

۳- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات پیش‌گیری و درمان چاقی، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم

۴- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم

چکیده

سابقه و هدف: آزمون ارتباط ژنتیکی بر اساس خانواده‌ها (FBAT) در بررسی ارتباط ژنتیکی بین الهای نشان‌گرهای ژنتیکی و انواع فنوتیپ‌ها، برای تعیین مکان ژنتیکی ژن‌ها، کاربرد گسترده‌ای دارد. این تحقیق با کمک روش FBAT، به بررسی ارتباط ژنتیکی برخی میکروستلاتیت‌های منتخب با میزان لیپوپروتئین با چگالی بالای کلسترول (HDL-C)، تری‌گلیسیرید و دور کمر جهت شناخت نواحی ژنی موثر در سندروم متابولیک در دو نژاد فارس و آذربایجان از جمعیت ایرانی پرداخت.

مواد و روش‌ها: تعداد ۱۰۷ خانواده از بین شرکت‌کنندگان در مطالعه قند و لیپید تهران به گونه‌ای انتخاب شدند که حداقل یک نفر از اعضای آن‌ها مبتلا به سندروم متابولیک (طبق معیار III ATP) و حداقل دو نفر دچار کاهش میزان HDL-C باشند. ارتباط ژنتیکی میزان HDL-C با به کارگیری روش FBAT بررسی گردید.

یافته‌ها: ۱۰۷ خانواده شامل ۴۸۳ نفر بودند. در نژاد فارس، از کروموزوم ۸، میکروستلاتیت D8S514 با میزان HDL-C و میکروستلاتیت D8S1743 با میزان تری‌گلیسیرید ارتباط ژنتیکی معنی‌داری نشان دادند ($P < 0.05$). در نژاد آذربایجان تنها ارتباط ژنتیکی میکروستلاتیت‌های D8S1132 و D8S1743 از کروموزوم ۸ با میزان HDL-C معنی‌دار شد ($p < 0.05$).

نتیجه‌گیری: FBAT در برابر مخدوش کننده‌هایی مثل بد تعیین کردن مدل ژنتیکی و یا پدیده لایه‌بندی جمعیتی مقاوم خواهد بود. یافتن میکروستلاتیت‌های موثر در میزان تغییرات HDL-C و تری‌گلیسیرید توسط روش مورد استفاده در این مطالعه، می‌تواند به انتخاب مناطق کروموزومی جدید و نشان‌گرهای نزدیک‌تر به ژن‌های مستعد کننده سندروم متابولیک در جمعیت ایرانی کمک نماید.

واژه‌های کلیدی: FBAT، میکروستلاتیت، HDL-C، تری‌گلیسیرید، سندروم متابولیک

مقدمه

در بین روش‌های موجود در بررسی ارتباط ژنتیکی، روش‌های TDT (Transmission Disequilibrium Test) و

Family Base Association Test (FBAT) از پر

کاربردترین این روش‌ها محسوب می‌شوند. روش

نخستین بار در سال ۱۹۹۳ برای بررسی ارتباط ژنتیکی

تری‌گلیسیرید، فشار خون، قند خون ناشتا، دور کمر و کاهش میزان HDL-C بهره جست [۴]. از آن‌جا که مطالعات پیشین نشان داده است که ۳۲ درصد از افراد ایرانی مبتلا به این سندروم می‌باشد [۵]، بررسی جدی عوامل این بیماری در جمعیت ایرانی ضروری به نظر می‌رسد. لذا هدف این تحقیق، شناسایی نواحی کروموزومی اثرگذار بر میزان HDL-C، تری‌گلیسیرید و دور کمر با استفاده از روش FBAT و به کارگیری دوازده میکروستلاتیت مربوط به چهار ناحیه کروموزومی متعلق به کروموزوم‌های ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۶ که در ارتباط با سندروم متابولیک هستند، بود. نتایج این تحقیق می‌تواند گامی در جهت یافتن نواحی ژنی موثر در سندروم متابولیک در دو نژاد فارس و آذری از جمعیت ایرانی باشد.

مواد و روش‌ها

افراد مورد بررسی در این تحقیق از خانواده‌هایی که دارای حداقل یک نفر با علائم سندروم متابولیک و حداقل دو نفر با کاهش میزان HDL-C هستند، از میان شرکت‌کنندگان در مطالعه قند و لبپید تهران انتخاب شدند [۶]. اطلاعات ژنتیکی تعداد ۱۰۷ خانواده شامل ۴۸۳ نفر در محدوده سنی ۳–۸۳ و در دو گروه نژادی فارس (۳۸۰ نفر) و آذری (۱۰۳ نفر) برای بررسی ارتباط ژنتیکی نواحی کروموزومی اثرگذار بر میزان HDL-C، تری‌گلیسیرید و دور کمر، با کمک چهار میکروستلاتیت از کروموزوم ۸، سه میکروستلاتیت از کروموزوم ۱۱، سه میکروستلاتیت از کروموزوم ۱۲ و دو میکروستلاتیت از کروموزوم ۱۶ در اختیار بوده که برای بررسی ارتباط ژنتیکی میکروستلاتیت‌ها با میزان صفات مذکور توسط روش FBAT (پیوست مقاله را ملاحظه نمایید) از تمامی این اطلاعات استفاده گردید. جزئیات مربوط به اندازه‌گیری‌های ژنتیکی و بیوشیمیایی افراد، میکروستلاتیت‌های منتخب و فراوانی‌الی میکروستلاتیت‌ها در گزارش‌های پیشین آمده است [۷،۸]. میکروستلاتیت‌های منتخب برای کروموزوم ۸ شامل D8S1779، D8S1743، D8S514، D8S1132 و D11S934، D11S1998، D11S1304 و D11S1304 شامل ۱۱ کروموزوم می‌باشند.

موجود بین الاهای یک نشان‌گر دو الی و یک فنوتیپ کیفی دو حالت در خانواده‌های هسته‌ای (Nuclear family) با یک یا چند فرزند بیمار و بر اساس به کارگیری روش مکنمار (McNemar) ابداع گردید [۱]. در راستای تکامل این روش در آنالیز ارتباط ژنتیکی، بر مبنای الاهای نشان‌گرها چند الی، انواع فنوتیپ‌ها و صفات مربوط به آن‌ها، مدل‌های گوناگون و راثت فنوتیپ‌ها، داده‌های ژنتیکی از شجره‌نامه‌ها و خانواده‌هایی با ساختارهای متفاوت، تعدیل اثر متغیرهای مخدوش‌کننده (Confounder variable) بر ارتباط ژنتیکی مشاهده شده و الگوهای متنوعی از ژنتیپ‌های مفقود شده (Missing genotype) اعضای خانواده، تلاش‌های بسیاری صورت گرفت و روش‌های متنوعی ابداء گردید که هر کدام از این روش‌ها به صورت انحصاری تنها بخشی از روش TDT را تکمیل کرده و این در حالی است که نیاز به روشنی احساس می‌شود که تمامی نقص‌های TDT را یک جا و در قالب یک مدل برطرف کند. از این رو در سال ۲۰۰۰ روش FBAT ابداء گردید. نحوه عمل کرد روش FBAT در پیوست آورده شده است. از مسائل مهم در تعیین مکان ژنتیکی ژن‌های بیماری‌زا توسط تحلیل ارتباط ژنتیکی، وجود گونه‌ای از بیماری‌ها به نام بیماری‌های چند عاملی مانند سندروم متابولیک است. به دلیل اثر عوامل محیطی و ژنتیکی فراوان در ایجاد این بیماری‌ها، اثر هر کدام از این عوامل به طور مجزا در ایجاد بیماری کم بوده و به ندرت می‌توان عاملی پیدا کرد که تاثیر عمده‌ای در ایجاد بیماری داشته باشد [۲]. برای تشخیص سندروم متابولیک، طبق معیار ATP III، نیاز به برقراری ۳ شرط از ۵ شرط ذیل خواهد بود: ۱- چاقی تنه‌ای (دور کمر بیش از ۱۰۲ cm در مردان و بیش از ۸۸ cm در زنان). ۲- تری‌گلیسیرید بیشتر یا مساوی HDL-C ۱۵۰ mg/dl - ۳. ۳- قدرت از ۵۰ mg/dl در مردان و کمتر از ۴۰ mg/dl HDL-C - ۴- فشار خون بیشتر یا مساوی mmHg ۸۵/۱۳۰. ۵- قدرت از ۱۱۰ mg/dl در زنان. ۶- فشار خون بیشتر یا مساوی mmHg ۱۱۰/۸۵. از این رو، جهت شناسایی سندروم متابولیک، می‌توان از بررسی تغییر عواملی مثل افزایش

۱۰۷ خانواده هسته‌ای شامل ۴۸۳ نفر (۲۲ خانواده هسته‌ای شامل ۱۰۳ نفر با نژاد آذری و ۸۴ خانواده هسته‌ای شامل ۳۸۰ نفر با نژاد فارس) دارای اطلاعات لازم جهت بررسی‌های مد نظر بودند. میانگین، انحراف استاندارد مربوط به صفات C-HDL، تری‌گلیسیرید، دور کمر، سن و تعداد زنان و مردان و افراد مبتلا به سندروم متابولیک در دو نژاد فارس و آذری، در جدول ۱ درج شده است.

در بررسی ارتباط ژنتیکی چهار میکروستلایت کروموزوم ۸ با میزان HDL-C، تری‌گلیسیرید و دور کمر، میکروستلایت D8S1743 با میزان HDL-C و میکروستلایت D8S514 با میزان HDL-C در نژاد آذری میزان تری‌گلیسیرید در نژاد فارس و میکروستلایت‌های D8S1132 و D8S1743 با میزان HDL-C در نژاد آذری ارتباط ژنتیکی معنی داری را نشان دادند ($p < 0.05$). با ترکیب نمودن اطلاعات ژنتیکی دو نژاد، ارتباط ژنتیکی میکروستلایت D8S514 با میزان HDL-C و میکروستلایت D8S1743 با میزان تری‌گلیسیرید در سطح ۵ درصد معنی دار شد (جدول ۲). این در حالی است که در هیچ یک از دو نژاد فارس، آذری و ترکیب دو نژاد، ارتباط ژنتیکی هیچ یک از سه میکروستلایت کروموزوم ۱۶ (جدول ۳)، ۳ میکروستلایت کروموزوم ۱۲ (جدول ۴) و ۲ میکروستلایت کروموزوم ۱۶ (جدول ۵) با میزان صفات C-HDL، تری‌گلیسیرید و دور کمر معنی داری نشد. ذکر این نکته ضروری است که در صورت کم بودن تعداد خانواده‌های ناهمگن در ژنتیک یک میکروستلایت، FBAT قادر به محاسبه آماره آزمون بررسی وجود ارتباط ژنتیکی نبوده است. هم‌چنین به دلیل ۲ الی بودن میکروستلایت‌های مورد بررسی در این مطالعه، p مقدارها برای هر دو الی یک میکروستلایت با هم برابر بوده و مقادیر آماره Z آن‌ها نیز در جهت مخالف هم قرار دارند.

برای کروموزوم ۱۲ شامل D12S329 و D12S1632 و برای کروموزوم ۱۶ شامل D16S3096 و D16S2624 هستند.

روش‌های آماری: در این تحقیق به بررسی ارتباط ژنتیکی چهار میکروستلایت کروموزوم ۸، سه میکروستلایت کروموزوم ۱۱، سه میکروستلایت کروموزوم ۱۲ و دو میکروستلایت کروموزوم ۱۶ با میزان HDL-C، تری‌گلیسیرید و دور کمر برای هر یک از نژادهای فارس، آذری و ترکیب هر دو نژاد با استفاده از روش FBAT پرداخته شد. p مقدارهای مربوط به بررسی ارتباط ژنتیکی این میکروستلایت‌ها بدون تعدیل نمودن اثر متغیرهای جنس، سن و وابستگی‌های قومی و نژادی و با در نظر گرفتن بهینه مقدار تعادل (μ) به دست آمدند. در بررسی ارتباط ژنتیکی صفات کمی، از میانگین نمونه‌ای مقادیر صفت مد نظر در فرزندان خانواده‌ها، به عنوان مقدار تعادل، استفاده می‌گردد. این در حالی است که بهینه مقدار تعادل (μ) به گونه‌ای که واریانس S را مینیمم کند با کمک میانگین وزنی صفات در فرزندان خانواده‌ها که با توجه به تعداد والدین ناهمگن وزن‌دهی شده‌اند به دست خواهد آمد.^[۹] از این رو میانگین نمونه‌ای مقادیر HDL-C، تری‌گلیسیرید و دور کمر در تمام فرزندان، به گونه‌ای که فرزندان خانواده‌ها در محاسبه این میانگین با توجه به تعداد والدین ناهمگن وزن‌دهی شده‌اند، به عنوان بهینه مقدار تعادل در نظر گرفته شدند.

در این تحقیق از نرم‌افزارهای Excel ویرایش ۲۰۰۷ در آمده‌سازی داده‌ها و از نرم‌افزار FBAT ویرایش ۲۰۰۲^[۱۰] برای بررسی ارتباط ژنتیکی میکروستلایت‌ها با صفات مد نظر استفاده شد.

نتایج

جدول ۱. اطلاعات توصیفی مربوط به داده‌ها

(میانگین \pm انحراف معیار)				(تعداد)				نژاد
دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C	سن	سندرم متابولیک	زن	مرد		
۸۴/۷۸ \pm ۱۸/۲۵	۱۳۷/۶۶ \pm ۷۹/۳۶	۴۴/۴۵ \pm ۱۱/۰۸	۲۵/۶۵ \pm ۱۹/۰۷	۸۲	۱۹۵	۱۸۵	فارس	
۸۷/۴۹ \pm ۱۵/۱۴	۱۴۲/۸۵ \pm ۹۰/۵۵	۴۳/۴۱ \pm ۱۰/۶۷	۳۷/۰۳ \pm ۱۹/۰۳	۲۳	۵۱	۵۲	آذری	

جدول ۲. نتایج FBAT در بررسی ارتباط ژنتیکی چهار میکروستلایت کروموزوم ۸ و میزان HDL-C. تری‌گلیسیرید و دور کمر در دو نژاد فارس و آذربایجانی دو نژاد ترکیب هر دو نژاد

(آماره Z) P-value									الل	میکروستلایت		
آذربایجانی			فارس			فارس و آذربایجانی						
دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C	دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C	دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C				
۰/۳۷۲	۰/۸۷۰	*۰/۰۴۱	۰/۴۶۰	۰/۵۴۱	۰/۴۲۹	۰/۸۵۸	۰/۴۷۱	۰/۶۸۸	۱	D8S1132		
(-۰/۸۹۲)	(-۰/۱۶۴)	(۲/۰۴۳)	(۰/۷۳۸)	(۰/۶۱۱)	(-۰/۷۱۹)	(۰/۱۷۸)	(۰/۷۲۰)	(-۰/۴۰۱)				
۰/۳۷۲	۰/۸۷۰	*۰/۰۴۱	۰/۴۶۰	۰/۵۴۱	۰/۴۲۹	۰/۸۵۸	۰/۴۷۱	۰/۶۸۸				
(۰/۸۹۲)	(۰/۱۶۴)	(-۲/۰۴۳)	(۰/-۷۳۸)	(-۰/۶۱۱)	(۰/۷۱۹)	(-۰/۱۷۸)	(-۰/۷۲۰)	(۰/۴۰۱)				
۰/۵۲۵	۰/۸۹۲	۰/۷۲۴	۰/۲۹۶	۰/۳۰۷	۰/۲۷۴	۰/۱۵۰	۰/۳۴۵	۰/۱۵۲	۱	D8S1779		
(۰/۶۳۴)	(-۰/۳۹۵)	(-۰/۲۵۳)	(۱/۰۴۴)	(۱/۰۲۱)	(-۱/۰۹۵)	(۱/۴۳۷)	(۰/۹۴۲)	(-۱/۴۳۱)				
۰/۵۲۵	۰/۸۹۲	۰/۷۲۴	۰/۲۹۶	۰/۳۰۷	۰/۲۷۴	۰/۱۵۰	۰/۳۴۵	۰/۱۵۲				
(-۰/۶۳۴)	(۰/۳۹۵)	(۰/۲۵۳)	(-۱/۰۴۴)	(-۱/۰۲۱)	(۱/۰۹۵)	(-۱/۴۳۷)	(-۰/۹۴۲)	(۱/۴۳۱)				
۰/۵۶۱	۰/۲۷۶	۰/۳۸۶	۰/۶۲۷	۰/۱۶۰	*۰/۰۱۴	۰/۹۳۳	۰/۱۱۴	*۰/۰۱۰	۱	D8S514		
(۰/۵۸۰)	(-۱/۰۹۰)	(۰/۸۶۷)	(-۰/۴۸۵)	(-۱/۰۴۵)	(۲/۴۴۵)	(۰/۰۸۳)	(-۱/۵۷۹)	(۲/۵۵۰)				
۰/۵۶۱	۰/۲۷۶	۰/۳۸۶	۰/۶۲۷	۰/۱۶۰	*۰/۰۱۴	۰/۹۳۳	۰/۱۱۴	*۰/۰۱۰				
(-۰/۵۸۰)	(۱/۰۹۰)	(-۰/۸۶۷)	(۰/۴۸۵)	(۱/۰۴۵)	(-۲/۴۴۵)	(-۰/۰۸۳)	(۱/۵۷۹)	(-۲/۵۵۰)				
۰/۲۹۵	۰/۵۰۴	*۰/۰۳۶	۰/۳۲۹	*۰/۰۱۸	۰/۱۳۵	۰/۱۷۷	*۰/۰۲۳	۰/۵۲۶	۱	D8S1743		
(-۱/۱۲۹)	(۰/۶۶۸)	(-۲/۰۹۲)	(-۰/۹۷۵)	(-۲/۳۷۰)	(۱/۴۹۳)	(-۱/۳۴۹)	(-۲/۲۵۹)	(۰/۶۲۴)				
۰/۲۹۵	۰/۵۰۴	*۰/۰۳۶	۰/۳۲۹	*۰/۰۱۸	۰/۱۳۵	۰/۱۷۷	*۰/۰۲۳	۰/۵۲۶				
(۱/۱۲۹)	(-۰/۶۶۸)	(۲/۰۹۲)	(۰/۹۷۵)	(۲/۳۷۰)	(-۱/۴۹۳)	(۱/۳۴۹)	(۲/۲۵۹)	(-۰/۶۲۴)				

*معنی داری در سطح ۰/۰۵

جدول ۳. نتایج FBAT در بررسی ارتباط ژنتیکی سه میکروستلایت کروموزوم ۱۱ و میزان HDL-C، تری‌گلیسیرید و دور کمر در دو نژاد فارس و آذربایجانی دو نژاد ترکیب هر دو نژاد

(آماره Z) P-value									الل	میکروستلایت		
فارس و آذربایجانی			فارس و آذربایجانی			فارس و آذربایجانی						
دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C	دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C	دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C				
-----	-----	-----	۰/۳۷۵	۰/۸۰۶	۰/۹۸۱	۰/۱۸۷	۰/۹۸۳	۰/۴۷۹	۱	D11S1998		
-----	-----	-----	(-۰/۸۸۷)	(-۰/۲۶۴)	(-۰/۰۲۴)	(-۱/۳۱۸)	(-۰/۰۲۰)	(۰/۷۰۷)				
-----	-----	-----	۰/۳۷۵	۰/۸۰۶	۰/۹۸۱	۰/۱۸۷	۰/۹۸۳	۰/۴۷۹				
-----	-----	-----	(۰/۸۸۷)	(۰/۲۶۴)	(۰/۰۲۴)	(۱/۳۱۸)	(۰/۰۲۰)	(-۰/۷۰۷)				
۰/۴۷۶	۰/۳۶۶	۰/۵۳۶	۰/۲۶۷	۰/۸۸۱	۰/۵۰۶	۰/۳۹۸	۰/۸۷۸	۰/۸۱۸	۱	D11S934		
(-۰/۷۲۶)	(۰/۹۰۴)	(-۰/۶۱۹)	(۱/۱۰۸)	(-۰/۱۴۹)	(۰/۶۶۴)	(۰/۸۴۴)	(-۰/۱۵۲)	(۰/۲۲۹)				
۰/۴۷۶	۰/۳۶۶	۰/۵۳۶	۰/۲۶۷	۰/۸۸۱	۰/۵۰۶	۰/۳۹۸	۰/۸۷۸	۰/۸۱۸				
(-۰/۷۲۶)	(-۰/۹۰۴)	(۰/۶۱۹)	(-۱/۱۰۸)	(۰/۱۴۹)	(-۰/۶۶۴)	(-۰/۸۴۴)	(۰/۱۵۲)	(-۰/۲۲۹)				
۰/۲۰۴	۰/۹۷۶	۰/۵۹۷	۰/۵۰۶	۰/۷۲۳	۰/۲۶۴	۰/۷۳۳	۰/۶۶۹	۰/۲۶۴	۱	D11S1304		
(۱/۲۶۹)	(۰/۰۲۰)	(-۰/۵۲۸)	(-۰/۶۶۵)	(۰/۳۵۵)	(۱/۱۱۷)	(۰/۳۴۰)	(۰/۴۲۷)	(۱/۱۱۶)				
۰/۲۰۴	۰/۹۷۶	۰/۵۹۷	۰/۵۰۶	۰/۷۲۳	۰/۲۶۴	۰/۷۳۳	۰/۶۶۹	۰/۲۶۴				
(-۱/۲۶۹)	(-۰/۰۲۰)	(۰/۵۲۸)	(۰/۶۶۵)	(-۰/۳۵۵)	(-۱/۱۱۷)	(-۰/۳۴۰)	(-۰/۴۲۷)	(-۱/۱۱۶)				

مقادیر P و Z به دلیل کم بودن تعداد والدین ناهمگن در میکروستلایت D11S1998، برای صفات HDL-C، تری‌گلیسیرید و دور کمر در نژاد آذربایجانی قادر به محاسبه نبوده است.

جدول ۴. نتایج FBAT در بررسی ارتباط ژنتیکی سه میکروستلایت کروموزوم ۱۲ و میزان HDL-C. تری‌گلیسیرید و دور کمر در دو نژاد فارس و آذربایجانی هر دو نژاد

(Z) آماره P-value										الل	میکروستلایت		
فارس و آذربایجانی			فارس و آذربایجانی			فارس و آذربایجانی							
دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C	دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C	دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C					
۰/۸۳۱	۰/۹۲۸	۰/۶۹۲	۰/۶۳۶	۰/۵۸۲	۰/۴۴۵	۰/۶۱۹	۰/۷۲۴	۰/۵۰۴	۱	D12S1632			
(-۰/۲۱۳)	(۰/۰۹۰)	(۰/۳۹۶)	(۰/۴۷۲)	(۰/۵۴۹)	(-۰/۷۳۶)	(۰/۴۹۶)	(۰/۳۵۲)	(-۰/۶۶۸)					
۰/۸۳۱	۰/۹۲۸	۰/۶۹۲	۰/۶۳۶	۰/۵۸۲	۰/۴۴۵	۰/۶۱۹	۰/۷۲۴	۰/۵۰۴					
(۰/۲۱۳)	(-۰/۰۹۰)	(-۰/۳۹۶)	(-۰/۴۷۲)	(-۰/۵۴۹)	(۰/۷۳۶)	-۰/۴۹۶	(-۰/۳۵۲)	(۰/۶۶۸)					
۰/۸۳۰	۰/۵۰۹	۰/۱۷۰	۰/۴۰۷	۰/۵۶۹	۰/۵۹۰	۰/۵۸۸	۰/۷۱۸	۰/۳۷۸	۱	D12S96			
(۰/۲۱۴)	(-۰/۶۵۹)	(۱/۳۷۰)	(-۰/۸۲۸)	(-۰/۵۶۸)	(۰/۵۳۸)	-۰/۵۴۱	(-۰/۳۶۰)	(۰/۸۸۰)					
۰/۸۳۰	۰/۵۰۹	۰/۱۷۰	۰/۴۰۷	۰/۵۶۹	۰/۵۹۰	۰/۵۸۸	۰/۷۱۸	۰/۳۷۸					
(-۰/۲۱۴)	(۰/۶۵۹)	(-۱/۳۷۰)	(۰/۸۲۸)	(۰/۵۶۸)	(-۰/۵۳۸)	(۰/۵۴۱)	(۰/۳۶۰)	-۰/۸۸۰					
۰/۱۸۹	۰/۲۵۸	۰/۶۱۲	۰/۷۹۳	۰/۸۵۹	۰/۶۳۲	۰/۳۰۳	۰/۷۰۳	۰/۵۵۰	۱	D12S329			
(۱/۳۱۲)	(-۱/۱۳۰)	(۰/۵۰۷)	(۰/۲۶۱)	(-۰/۱۷۷)	(۰/۴۷۹)	(۱/۰۳۰)	(-۰/۳۸۱)	(۰/۵۹۷)					
۰/۱۸۹	۰/۲۵۸	۰/۶۱۲	۰/۷۹۳	۰/۸۵۹	۰/۶۳۲	۰/۳۰۳	۰/۷۰۳	۰/۵۵۰					
(-۱/۳۱۲)	(۱/۱۳۰)	(۰/-۵۰۷)	(-۰/۲۶۱)	(۰/۱۷۷)	(-۰/۴۷۹)	-۱/۰۳۰	(۰/۳۸۱)	-۰/۵۹۷					

جدول ۵. نتایج FBAT در بررسی ارتباط ژنتیکی دو میکروستلایت کروموزوم ۱۶ و میزان HDL-C. تری‌گلیسیرید و دور کمر در دو نژاد فارس و آذربایجانی و ترکیب هر دو نژاد

(Z) آماره P-value										الل	میکروستلایت		
فارس و آذربایجانی			فارس و آذربایجانی			فارس و آذربایجانی							
دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C	دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C	دور کمر	تری‌گلیسیرید	HDL-C					
۰/۸۳۶	۰/۲۶۹	۰/۷۸۳	۰/۴۱۴	۰/۲۵۵	۰/۴۵۳	۰/۵۲۶	۰/۵۰۲	۰/۴۶۵	۱	D16S2624			
(-۰/۲۰۶)	(-۱/۱۰۳)	(-۰/۲۷۵)	(۰/۸۱۵)	(۱/۱۳۷)	(-۰/۷۴۹)	(۰/۶۳۴)	(۰/۶۷۱)	(-۰/۷۲۹)					
۰/۸۳۶	۰/۲۶۹	۰/۷۸۳	۰/۴۱۴	۰/۲۵۵	۰/۴۵۳	۰/۵۲۶	۰/۵۰۲	۰/۴۶۵					
(۰/۲۰۶)	(۱/۱۰۳)	(۰/۲۷۵)	(-۰/۸۱۵)	(-۱/۱۳۷)	(۰/۷۴۹)	(-۰/۶۳۴)	(۰/۶۷۱)	(۰/۷۲۹)					
۰/۷۸۵	۰/۴۷۰	۰/۲۸۵	۰/۸۵۲	۰/۲۶۳	۰/۶۸۵	۰/۶۸۹	۰/۴۲۶	۰/۵۳۰	۱	D16S3096			
(-۰/۲۷۷۲)	(۰/۷۲۲)	(۱/۰۶۷)	(۰/۱۸۵)	(-۱/۱۱۹)	(۰/۴۰۵)	(۰/۳۹۹)	(-۰/۷۹۶)	(۰/۶۲۷)					
۰/۷۸۵	۰/۴۷۰	۰/۲۸۵	۰/۸۵۲	۰/۲۶۳	۰/۶۸۵	۰/۶۸۹	۰/۴۲۶	۰/۵۳۰					
(۰/۲۷۷۲)	(-۰/۷۲۲)	(-۱/۰۶۷)	(-۰/۱۸۵)	(۱/۱۱۹)	(-۰/۴۰۵)	(-۰/۳۹۹)	(۰/۷۹۶)	(-۰/۶۲۷)					

و دو میکروستلایت کروموزوم ۱۶ با میزان صفات HDL-C، تری‌گلیسیرید و دور کمر در دو نژاد فارس و آذربایجانی از جمعیت ایرانی پرداخت، به گونه‌ای که بخش‌هایی از کروموزوم ۸ در

بحث و نتیجه‌گیری

این تحقیق به کمک روش FBAT به بررسی ارتباط ژنتیکی بین چهار میکروستلایت کروموزوم ۸، سه میکروستلایت کروموزوم ۱۲، سه میکروستلایت کروموزوم ۱۶، سه میکروستلایت کروموزوم ۱۱، سه میکروستلایت کروموزوم ۱۰ و دور کمر در دو نژاد فارس و آذربایجانی هر دو نژاد

روش FBAT، ارتباط ژنتیکی SNP با کد rs3737787 مربوط به ژن USF1 با میزان HDL-C و میزان تری‌گلیسیرید و ارتباط ژنتیکی rs3737787 با میزان تری‌گلیسیرید معنی دار شد [۱۲]. در سال ۲۰۰۸، لداک و همکاران با اختیار داشتن اطلاعات ژنتیکی سی و شش SNP مستقر در کروموزوم ۱۷ برای ۱۶۹۶ نفر از ۵۸۳ خانواده با نژاد آفریقایی-آمریکایی، ۱۶۴۳ نفر از ۴۱۵ خانواده با نژاد مکزیکی-آمریکایی و ۱۴۰۹ نفر از ۴۹۸ خانواده با نژاد اروپایی-آمریکایی که این SNP‌ها در ارتباط با ژن APOH، HDL-C، LDL-C، تری‌گلیسیرید و کلسترول با این SNP‌ها با استفاده از روش FBAT پرداختند. در نژاد آفریقایی-آمریکایی، تنها یک SNP با کد rs1544556 با میزان HDL-C ارتباط ژنتیکی معنی داری را نشان داد. این در حالی است که ارتباط ژنتیکی هیچ یک از سی و شش SNP با میزان HDL-C در هیچ یک از دو نژاد مکزیکی-آمریکایی و اروپایی-آمریکایی معنی دار نشد. همچنین در نژاد مکزیکی-آمریکایی، تنها ارتباط ژنتیکی SNP با کد rs4791077 با میزان تری‌گلیسیرید معنی دار شد [۱۳]. در مطالعه دو مرحله‌ای که در سال ۲۰۰۸ توسط لی و همکاران با توجه به نتایج حاصل از روش پیوستگی ژنتیکی در بررسی پیوستگی بخشی از کروموزوم ۱۶ (۱۶q۲۳-q۲۴) با میزان HDL-C و با هدف تعیین دقیق‌تر مکان ژنتیکی موثر بر میزان HDL-C روی کروموزوم مذکور انجام گرفت، در مرحله اول، با به کار گیری اطلاعات ژنتیکی هزار و سیصد و هجده SNP مربوط به ناحیه کروموزومی مد نظر برای ۳۲۲ نفر از ۵۰ خانواده فنلاندی و استفاده از روش FBAT، ارتباط ژنتیکی بیست و پنج SNP مربوط به ژن‌های MAF، WWOX، ADAMTS18، CNTNAP4، ATBF1 و CDH13 معنی دار شد. با توجه به نتایج مرحله اول و با اضافه کردن اطلاعات ژنتیکی ۱۴۴ نفر از ۲۴ خانواده هلندی و ۴۶۷ نفر از ۲۸ خانواده فرانسوی به اطلاعات ژنتیکی مرحله اول، ارتباط ژنتیکی SNP با کد شناسایی rs2548861 مربوط به ژن WWOX با میزان HDL-C بالاترین سطح معنی داری

هر دو نژاد، ارتباط ژنتیکی معنی داری را با میزان صفات HDL-C و تری‌گلیسیرید نشان دادند.

به طور کلی بررسی ارتباط ژنتیکی در روش FBAT دارای دو مرحله است. نخستین مرحله شامل تعریف آماره آزمون مناسب ارتباط ژنتیکی (آماره امتیاز)، با در نظر گرفتن یک مدل ارتباط ژنتیکی بر مبنای مدل‌های خطی تعمیم‌یافته و تعریف یکتابع ربط مناسب برای ایجاد ارتباط بین داده‌های حاصل از ژنتیک‌ها و فنوتیپ‌های (صفات) فرزندان خانواده‌ها، و ساختن تابع درست‌نمایی از خانواده توزیع‌های نمایی برای تهیه آماره امتیاز مذکور، می‌باشد. دومین مرحله نیز شامل تعیین توزیع آماره آزمون به دست آمده در مرحله اول، تحت برقراری فرض عدم وجود ارتباط ژنتیکی، با در نظر گرفتن ژنتیک فرزندان به عنوان یک متغیر تصادفی و استفاده از محاسبه توزیع الل‌های نشان گرها در این فرزندان و شرطی کردن توزیع مورد انتظار این الل‌ها روی مقدار مشاهده شده فنوتیپ (صفت) مورد مطالعه در اعضای خانواده‌ها و ژنتیک نشان گرها و والدین، است. در این روش، آماره آزمون بر اساس تشکیل گروه کنترل به وسیله الل‌های انتقال نیافته و یا بر اساس روش‌های آماره‌های جایگشتی مثل مکنمارا با منتال هنزل به دست نمی‌آید. بلکه آماره آزمون بررسی ارتباط ژنتیکی، بر اساس روش آماری کلاسیک و مقارن شرطی کردن روی آماره بسته‌ای برای متغیرهای مخدوش کننده تحت برقراری فرض صفر محاسبه می‌گردد [۱۰]. از آن‌جا که عمل شرطی کردن، متغیرهای مخدوش کننده را از مطالعه خارج می‌کند، این روش در برابر مخدوش کننده‌هایی مثل بد تعیین کردن (Misspecification) مدل ژنتیکی و یا پدیده لایه‌بندی جمعیتی (Population Stratification) مقاوم خواهد بود [۱۱].

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۵ توسط هارتاس و همکاران بر روی ۳۱۴ نفر از ۲۴ خانواده مکزیکی و در جهت بررسی ارتباط ژنتیکی سیزده SNP مربوط به ژن‌های F11R، USF1 و LOC257106 مستقر در بخش ۱q۲۱ از کروموزوم ۱ و میزان تری‌گلیسیرید و HDL-C صورت گرفت، با استفاده از

و نسبت تقریباً ۳,۵ برابری اطلاعات ژنتیکی افراد با نژاد فارس نسبت به افراد با نژاد آذربایجان از کاستی‌های این تحقیق بر شمرد، به گونه‌ای که این امر موجب شده است که نتایج بررسی ارتباط ژنتیکی میزان صفات مد نظر با میکروستلاتیت‌های منتخب در ترکیب دو نژاد، با نتایج حاصل از همین بررسی در نژاد فارس یکسان شود. این در حالی است که در صورت وجود توازن در تعداد داده‌های ژنتیکی دو نژاد، بررسی ارتباط ژنتیکی صفات مد نظر در ترکیب دو نژاد، ممکن است به حصول نتایجی متفاوت با نتایج هر یک از نژادها بی‌انجامد. با این وجود، امید است که با یافتن میکروستلاتیت‌های موثر در میزان تغییرات HDL-C و تری‌گلیسیرید توسط روش مورد استفاده در این مطالعه، راه کارهای مناسبی برای طراحی مطالعات بعدی به منظور انتخاب مناطق کروموزومی جدید و نشانگرهای نزدیک‌تر به ژن‌های مستعدکننده سندروم متابولیک در جمعیت ایرانی فراهم آید.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از پژوهشکده علوم عدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به خاطر در اختیار قرار دادن داده‌های مربوط به مطالعه TLGS، کمال تشکر و قدردانی را به عمل می‌آوریم. این تحقیق بر گرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته آمار زیستی است.

منابع

[1] Spielman RS, McGinnis RE, Ewens WJ. Transmission test for linkage disequilibrium: the insulin gene region and insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM). Am J Hum Genet 1993; 52: 506-516.

[2] Harrap SB. Where are all the blood-pressure genes? Lancet 2003; 361: 2149-2151.

[3] NCEP. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285: 2486-2497.

[4] Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome. Lancet 2005; 365: 1415-1428.

[5] Azizi F, Salehi P, Etemadi A, Zahedi-Asl S. Prevalence of metabolic syndrome in an urban population: Tehran lipid and glucose study. Diabetes Res Clin Pract 2003; 61: 29-37.

را نشان داد [۱۴]. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۹ توسط لو و همکاران روی اطلاعات Genome Wide Scan مربوط به ۲۹۰۶ نفر از ساکنان ایسلند و در بررسی ارتباط ژنتیکی بین SNP های متعلق به نواحی مختلف کروموزوم‌ها و ۱۵ فنوتیپ انجام شد، با استفاده از روش FBAT، قسمتی از کروموزوم‌های ۴، ۱۱ و ۱۹ با میزان تری‌گلیسیرید و قسمتی از کروموزوم‌های ۵ و ۶ با میزان HDL-C ارتباط ژنتیکی معنی‌داری را نشان دادند. لازم به ذکر است، دو SNP با کد rs1800775 و rs4783962 که با میزان HDL-C ارتباط ژنتیکی معنی‌داری را نشان دادند، نزدیک به ژن CEPT هستند [۱۵]. در مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۹ توسط فی‌توسا و همکاران با توجه به نتایج پیوستگی ژنتیکی بین ناحیه کروموزومی ۱۵q21 و میزان HDL-C و حضور ژن LIPC در این ناحیه کروموزومی و درجهت تعیین دقیق‌تر مکان ژنتیکی اثرگذار بر میزان HDL-C انجام شد، اطلاعات ژنتیکی نوزده SNP مربوط به ژن LIPC در ۲۲۸ نفر از ۵۹۱ خانواده سفید پوست شرکت‌کننده در مطالعه قلب فرامینگهام با استفاده از روش FBAT مورد آنالیز ارتباط ژنتیکی قرار گرفتند. بعد از تعديل C HDL-C توسط مقادیر سن و جنس، ارتباط ژنتیکی HDL-C با کدهای rs261338 و rs261342 با میزان HDL-C معنی‌دار شد [۱۶].

همان‌طور که مشاهده می‌شود مطالعات اندکی در زمینه بررسی ارتباط ژنتیکی میکروستلاتیت‌ها با سندروم متابولیک و فاکتورهای آن انجام شده است. نتایج مطالعه حاضر در خصوص وجود ارتباط ژنتیکی میکروستلاتیت D8S514 با میزان HDL-C و میکروستلاتیت D8S1743 با میزان D8S1132 تری‌گلیسیرید در نژاد فارس و میکروستلاتیت‌های D8S1743 و D8S1744 با میزان HDL-C در نژاد آذربایجان و میکروستلاتیت D8S514 با میزان HDL-C و میکروستلاتیت D8S1743 با میزان تری‌گلیسیرید در ترکیب دو نژاد، در راستای تکامل مطالعات مذکور بوده و تفاوت نتایج این مطالعه و مطالعات قبلی را می‌توان به تفاوت در جوامع و نژادهای مورد بررسی نسبت داد. محدود بودن اطلاعات ژنتیکی مربوط به نژاد آذربایجان

- transcription factor 1 and linkage on chromosome 16q24.1. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005; 25: 1985-1991.
- [13] Leduc MS, Shimmin LC, Klos KL, Hanis C, Boerwinkle E, Hixson JE. Comprehensive evaluation of apolipoprotein H gene (APOH) variation identifies novel associations with measures of lipidmetabolisminGENOA. J. Lipid Res 2008; 49: 2648-2656.
- [14] Lee JC, Weissglas-Volkov D, Kyttälä M, Dastani Z, Cantor RM, Sobel EM, et al. WW-domain-containing oxidoreductase is associated with low plasma HDL-C levels. Am J Hum Genet 2008; 83: 180-192.
- [15] Lowe JK, Maller JB, Pe'er I, Neale BM, Salit J, Kenny EE, et al. Genome-wide association studies in an isolated founder population from the pacific island of kosrae. PLoS Genet 2009; 5: e1000365.
- [16] Feitosa MF, Myers RH, Pankow JS, Province MA, Borecki IB. LIPC variants in the promoter and intron 1 modify HDL-C levels in a sex-specific fashion. Atherosclerosis 2009; 204: 171-177.
- [17] Laird NM, Horvath S, Xu X. Implementing a unified approach to family-based tests of association. Genet Epidemiol 2000; 19: S36-S42.
- [6] Azizi F, Rahmani M, Emami H, Madjid M. Tehran lipid and glucose study: rationale and design. CVD Prevention 2000; 3: 242-247.
- [7] Daneshpour MS, Alfadhl S, Houshmand M, Zeinali S, Hedayati M, Zarkeš M, et al. Allele frequency distribution data for D8S1132, D8S1779, D8S514, and D8S1743 in four ethnic groups in relation to metabolic syndrome: Tehran lipid and glucose study. Biochem Genet 2009; 47: 680-687.
- [8] Daneshpour MS. The association of the low HDL-C level with 8(q22.1-q24.3), 11(q23.3-q25), 12(q13.12-q15), 16(q23.3-q24.3) Chromosomal region in metabolic syndrome family. [dissertation]. National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology 2009. (Persian).
- [9] Lunetta KL, Farone SV, Biederman J, Laird NM. Family based tests of association and linkage using unaffected sibs, covariates and interactions. Am J Hum Genet 2000; 66: 605-614.
- [10] Rabinowitz D, Laird N. A unified approach to adjusting association tests for population admixture with arbitrary pedigree structure and arbitrary missing marker information. Hum Hered 2000; 50: 211-223.
- [11] Lazzeroni LC, Lange K. A conditional inference framework for extending the transmission/disequilibrium test. Hum Hered 1998; 48: 67-81.
- [12] Huertas-Vazquez A, Aguilar-Salinas C, Lusis AJ, Cantor RM, Canizales-Quinteros S, Lee JC, et al. Familial combined hyperlipidemia in mexicans: association with upstream

پیوست (Supplement)

برای آشنایی با روش FBAT، فرض کنید که تعداد N خانواده هسته‌ای در اختیار باشد که این خانواده‌ها با اندیس n نمادگذاری شوند. هر خانواده تعداد n_i فرزند دارد که فرزندان هر خانواده با اندیس زنشان داده خواهند شد، به گونه‌ای که $j = 1, 2, \dots, n_i$. مقدار فنوتیپ مورد مطالعه در i امین فرزند i امین خانواده با Y_{ij} معرفی شده و تعریف می‌کیم $\mu_{ij} = E(Y_{ij})$. همچنین فرض کنید که Z_{ij} معرف کُد تعیین شده برای ژنتیپ نشان‌گر i امین فرزند خانواده i ام باشد. با به کارگیری مدل‌های خطی تعییم یافته¹ و تعریف رابطه :

$$L_{ij} = \beta_0 + \beta_1 X_{ij}$$

و با در نظر گرفتن تابع ربط 2 L_{ij} به صورت تبدیلی از μ_{ij} ، میان تابعی از فنوتیپ فرزندان و ژنتیپ آن‌ها ارتباط برقرار می‌گردد. تعیین آماره امتیاز³ مناسب برای بررسی ارتباط ژنتیکی، نیازمند محاسبه تابع درستنمایی⁴ فنوتیپ‌های Y_{ij} به شرط ژنتیپ‌های Z_{ij} است. با فرض خانواده توزیع‌های نمایی⁵، توزیع دوچمله‌ای برای فنوتیپ‌های کیفی دو حالت و توزیع نرمال برای فنوتیپ‌های کمی، لگاریتم تابع درستنمایی برای هر دو توزیع احتمال بیان شده به صورت :

$$\text{Log}\ell(\beta_0, \beta_1) = \sum_{ij} [Y_{ij} L_{ij} - a(L_{ij})]$$

خواهد بود به گونه‌ای که $a(L_{ij})$ تابعی از L_{ij} بوده و:

$$\frac{\partial a(L_{ij})}{\partial L_{ij}} = \mu_{ij}$$

1-Generalized linear model

2-Link function

3-Score statistics

4-Likelihood function

5-Exponential Family

بررسی فرض عدم وجود ارتباط ژنتیکی با آزمون فرض $H_0: \beta_1 = 0$ معادل است. با محاسبه مشتق اول لگاریتم تابع درستنمایی و قرار دادن $\beta_1 = 0$ ، آماره امتیاز S به صورت :

$$S = \sum_{ij} X_{ij} (Y_{ij} - \mu)$$

در دست خواهد بود. پارامتر μ را مقدار تعادل ۶ می‌نامند. این پارامتر تابعی از ژنتوتیپ نشان‌گرها نبوده اما به پارامترهای اغتشاش

که در مدل ارتباط ژنتیکی در نظر گرفته نشده‌اند وابسته خواهد بود. تعیین نادرست این پارامتر باعث ایجاد اریبی ۷ در آماره آزمون نمی‌شود، اما انتخاب مقدار صحیحی برای این پارامتر منجر به افزایش کارایی ۸ آماره آزمون S خواهد شد [۱]. در صورت کامل بودن داده‌های مربوط به ژنتوتیپ والدین، توزیع آماره S تحت برقراری فرض عدم وجود ارتباط ژنتیکی و با استفاده از توزیع شرطی جایگشتی ۹ الل‌های فرزندان به شرط مقدار فنوتیپ مورد مطالعه در تمام افراد موجود در خانواده‌ها و ژنتوتیپ والدین به دست خواهد آمد. در این شرایط توزیع مذکور از اصل جدایی ۱۰ مندل پیروی خواهد کرد. توزیع آماره S در صورت وجود هر گونه ساختاری از ژنتوتیپ‌های مفقود شده والدین، توسط الگوریتم FBAT و با در نظر گرفتن ژنتوتیپ مشاهده شده والدین و ساختار ژنتوتیپی فرزندان، به عنوان آماره بسنده ۱۱ ای برای ژنتوتیپ‌های مفقود شده و شرطی کردن روی مقدار فنوتیپ مشاهده شده در اعضای خانواده، ژنتوتیپ موجود والدین و آماره بسنده‌ای که برای ژنتوتیپ‌های مفقود شده والدین تعریف می‌گردد، محاسبه می‌شود [۲]. با در اختیار بودن توزیع احتمالی آماره S ، در صورتی که تعداد خانواده‌های هسته‌ای به اندازه کافی بزرگ باشد، می‌توان امید ریاضی و واریانس آماره مذکور را برای هر خانواده و تحت توزیع آن به دست آورده، با معرفی :

$$U = \sum_i [S_i - E(S_i)]$$

و به کارگیری تقریب نرمال، آماره آزمون :

$$Z = \frac{U}{\sqrt{\sum_i Var(S_i)}}$$

را برای بررسی ارتباط ژنتیکی به کار بست. لازم به ذکر است که Z برای هر یک از الل‌های نشان‌گرها مورد بررسی محاسبه شده و تحت برقراری فرض عدم وجود ارتباط ژنتیکی از توزیع نرمال استاندارد پیروی می‌کند [۳].

منابع

[1] Lunetta KL, Farone SV, Biederman J, Laird NM. Family based tests of association and linkage using unaffected sibs, covariates and interactions. Am J Hum Genet 2000; 66: 605-614.

[2] Rabinowitz D, Laird N. A unified approach to adjusting association tests for population admixture with arbitrary pedigree structure and arbitrary missing marker information. Hum Hered 2000; 50: 211-223.

[3] Laird NM, Horvath S, Xu X. Implementing a unified approach to family-based tests of association. Genet Epidemiol 2000; 19: S36-S42.

6-Offset value

7-Bias

8-Efficiency

9-Conditional permutation distribution

10-Principle of segregation

11-Sufficient statistics

Genetic association of selected microsatellite with some metabolic syndrome components in Iranian Fars and Azari families

Nima Hosseinzadeh (M.Sc)^{*1}, Yadolah Mehrabi (Ph.D)², Maryam Sadat Daneshpour (Ph.D)³, Hamid Alavi Majd (Ph.D)¹, Fereidoun Azizi (M.D)⁴

1 - Dept. of biostatistics, Faculty of Paraclinical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 - Dept. of Epidemiology, Faculty of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 - Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti university of Medical Science, Tehran, Iran

4 - Endocrine research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran

(Received: 9 Jul 2011 Accepted: 25 Jan 2012)

Introduction: Family base association test (FBAT) is widely used in study of genetic association of allele of genetic markers and different phenotype for locating genes locus. The present study attempted to investigate the genetic association of some candidate microsatellites with HDL-C, triglyceride, and waist in order to find chromosomal area locus of effective genes in metabolic syndromes in Persian and Azari people of Iran.

Materials and Methods: in this study 107 families were selected from participants in Tehran Lipid and Glucose Study. Each family had at least one member with metabolic syndrome (according to ATP III) and at least two members with reduced HDL-C level. The genetic association of HDL-C, triglyceride, and waist with some candidate microsatellites in chromosome 8, 11, 12, and 16 was studied using FBAT.

Results: the data covered 107 families consisting of 483 individuals. For Persian individuals, study of Chromosome 8 revealed significant association between D8S514 and HDL-C and between D8S1743 and triglyceride ($P<0.05$). For Azari individuals, association of D8S1132 and D8S1743 in Chromosome 8 to HDL-C was significant ($P<0.05$).

Discussion: FBAT is robust against confounders such as misspecification of genetic models and population stratification. By finding microsatellites affecting HDL-C, triglyceride, and waist, the results found in this study may be helpful in determining predisposing genes in metabolic syndrome.

Key words: FBAT, Microsatellite, HDL-C, Triglyceride, Metabolic syndrome

* Corresponding author: Fax: +98 21 22707347; Tel: +98 09126350910
nima_ingwie@yahoo.com