

(گزارش موردنی)

گزارش یک مورد نادر شکستگی دررفتگی هیپ همراه شکستگی

سابتروکانتریک همان سمت در یک کودک ۶ ساله

علیرضا موسویان^۱ (M.D)، محمدحسین طراز جمشیدی^۱ (M.D)، حامی اشرف^۲ (M.D)، جعفر رضازاده^{۱*} (M.D)، علی بیرجندی نژاد^۱ (M.D)

- دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان شهید کامیاب، مرکز تحقیقاب ارتودنسی و ترومما، گروه جراحی ارتودنسی
- بیمارستان رضوی مشهد، واحد پژوهش

چکیده

دررفتگی تروماتیک هیپ (THD) یک آسیب ناشایع در اطفال محسوب می‌شود و کمتر از ۵ درصد دررفتگی‌های اطفال را تشکیل می‌دهد و البته یک اورزانس ارتودنسی می‌باشد. مکانیسم این دررفتگی در زیر ۶ سال ترومای با انرژی کم و در بالای ۶ سال ترومای با انرژی بالا می‌باشد و دررفتگی‌های خلفی شایع‌تر گزارش شده است.

یکی از ضایعات شایع همراه با دررفتگی هیپ در کودکان آسیب دیواره خلفی استابولوم است؛ به دلیل این‌که ایجاد دررفتگی در هیپ اطفال با انرژی کم ایجاد می‌شود، دررفتگی همراه با شکستگی ستون‌های استابولوم بسیار نادر است و موارد کمی از همراهی دررفتگی هیپ با شکستگی شفت‌فمور در زیر ۶ سال گزارش شده است.

هدف از این مطالعه گزارش یک مورد نادر دررفتگی خلفی هیپ همراه با شکستگی سابتروکانتریک و ستون قدامی استابولوم همان سمت بود. به دلیل آسیب‌های همراه شدید ریداکشن بسته در اورزانس ممکن نشد و جراحی نیز با تأخیر ۴۸ ساعته، شامل ریداکشن هیپ و حذف لیگامان گرد و فیکساسیون شکستگی سابتروک با پلاک ۳/۵ انجام شد.

در پی‌گیری به مدت شش ماه که به دلیل آسیب‌های وسیع همراه در ICU صورت گرفت، محدوده حرکتی خوب و علائم جوش‌خوردن در رادیوگرافی مشهود بود. در پی‌گیری ۱۵ ماه بعد حال عمومی خوب و تغییرات احتمالی نکرزو آواسکولار مشاهده نشد.

واژه‌های کلیدی: دررفتگی مفصل ران، شکستگی‌های استخوان لگن، کودک پیش دبستانی

شکستگی‌ها بسیار نادر است [۱].

برای ایجاد یک دررفتگی خلفی میزان بالای نیرو در حالت فلکشن هیپ و زانو باید به ران وارد شود و اگر میزان فلکشن هیپ کافی نباشد به جای یک دررفتگی خالص باعث یک شکستگی دررفتگی در هیپ خواهد شد. دررفتگی هیپ معمولاً به دنبال تصادفات و سایل تقلیله،

مقدمه

هیپ یک مفصل سینوویال با پایداری اولیه بالا است که با عضلات و لیگامان‌ها تقویت می‌شود. البته پایداری استخوانی و لیگامانی در اطفال به دلیل رشد کم استابولوم و لاکسیتی لیگامانی کمتر از بالغین است که شایع‌ترین تظاهر آن تمایل به درفتگی خلفی می‌باشد. سایر انواع دررفتگی و نیز

سابتروک کاتریک با کامنیوشن مدیال و دررفتگی خلفی هیپ و نیز شکستگی استابولوم مشهود بود (شکل ۳).

در ناحیه شکستگی-دررفتگی زخم باز وجود نداشت. اما دگلاوینگ بسته وسیع نسج نرم و اکیموز گسترده مشهود بود. بیمار انگشتان پای چپ را به خوبی حرکت نمی‌داد. ابتدا سعی در ریداکشن بسته تحت مانیتورینگ بی‌هوشی شد که متاسفانه موفق آمیز نبود و بیمار آماده عمل اورژانس ارتودسی شد.

طبق سی‌تی سر و گردن فمور سالم و شکستگی دیواره قدامی استابولوم مشهود بود (شکل ۴). دو روز بعد از حادثه امکان جراحی ارتودسی میسر شد. بیمار در پوزیشن لترال تحت اپروج خلفی کوخر قرار گرفت (شکل ۵).

در محل عمل دگلاوینگ بسته شدید با هماتوم فراوان مشهود بود. عضلات اکسترناł روتاتور کاملاً پاره و عصب سیاتیک با حفظ امتداد کنتوزیون داشت و تحت فشار سر در رفته بود. کپسول خلفی پاره و اینتربیوز بود که با کنار زدن آن و دبریدمان لیگامان ترس پاره ریداکشن باز انجام شد. با امتداد دادن همان انسزیون در لترال هیپ شکستگی سابتروکاتریک با پلاک ال‌سی‌پی شش سوراخه و دو پیچ در قطعه پروگریمال گردن فیکس گردید (شکل ۶).

بعد عمل بیمار به دلیل آسیب‌های هم‌راه به مدت ۱۵ روز مجدد در ICU بستری شد و در این مدت فیزیوتراپی اندام‌ها انجام شد. آسیب دگلاوینگ به تدریج به سمت نکروز پوستی وسیع پیشرفت که به دلیل عدم سوار شدن عفونت با گرفت پوستی ضخامت پارشیل از شکم درمان شد. در پی‌گیری ۶ ماهه حرکات فعل هیپ کامل و وزن‌گذاری بدون کمک برای بیمار به دست آمد.

در آخرین فالوآپ بیمار ۱۵ ماه بعد تشخیص، حال عمومی بیمار خوب بود و وی از نتایج جراحی رضایت کامل داشت. در راه رفتن بدون وسایل کمکی و بالا رفتن از پله‌ها به جز لنگشی خفیف مشکلی نداشت و هیچ‌گونه دردی را نیز ذکر نمی‌کرد. بیمار در انجام کارهای روزانه مانند پوشیدن کفش و جوراب، نشستن روی صندلی، و... خودکفا بود. در اندام

سقوط از ارتفاع، و فعالیت‌های ورزشی ایجاد می‌شود [۲]. و شامل ۲ الی ۵ درصد دررفتگی‌های مفاصل می‌باشد [۳]. با وجود این که دررفتگی هیپ در اطفال با نیروی خیلی کم‌تر ایجاد می‌شود، در بچه‌ها (به‌ویژه زیر ۵ سال) نوع تروماتیک آن نادر است و شیوع آن ۲۵ برابر کم‌تر از بالغین گزارش شده است [۴،۳]. به همین دلیل موارد خیلی کمی از این دررفتگی منتشر شده است که فقط به صورت گزارش موردی است. در جستجوی ما هیچ موردی از دررفتگی هم‌راه با شکستگی سابتروک اتریک و ستون قدامی استابولوم در اطفال گزارش نشده است.

گزارش مورد

بیمار پسر ۴ ساله‌ای بود مورد مولتیپل ترومما، که به دنبال تصادف جاده‌ای (واژگونی اتوموبیل سواری با سرعت بالا در جاده) ابتدا به مرکز درمانی شهرستان مراجعه نموده و به صورت اورژانس تحت لایپاروتومی و سیستوستومی باز و ترمیم جراحات قرار گرفته بود؛ و بعد از ۴ ساعت به مرکز ما ارجاع شد.

در بدو مراجعه، بیمار با علائم حیاتی پایدار و اختلال هوشیاری با GCS=10 پذیرش شد. در معاینه اولیه و اقدامات تشخیصی، بیمار با تشخیص هماتوم خلف صفاق و ترومای مجرای ادراری و جراحت ۵ سانتی‌متری پرینه و لترال ران راست و شکستگی ساب تروکاتریک و دررفتگی خلفی هیپ چپ بستری شد. و در همان روز به بخش آی‌سی‌یو با منتقل شد (شکل ۱). که در بدو ورود بیمار به آی‌سی‌یو با وجود کاهش سطح هوشیاری به GCS=14، علایم حیاتی پایدار بود. برای بیمار تشخیص کنتوزیون moderate مغزی و ریوی داده شد.

در معاینه اندام‌ها جراحات ناحیه تناسلی و هیپ راست به صورت دی‌گلاوینگ ترمیم شده از قبل مشهود بود. اندام تحتانی چپ با تورم متوسط در قسمت فوقانی ران چپ و چرخش خارجی اندام کوتاهی حدود ۸ سانتی‌متر را نشان می‌داد (شکل ۲). در گرافی‌های انجام شده شکستگی



شکل ۴. سی تی اسکن استاتابولوم و هیپ بیمار ۴ ساله قبل از ریداکشن. سر و گردن فصور سالم و شکستگی لبه قدامی استاتابولوم مشهود است



شکل ۵. اپروج کوخر برای ریداکشن هیپ و سابتروک بیمار در اتاق عمل جراحی دو روز بعد از حادثه



شکل ۶. رادیوگرافی کامل لگن در نمای رو به رو بعد از ریداکشن و فیکساسیون شکستگی با پلاک ال سی پی شش سوراخه. ریداکشن شکستگی مطلوب و مفصل در مقایسه با طرف مقابل congruous است

دفورمیتی و محدودیت به چشم نمی خورد و دامنه حرکات در تمام جهات طبیعی بود.



شکل ۱. تصویر بیمار ۴ ساله با شواهد آسیب متعدد در زمان پذیرش که در بخش ICU بستری بوده است



شکل ۲. تصویر اندام های تحتانی بیمار با حدود هشت سانتیمتر کوتاهی و چرخش خارجی اندام درست مچ در روز پذیرش



شکل ۳. رادیوگرافی لگن بیمار در نمای رو به رو قبل از عمل جراحی. شکستگی سابتروکانتریک با کامنیوشن مدیال و در رفتگی خلفی هیپ مشهود است

عارضه دیگری که در عدرصد موارد دیده می‌شود کندرولیز است که به صورت غیر جراحی درمان می‌شود [۱۲].

در صورت انجام ریداشن بسته در ۲۶ درصد موارد پهن شدگی فضای مفصل هیپ دیده می‌شود که می‌تواند به دلیل احتمال وجود همارتروز باشد. لذا در صورت روئیت این عارضه بهتر است چند روز صبر کنیم و رادیوگرافی تکرار گردد. اگر پهن شدگی برطرف نشد با تشخیص احتمال اینتریوزیشن سی‌تی اسکن یا ام‌آرآی انجام می‌شود.

شکستگی سابتروک را می‌توان با بلید اطفال یا هیپ اسکروی اطفال فیکس کرد. در این مطالعه، ما از پلاک ال‌سی‌پی ۳/۵ با پیچ‌های لاک به صورت پرهبند استفاده کردیم. فیکساسیون استیبل و آسانی که در این روش به دست آمد به دلیل در دسترس بودن و ارزانی تکنیک، و نیز امکان گذاشتن دو پیچ در گردن فمور با مکانیسم لاک، می‌تواند در موارد مشابه استفاده شود.

تشکر و قدردانی

با تشکر از خانم ناهید مجاور و کلیه پرسنل مرکز تحقیقات ارتپیدی و ترومای بیمارستان امدادی که در گرآوری اطلاعات و بی‌گیری بیمار در این مورد ما را یاری نمودند.

منابع

- [1] Minhas MS. Traumatic hip dislocations in children. J Pak Med Assoc 2010; 60: 1019-1022.
- [2] Haugaad K, Thonsen PB. Traumatic hip dislocation in children. Follow up of 13 cases. Orthopaedics 1989; 12: 375-378.
- [3] Reigr H, Pennig D, Klein W, Grunest J. Traumatic dislocation of the hip in young children. Arch Orthop Trauma Surg 1991; 110: 114-117.
- [4] Schlonsky J, Miller PR. Traumatic hip dislocations in children. J Bone Joint Surg Am 1973; 55: 1057-1063.
- [5] Hamilton PR, Broughton NS. Traumatic hip dislocation in childhood. J Pediatr Orthop 1998; 18: 691-694.
- [6] Salisbury RD, Eastwood DM. Traumatic dislocation of hip in children. Clin Orthop Relat Res 2000; 377: 106-111.
- [7] Sanjay P, Prasad N, Raman S, Kamal A. Posterior dislocation of the hip in a child following trivial trauma: a case report. Intern J Emerg Med 2004; 1.
- [8] Reggiori A, Brugo G. Traumatic anterior hip dislocation associated with anterior and inferior iliac spines avulsions and a capsular-labral lesion. Strategies Trauma Limb Reconstr 2008; 3: 39-43.

بحث و نتیجه‌گیری

در رفتگی تروماییک هیپ یک آسیب ناشایع در اطفال محسوب می‌شود و کمتر از ۵ درصد در رفتگی‌های اطفال را تشکیل می‌دهد [۵]. THD در اطفال صرف نظر از اتیولوژی آن یک اورژانس ارتپیدی می‌باشد. که نیازمند تشخیص و مداخله فوری است [۶].

در اطفال به دلیل امکان در رفتگی با انژری کم همراهی با شکستگی ستون‌های استابولوم یا ناحیه سابتروکاتریک نادر است [۷].

یکی از آسیب‌های شایع همراه با در رفتگی هیپ در کودکان آسیب عصب سیاتیک است که در ۵ درصد موارد دیده شده و ۶۰ درصد ریکاوری دارد [۷]. در این مورد آسیب عصب سیاتیک قبل ریداکشن باز وجود داشت که در طی یک ماه بهبودی حاصل شد.

عوامل مانع ریداکشن در رفتگی خلفی شامل کپسول لاپروم و قطعه استئونکندرال در داخل استابولوم می‌باشد [۸]. که در این مورد کپسول عامل بلوك ریداکشن بود.

یک عامل نادر باقی ماندن درد بعد از در رفتگی هیپ پارگی لیگامان ترس است که باید در پی‌گیری‌های بعدی لحاظ شود.

به طور کلی استئونکروز در ۱۰ درصد موارد دیده می‌شود که اگر شدت ترومای اولیه در حدی باشد که عضله ابتراتور اکسترن پاره شود رسک آن بالا می‌رود چنان‌چه ریداکشن بالا ۶ ساعت اول انجام نشود احتمال استئونکروز بسیار بالا می‌رود اما نوع مراقبت بعد از ریداکشن تاثیری بر میزان این عارضه ندارد [۹]. باید توجه داشت که استئونکروز در کودک کم‌سن تظاهری مشابه پرتس دارد و تشخیص این عارضه نیاز به حداقل ۲ سال پی‌گیری با رادیوگرافی دارد [۱۰]. در مطالعه ما پس از ۱۵ ماه پی‌گیری شواهدی از استئونکروز مشاهده نشد.

گاهی نیز به دلیل هیرامی پست تروماییک عارضه کوکسامگنا ایجاد می‌شود که عمدهاً نیاز به درمان ندارد [۱۱].

[11] Taheri Azam A, Shahraki K. Traumatic dislocation of the hip in an 18-month child: A case report and review of literature. Zahedan J Res Med Sci 2008; 10: 247-252. (Persian).

[12] Kutty S, Thornes B, Curtin WA, Gilmore MF. Traumatic posterior dislocation of hip in children. Pediatr Emerg Care 2001; 17: 32-35.

[9] Forde JC, Khan KS, Awan N. Traumatic posterior dislocation of the hip in a 3-year-old child. Pediatr Emerg Care 2009; 25: 584-585.

[10] Yamamoto K, Ko M, Masaoka T, Shishido T, Imakiire A. Traumatic anterior dislocation of the hip associated with ipsilateral femoral shaft fracture in a child: A case report. J Orthop Surg 2004; 12: 126-132.

Case report

A 4 year-old child with posterior hip dislocation and simultaneous subtrochanteric and anterior column fracture

Alireza Mousavian (M.D)¹, Housein TarazjamshidiMohamad (M.D)¹, Hami Ashraf (M.D)², Jafar Rezazadeh (M.D)¹, Ali Birjandinejad (M.D)^{1*}

1 - Orthopedic and Ttrauma Research Center, Shahid-Kamyab Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 - Research unit, Razavi Hospital, Mashhad, Iran

(Received: 27 Nov 2012; Accepted: 20 May 2013)

Traumatic hip dislocation is an uncommon injury in children and consists of less than 5% of their dislocations; but it's one of the real orthopedic urgency. Its mechanism is low energy trauma in below 6 years old and high energy trauma above it.

One of the common associated complications with hip dislocation is posterior wall injuries but column fractures are very rare. We reported an uncommon case of posterior hip dislocation with simultaneous subtrochanteric fracture and anterior column fracture, in which close reduction was impossible. Because of sever associated injuries surgery was done with 48 hours delay including open reduction of dislocation and fracture, and internally fixation of the subtrochanteric fracture with 3.5mm locked plate.

In 6 month follow up that was done in ICU, range of motion and stability was good and union sign was visible on radiography. After 15 months the patient general conditions was good and no sign of avascular necrosis was seen

Keywords: Hip dislocation, Hip fracture, Preschol child

Corresponding author: Fax: +98 511 8549234 Tel: +98 09151590596
birjandinejada@mums.ac.ir

How to cite this article:

Mousavian A, Tarazjamshidi M, Ashraf H, Rezazadeh J, Birjandinejad A. A 4 year-old child with posterior hip dislocation and simultaneous subtrochanteric and anterior column fracture. koomesh. 2013; 15 (1) :125-129

URL http://www.koomeshjournal.ir/browse.php?a_code=A-10-1705-1&slc_lang=fa&sid=1

نحوه ارجاع به این مقاله:

موسیان علیرضا، طراز جمشیدی محمدحسین، اشرف حامی، رضازاده جعفر، بیرجندی نژاد علی.
گزارش یک مورد نادر شکستگی درفتگی هیپ همراه شکستگی سابتروکانتریک همان سمت در یک کودک ۴ ساله. کومش . ۱۳۹۲ ; ۱۵ (۱) : ۱۲۹-۱۲۵