



Semnan University of Medical Sciences

KOOMEESH

Journal of Semnan University of Medical Sciences

Volume 21, Issue 1 (Winter 2019), 1-204

ISSN: 1608-7046

Full text of all articles indexed in:

Scopus, Index Copernicus, SID, CABI (UK), EMRO, Iranmedex, Magiran, ISC, Embase

گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر هایپرپلازی پاپیلاری التهابی بدون دنچر

مریم جلیلی صدرآباد^{۱*}(DDs,Msc)، نازیلا عاملی^۲(DDs, MSc)، محمدحسین امیرزاده ایرانق^۳(DDs)

۱-بخش بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

۲-بخش ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

۳-دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی‌بیزد، بیزد، ایران

تاریخ دریافت: تاریخ پذیرش:

* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۲۲۷۹۵۲۵۷ Dr.njalili@gmail.com

چکیده

هدف: هایپرپلازی التهابی پاپیلاریا (Inflammatory papillary hyperplasia, IPH) ضایعه خوش‌خیم مخاطی است که معمولاً کام سخت را در افرادی که از دنچر (دست دندان) استفاده می‌کنند، درگیر می‌کند. اکثر بیماران از وقوع آن ناآگاه هستند اما بعضی سوزش و ناراحتی دارند. نشان داده شده است که IPH با استفاده ۲۴ ساعته از دنچر، به خصوص در شب ارتباط دارد. علی‌رغم پاتوژنز اصلی ناشناخته از آن جایی که استفاده از دنچرهای با تطابق نامناسب و قدیمی و تکثیر میکرووارگانیسم‌ها از علل اصلی IPH دانسته شده است و طرح ریزی درمان‌ها بر این اساس گذاشته شده. این مقاله به توصیف و گزارش یک مورد نادر از IPH در بیماری فاقد دنچر پرداخته است.

گزارش مورد: بیمار خانم ۲۹ ساله از نظر سیستمیک سالم، به بخش بیماری‌های دهان دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه شهید صدوqi یزد جهت معاینه دندان دردناک مراجعه نمود. درمعاینه داخل دهانی روتینیک پلاک با سطح Pebby، قرمز، با حدود نامشخص و نامنظم در فروفتگی غیر نرمال موجود در کام مشاهده شد. دهان‌شویه نیستاتین تجویز شد. بررسی دوباره یک هفته پس از استفاده از دارو انجام شد. سایز ضایعه و اریتم سطحی کاهش یافته و به طور کلی ضایعه بهتر شده بود. به علت عدم ایجاد علائم و ناراحتی بیمار در جلسات فالواپ بعدی شرکت نکرد.

نتیجه‌گیری: IPH همیشه در ارتباط با دنچر نیست و کام عمیق و ابنورمالیتی‌های کام نیز می‌تواند از علل بروز این ضایعه باشد که نیازمند درمان‌های تیمی توسط پزشکان و دندان‌پزشکان جهت برطرف شدن کامل این مشکل می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: هایپرپلازی، التهاب مخاط دهان ناشی از دندان مصنوعی، دست دندان، کام

مطالعات اخیر نشان داد تمایل جنسی وجود ندارد. ضایعه معمولاً در فک بالایش‌تر از نواحی دیگر رخ می‌دهد که احتمالاً به خاطر پوشش بیش‌تر دندان مصنوعی فک بالا می‌باشد [۷,۶]. البته مواردی نیز در مندیبل گزارش شده‌اند [۸]. نشان داده شده است که رابطه مستقیم بین استفاده ۲۴ ساعته از دنچر، به خصوص در شب با پیشرفت IPH و افزایش خطر استوماتیت فک بالا وجود دارد. کاهش جریان بزاق در شب و به دنبال آن افزایش تکثیر میکرووارگانیسم‌ها می‌تواند توضیحی بر این موضوع باشد [۹].

در تحقیقات قبلی، IPH از نظر بالینی و هیستولوژی به صورت فراوان مورد بررسی قرار گرفته، اما اتیولوژی آن هم‌چنان مورد بحث باقی مانده است [۱] موارد زیر به عنوان عوامل احتمالی اتیولوژیک تعریف شده‌اند: دنچر با تطابق ضعیف، کاربرد مداوم روزانه و شبانه دنچر، بهداشت دهانی ضعیف، تنفس دهانی، حساسیت به لاینرهای دنچر، مصرف

مقدمه

هایپرپلازی التهابی پاپیلاریا (Inflammatory papillary hyperplasia, IPH) ضایعه خوش‌خیم مخاطی است که معمولاً کام سخت را درگیر می‌کند اما در بعضی موارد روی مخاط ریج الونر ماندیبل مشاهده می‌شود [۲,۱]. معمولاً این ضایعه همراه استفاده از دنچر (دست دندان) که پوشانده کام باشد اتفاق می‌افتد، اما در بیمارانی که پروتز کامل فک بالا نداشته‌اند نیز گزارش شده است [۳]. ضایعه غالباً بدون درد، سفت، صورتی یا قرمز و دارای پرولیفراسیون نودولار مخاط است. اکثر بیماران از ایجاد آن ناآگاه هستند اما بعضی سوزش و ناراحتی دارند [۴,۱].

ویژگی‌های هیستوپاتولوژیک این ضایعه در مطالعات این گونه شرح داده شده که بعضی ویژگی‌های یک پاپیلومای واقعی و بعضی ویژگی‌های التهابی را دارا می‌باشد [۵].



شکل ۱. پلاک با سطح pebbly، کمی قرمزتر از مخاط اطراف



شکل ۲. پلاک قرمز با سطح pebbly با حدود نامشخص و نامنظم به طول قدامی-خلفی ۱/۵cm در عرض ۱cm در بین برجستگی های روگا و خلف روگا در تقرع و فرورفتگی غیر نرمال موجود در کام

دهان شویه نیستاتین ۱۰۰۰۰۰ suspension واحد روزانه چهار بار (۳ بار بعد از غذا و یکبار قبل از خواب) با غرغره کردن در دهان به مدت حداقل ۲ دقیقه (هر بار ۲۵ قطره) و عدم مصرف مواد غذایی و نوشیدنی تا ۳۰ دقیقه بعد تجویز شد. بررسی دوباره یک هفته پس از استفاده از دارو انجام شد. سایز ضایعه و اریتم سطحی کاهش یافته و به طور کلی ضایعه بهبود یافته بود. به علت عدم ایجاد علائم و ناراحتی بیمار در جلسات فالوآپ بعدی شرکت نکرد.

بحث و نتیجه‌گیری

هاپرپلازی پاپیلاری التهابی (IPH) یک ضایعه مخاطی است که معمولاً کام سخت را درگیر می‌کند اما ممکن است گاهی استثنائاً روی مخاط ریج آلوئول در فک پایین دیده می‌شود. در مطالعات قدیمی نشان داده شده است که ۵۳٪ IPH ضایعات واکنشی حفره دهان را تشکیل می‌دهد ولی در مطالعات جدیدتر ۲-۳٪ گزارش شده است [۱۶,۹].

IPH غالباً با استفاده از دنچر با تطابق کم با پوشش کام مرتبط است. این ضایعه بدون درد بوده، قوام سفت، رنگ صورتی تا قرمز دارد. این ضایعه سه مرحله دارد: در مرحله اول قرمزی لوکالیزه روی مخاط مشاهده می‌شود، در مرحله دوم قرمزی منتشر و در مرحله آخر برجستگی های پاپیلاری ایجاد

تنباکو، تغییرات مرتبط با سن، کام عمیق و برخی شرایط سیستمیک [۱۰]. هم‌چنین IPH می‌تواند همراه با کلنویزه شدن کاندیدا ناشی از بهداشت دهانی ضعیف باشد [۱۱].

در رابطه با تنفس دهانی، مطالعات متعددی نشان داده‌اند که افراد با این ویژگی، صورت‌های طویل‌تر و ماگزیلای باریک و عمیق‌تری داشته‌اند [۱۲]. این بیماران نیاز به درمان‌های تیمی (multidisciplinary) برای رفع مشکل دارند که کاربرد ابزار اکسپنشن ارتودنسی برای عریض کردن ماگزیلای و اصلاح آناتومی سقف کام از جمله آن‌ها است [۱۳]. یک مورد نادر از گزارش بروز IPH در کودک ۱۰ ساله، نشان می‌دهد که این ضایعه می‌تواند مرتبط با بهداشت دهانی ضعیف و تنفس دهانی باشد [۱۴].

از عوامل دیگری که می‌تواند منجر به تنگی در فک بالا و ایجاد تغییر در فرم کام شود، عادات دهانی بلندمدت مانند مکیدن پستانک یا شیشه شیر است. همان‌طور که نوروزی و همکاران در مطالعه خود نشان دادند که کودکان با عادات طولانی مکیدن، ریسک بالاتری جهت ایجاد این بایت قدامی و کراس بایت خلفی ناشی از محدودیت رشد ماگزیلای در بعد طرفی را خواهند داشت [۱۵].

نوع درمان IPH مرتبط با شدت ضایعه و نمای کلینیکی بوده و از کاربرد دهان‌شویه کلرهگزیدین و داروهای ضد قارچی در موارد خفیف تا الکتروسرجری در موارد شدید متفاوت است [۳].

از آنجایی که استفاده از دنچر علت اصلی هیپرپلازی التهابی پاپیلاری دانسته شده است، این مقاله به توصیف و گزارش یک مورد نادر از هیپرپلازی التهابی پاپیلاری در بیماری که دنچر نداشت پرداخته است.

گزارش مورد

بیمار خانم ۲۹ ساله با شکایت اصلی درد دندان عفونت کرده به بخش بیماری‌های دهان دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه شهید صدوqi بیزد مراجعه نمود. دندان نیاز به درمان کاتال ریشه داشت. بیمار از نظر سیستمیک سالم بود، در معاینه خارج دهانی مورد مرتبطی وجود نداشت اما در معاینه داخل دهانی روتین یک پلاک با سطح pebbly، کمی قرمزتر از مخاط اطراف با حدود نامشخص و نامنظم به طول قدامی-خلفی ۱/۵ cm در عرض ۱cm مشاهده شد. ضایعه در بین برجستگی‌های روگا و خلف روگا در ناحیه‌ای که کام فرد به شکل غیر نرمال مقعر بود دقیقاً در تقرع و فرورفتگی غیر نرمال موجود در کام قرار داشت. ضایعه بدون درد و علامت بود و بیمار از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد (شکل ۱ و ۲).

در یک مطالعه گزارش موردي، GualVaquez بروز IPH را در یک مرد ۶۰ ساله بدون سابقه پوشش دنچر در فک بالا گزارش نمودند. بر اساس ارزیابی های انجام شده عواملی نظیر بهداشت دهانی ضعیف، مصرف تباکو و احتمال کلونیزه شدن کاندیدا را به عنوان اتیولوژی این ضایعه عنوان داشتند [۲۱].

معمولًا تشخیص این ضایعه بالینی است و بدون نیاز به نمونه برداری تشخیص داده می شود. در این مطالعه داروی ضد قارچ به عنوان یک رویکرد تشخیصی-درمانی تجویز شد و بهبود ضایعه با تشخیص اولیه ما سازگار بود. هایپرپلازی پاپیلاری مرتبط با دنچر استوماتیت در ارتباط با تجمع کاندیدا، یافته های غیرمنتظره ای نیست، کاهش تعداد کاندیدا آلبیکنس موجود در بافت با استفاده از دارو یا تصحیح دندان مصنوعی منجر به برطرف شدن ضایعه خواهد شد [۴].

درمان انتخابی در ضایعات پیش رفته جراحی می باشد، درمان های غیر جراحی همچنین توصیه شده اند اما این موضوع هنوز هم مورد بحث است. اگر ضایعه در مراحل التهابی و ادماتوز باشد، رعایت بهداشت دهان و تجویز داروهای ضد قارچ می تواند سبب بازگشت ضایعه شود بنابراین روش های جراحی ممکن است ضروری نباشد [۲۲].

در بیمار با تنفس دهانی و کام عمیق، قدم اول درمانی، ارجاع آنها به متخصص گوش و حلق و بینی برای ارزیابی بیشتر و درمان انسدادهای ناحیه بینی و گلو است. خط دوم درمان، توسط دندان پزشک اجرا می شود که می تواند ابnorمالیتی های صورتی و دندانی را با کاربرد درمان های ضروری و قطعی شامل درمان های اکسپشن متحرک یا ثابت در سنین قبل و حوالی بلوغ و یا اکسپشن های جراحی در سنین پس از بلوغ و بزرگ سالی اصلاح کند. این بیماران به منظور باز شدن سینوس های بینی، نیاز به اکسپشن پالاتال دارند که اجازه تنفس کارتر از بینی را می دهد و در عین حال آناتومی کام را بهبود می بخشد به گونه ای که قابلیت تمیز شوندگی آن نیز افزایش می یابد [۲۳].

متاسفانه، به دلیل عدم همکاری بیمار و عدم داشتن درد و ناراحتی، بیمار در جلسات پیگیری شرکت نکرد. به هر حال چون اصل اتیولوژی ضایعه که نقص آناتومیکی در ناحیه کام می باشد پا بر جاست احتمال عود ضایعه وجود دارد.

IPH همیشه در ارتباط با دنچر نیست و کام عمیق و ابnorمالیتی های کام نیز می تواند از علل بروز این ضایعه باشد که نیازمند درمان های تیمی بین پزشکان و دندان پزشکان و به ویژه متخصصین بیماری های دهان جهت برطرف شدن کامل این مشکل می باشد.

می کند. اغلب بیماران از حضور آن بی اطلاع هستند [۱۶، ۱]. غالباً همراه با دنچر گزارش شده ولی فقط مختص به دنچر نیست. مواردی که در ادامه آورده می شود به عنوان محتمل ترین علل هایپرپلازی پاپیلاری پیشنهاد شده است: فشار بیش از حد در منطقه ریلیف کام، دنچرهای با مشکلات انطباق و کم انحنا که باعث لغزیدن و حرکات اصطکاکی بیس دنچر می شوند، اشکال در غدد بزاقی کامی، بهداشت دهانی ضعیف، مال اکلوزن دنچر که باعث حرکات اضافی می شود، استفاده بی وقفه و شبانه روزی از دنچر، کام عمیق و ابnorمالیتی های کام [۵، ۱، ۲، ۴] در مورد اخیر که در بیمار ما نیز مشاهده شد، به علت نقص آناتومیکی موجود شرایط خود-تمیز کنندگی (self-cleaning) کام توسط زبان از بین رفته است و گیر میکروفلور دهانی شامل کاندیدا آلبیکنس، باکتری ها و ویروس های مختلف در ناحیه سبب ایجاد گشادی عروق (vasodilation)، التهاب، قرمزی و تغییر شکل مخاط به ضایعات پاپولر مانند IPH شده است.

گروهی از محققان IPH را به عنوان نوعی از کاندیدایا زیس مزن آتروفیک در نظر گرفته اند اما نقش این قارچ در اتیولوژی IPH هنوز قطعی نیست [۱۷، ۱]. IPH به عنوان یک ضایعه در ارتباط با کاندیدا candida associated lesion (candida associated lesion) شناخته می شود و سایر میکرووارگانیسم های اضافه شده به کاندیدا آلبیکنس در اتیولوژی ذکر شده اند [۴]. Goullart و همکاران با استفاده از تکنیک ایمنوفلورسانس، حضور کاندیدا آلبیکنس را در تقریباً تمام نمونه های مبتلا به هایپرپلازی پاپیلاری نشان دادند و لذا چنین نتیجه گرفتند که این بیماری می تواند اتیولوژی میکروبی داشته باشد [۱۸].

Brown و همکاران، Merrill و همکاران و Lambson و همکاران ادعا کردند که بافت کامی دچار نقص پاتولوژیک یا آناتومیک، تعداد بیشتری از میکرووارگانیسم ها را نسبت به بافت پالاتال سالم با یا بدون پروتز در خود نگه می دارد و کاندیدا آلبیکنس اغلب با هایپرپلازی پاپیلاری در ارتباط می باشد [۲۰، ۲، ۴، ۱۹].

Gual-Vaques و همکاران در بررسی سیستماتیک IPH شیوع آن را بر اساس مطالعات مختلف $\frac{۴}{۴} \times ۴\%$ گزارش کرده اند که تنها در ۵ نفر از نمونه های مورد بررسی بروز آن بی ارتباط با استفاده از دنچر بوده است. در حالی که در ۱۰۱۶ بیمار بررسی شده دیگر، کاملاً مرتبط با استفاده از دنچر بوده است. آن ها چنین نتیجه گرفتند که حضور IPH در بین بیماران بدون استفاده از دنچر، بسیار غیر معمول بوده و احتمالاً در افراد با بهداشت دهانی ضعیف، سیگاری ها و یا افراد با تنفس دهانی یافت می شود [۳].

- [11] Orenstein NP, Taylor T. A non surgical approach to treating aggressive inflammatory papillary hyperplasia: clinical report. *J Prosthet Dent* 2014; 111:264.
- [12] Bresolin D, Shapiro PA, Shapiro GG, Chapko MK, Dassel S. Mouth breathing in allergic children: Its relationship to dentofacial development. *Am J Orthod* 1983; 83:334-340.
- [13] Jefferson Y. Mouth breathing: adverse effects on facial growth, health, academics, and behavior. *Gen Dent* 2010; 58: 18-25.
- [14] Orenstein NP, Taylor T. A nonsurgical approach to treating aggressive inflammatory papillary hyperplasia: Clinical report. *J Prosthet Dent* 2014;111: 264-268.
- [15] Noruzi R,Seyed S, Panahi F, Farnam S, KasbiF,Mokhlesin M,et al. Relationship between sucking behaviors and speech sound disorders in children 3 to 5 years old. *Koomesh* 2017; 19:766-773.
- [16] Naderi NJ,Eshghyar N,Esfahanian H. Reactive lesions of the oral cavity: A retrospective study on 2068 cases. *Dent Res J* 2012; 9: 251.
- [17] Guernsey LH. Reactive inflammatory papillary hyperplasia of the palate. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1965; 20: 814-827.
- [18] VazGoulart MC, Lara VS.Inflammatory papillary hyperplasia of the palate: quantitative analysis of candida albicans and its negative correlation with microscopic and demographic aspects.*Int J Prosthodont* 2011; 24:235-237.
- [19] Schmitz JF. A clinical study of inflammatory papillary hyperplasia. *J Prosthet Dent* 1964; 14: 1034-1039.
- [20] Poulopoulos A, Belazi M, Epivatianos A, Velegakis A, Antoniades D. The role of candida in inflammatory papillary hyperplasia of the palate. *J Oral Rehabil* 2007; 34: 685-692.
- [21] Gual-Vaqués P, Jané-Salas E, Marí-Roig A, López-LópezJ. Inflammatory papillary hyperplasia in a non-denture-wearing patient: A Case History Report. *Int J Prosthodont* 2017; 30:80-82.
- [22] Orenstein NP, Taylor T. A nonsurgical approach to treating aggressive inflammatory papillary hyperplasia: A clinical report. *J Prosthet Dent* 2014; 111: 264-268.
- [23] Carvalho FR, Lenti-Oliveira D, Machado MA, Prado GF, Prado LB, Saconato H. Oral appliances and functional orthopaedic appliances for obstructive sleep apnea in children. *Cochrane Database Syst Rev* 2007; 8:CD005520.

تشکر و قدردانی

از اساتید متخصص بیماری های دهان ، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی سمنان باست همکاری آنها تشکر و قدردانی می گردد.

منابع

- [1] Ettinger R. The etiology of inflammatory papillary hyperplasia. *J Prosthet Dent* 1975; 34: 254-261.
- [2] Neville BW. Oral and maxillofacial pathology. 4th ed. Brazil: Elsevier; 2016; P: 478.
- [3] Gual-Vaqués P, Jane-Salas E, Eqido-Moreno S, Ayuso-Montero R, Mari-Roig A, Lopez-Lopez J. Inflammatory papillary hyperplasia: a systematic review. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2017; 22: e36-e42.
- [4] Greenberg MS, Glick M. *Burket's oral medicine*.12th ed. MPH-USA: Shelton; 2015; P: 150.
- [5] Fisher AK, Rashid PJ. Inflammatory papillary hyperplasia of the palatal mucosa. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1952; 5: 191-198.
- [6] Canger EM,Celenk P,Kayipmaz S. Denture-related hyperplasia: a clinical study of a Turkish population group. *Braz Dent J* 2009; 20: 243-248.
- [7] Atashrazm P, Sadri D. Prevalence of oral mucosal lesions in a group of Iranian dependent elderly complete denture wearers. *J Contemp Dent Pract* 2013; 14: 174-178.
- [8] Tucker KM, Heget HS. The incidence of Inflammatory Papillary Hyperplasia. *J Am Dent Assoc* 1976; 93: 610-613.
- [9] Thomas C,Kotze T, Nash J.Papillarity of the palatal mucosa. *J Oral Rehabil* 1985; 12: 491-497.
- [10] Thwaites MS, Jeter TE, Ajagbe O. Inflammatory papillary hyperplasia: review of literature and case report involving a 10-year-old child. *Quintessence Int* 1990; 21:133-138.

Case report**Denture free inflammatory papillary hyperplasia: A rare case report**

Maryam Jalili Sadrabad (DDs, Msc)^{*1}, Nazila Ameli (DDs, Msc)², Mohammad Hossein Amirzade Iranaq (DDs)³

1- Assistant Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

2- Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

3- School of Dentistry, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran

* Corresponding author. +98 9122795257

Dr.njalili@gmail.com

Received: 4 Sep 2017; Accepted: 25 Aug 2017

Introduction: Inflammatory papillary hyperplasia (IPH) is a benign mucosal lesion that frequently affects palatal mucosa in denture wearers. Notably, most of the cases are asymptomatic but some of the patients feel the burning sensation and discomfort. In this way, IPH is associated with 24hours use of denture especially at night, so the main treatment modalities focused on denture modification and candidiasis infection inhibition. Current article reports a rare case of IPH in a denture free person.

Case report: A 29 years old healthy woman referred to department of oral medicine, School of Dentistry Shahid Sadoughi University of Medical Sciences (Yazd, Iran) with complaint of toothache. In our routine intraoral examination, a red pebbly plaque with irregular and poorly defined borders on palatal vault was inspected. Nystatin suspension was advised. Reexamination was done after one week that reduction in lesion size and erythema was observed and the lesion was improved generally. Unfortunately, she didn't represent on next follow-up session for no signs and discomfort.

Conclusion: IPH is not always associated with dentures, but also deep and abnormal palate could be the cause of this lesion, requiring multidisciplinary approaches between physicians and dentists' especially oral medicine to resolve this problem completely.

Keywords: Hyperplasia, Denture Stomatitis, Denture, Palate.