

تأثیر واژوپرسین بر فراموشی ایجاد شده به دنبال شوک الکتریکی در رت

موسى الرضا حاج زاده^۱ (M.D,Ph.D)، حسين ميلادي گرجي^{۲*} (M.Sc)، اسحاق جلالی^۱ (Ph.D)، حبيب ا... اسماعيلي^۱ (Ph.D)

۱- دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، بخش فيزيولوژي

۲- دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی، بخش فيزيولوژي

چکیده

سابقه و هدف: واژوپرسین به عنوان یک نروترانسمیتر، احتمالاً می‌تواند موجب بهبود اختلالات حافظه‌ای ناشی از الکتروشوک، ضربه‌های مغزی، دیابت بی‌مزه و بیماری آنرا بیم و نیز بهبود حافظه در افراد مسن گردد. در این پژوهش اثر دسموپرسین که یک آنالوگ واژوپرسین است در آمنزی ناشی از ECS بر روی رت مطالعه شد.

مواد و روش‌ها: ۴۰ سررت نراز نژاد Albino - Wistar با سن ۳-۴ ماه و با وزن ۲۶۰-۱۹۰ گرم انتخاب و در دو ماز T پیچیده چند واحدی (چوبی) و ماز آبی موریس مورد آزمایش قرار گرفتند. در ماز چوبی، ۲۰ سررت پس از آموزش اولیه به مدت ۴ روز، با ۱۶ ساعت تشنگی داخل ماز قرار داده شدند که باید به جستجوی یافتن بطری آب به منظور نوشیدن می‌پرداختند. ۲۰ سررت در ماز آبی به مدت ۱۰ روز تحت آزمون‌های آموزشی، جستجوی فضایی و حافظه عملی قرار گرفتند که باید با شناکردن به جستجوی سکوی مخفی به منظور استراحت می‌پرداختند؛ سپس به هر رت در گروه تجربی ۱۰ دقیقه قبل از شوک الکتریکی، 10 mg/kg دسموپرسین داخل صفاقی و در گروه کنترل به طور مشابه به همان مقدار (حجم) کلرور سدیم $9/6$ درصد تجویز شد و رت‌ها ۱۰ دقیقه پس از شوک الکتریکی، وارد ماز شدند.

یافته‌ها: دو گروه آزمایش و کنترل قبل از تجربه، در زمان رسیدن به پاداش و تعداد خطای در ماز چوبی و در میانگین زمان رسیدن به سکوی مخفی در ماز آبی تفاوت معنی‌داری نداشتند. در روز تجربه در ماز چوبی زمان رسیدن به پاداش به طور معنی‌داری تفاوت نشان داد ($P=0.023$). در ماز آبی نیز تفاصل میانگین زمان رسیدن به سکوی مخفی (تفاضل روز قبل از تجربه و روز تجربه) بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری نشان داد ($P=0.047$).

نتیجه گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دسموپرسین می‌تواند موجب تسهیل در یادآوری (ماز چوبی) و تثبیت حافظه فضایی کوتاه‌مدت (ماز آبی) و از بین بردن فراموشی قبلی و بعدی ناشی از شوک الکتریکی و نیز موجب حفظ یادگیری و حافظه در روزهای پس از تجربه گردد.

واژه‌های کلیدی: واژوپرسین، دسموپرسین، فراموشی (آمنزی)، یادگیری، حافظه، الکتروشوک، ماز T پیچیده چند واحدی، ماز آبی موریس

مقدمه

مطالعه دیگری نشان داده شد که آنالوگ‌های AVP موجب تسهیل در یادآوری پاسخ اجتنابی پاسیو در تمامی نمونه‌های فراموشی از جمله فراموشی متعاقب ECS، الكل و هیپوکسی گردید [۹، ۸، ۷]. در یک مطالعه، در مازآبی موریس با تزریق وازوپرسین به داخل سپتوم هیپوکامپ، به عدم تأثیر آن بر تقویت حافظه اشاره گردیده است [۱۱]. ولی در گزارش دیگری در مازآبی، وازوپرسین را در بجهود آلزایمر تجربی مفید دانستند [۲۴]، در مطالعات انسانی نیز افزایش حافظه کوتاه‌مدت در کودکان دچار شبادراری، متعاقب تجویز دسموپرسین [۱۹]، بجهود یادگیری و حافظه بهویژه برای جملات مفهومی [۶] و تسهیل در انواع حافظه کوتاه‌مدت و دراز‌مدت در جوانان و سالمندان [۱۹] و تسهیل فرآیندهای یادگیری از قبیل کامل‌سازی، سازماندهی و مداومت یادآوری در افراد سالم گزارش شده است [۲۵]. گزارش دیگری نشان داد که تجویز دسموپرسین، به صورت قطره بینی در افرادی که ۴۰-۱۶ ساعت از شروع آسیب داخل جمجمه‌ای آنان می‌گذشت، موجب بجهود قابل توجهی در فرآیند ذخیره‌سازی و حافظه منطقی کلامی کوتاه‌مدت گردید [۲۱].

درمان با الکتروشوک برای تعدادی از شرایط عصبی - روانی شامل دپرسیون، مانیا، کاتاتونیا، پارکینسون و سندروم نروپلیتیک بدخیم، یک روش درمانی مؤثر و مفید است ولی با وجود این اثر سودمند، اختلال حافظه که حدود ۷۵٪ بیماران تحت درمان با ECS آن را بدترین عارضه پس از الکتروشوک عنوان می‌کنند در حدی از مطلوبیت این روش درمانی کاسته و لذا یک معظل مهم و قابل تأمل برای بیماران نیز تیم پزشکی است [۱۵، ۲۲]. لذا ما در یک مدل حیوانی، متعاقب آمنزی ناشی از ECS دررت، تصمیم گرفتیم که تأثیر احتمالی وازوپرسین را بر به خاطرآوری اطلاعات در مازچوبی و حافظه فضایی کوتاه‌مدت را در مازآبی موریس به صورت تزریق داخل صفاقی بررسی کنیم.

امروزه پژوهش‌های گسترده‌ای اثر هورمون‌ها بر حافظه را مورد بررسی قرار داده‌اند و هورمون‌های CRH، ACTH، وازوپرسین، اوکسیتوسین، گلوکوکورتیکوئیدها و برخی دیگر از هورمون‌های استروئیدی شامل: تستوسترون، پرگننولون، DHEA، آندروستنديون و کورتيکوسترون و بالاخره کاتکولامین‌های سیستمیک و هورمون‌های تیروئیدی از جمله هورمون‌هایی هستند که اثرات آنها بر روی حافظه در مدل‌های مختلف تجارب حیوانی و بعضی در انسان مورد مطالعه قرار گرفته و اثرات مفید و ارزشمندی نیز برای آنها گزارش شده است [۱۶، ۱۰، ۹، ۵، ۴]. در بین هورمون‌ها وازوپرسین که نقش نروترانسمیتری نیز دارد از ترکیباتی است که مطالعات وسیعی در مورد اثرات آن بر حافظه و یادگیری و رفتار به صورت تزریق داخل مغزی و گاهی زیرجلدی و داخل صفاقی انجام شده است [۱۶، ۱۳، ۱۲، ۶]. وازوپرسین یا آرژینین وازوپرسین، پیتید کوچک ۹ اسید‌آمینه‌ای است که عمدتاً در سلول‌های بزرگ هسته‌های سوپرااوپتیک و پاراواتریکولر هیپوталاموس ساخته می‌شود. نرون‌های مذکور از مسیر هیپوталاموسی - هیپوفیزی توسط رشته‌هایی به هیپوفیز خلفی، برجستگی میانی [۲۲، ۱۴، ۹] و نیز به سایر نواحی مغز و نخاع شامل:

(الف) سیستم لیمبیک، سپتوم، هیپوکامپ، فیمبریا - فورنیکس و هسته‌های میانی آمیگدال. (ب) هسته‌های خودکار تن مغز (ج) شاخه خلفی طناب نخاعی شامل تیغه‌های II، III و IV و بخش میانی تیغه VII و VI می‌روند که این رشته‌ها ترشح وازوپرسین دارند [۲۴، ۱۱، ۳]. گزارشات متعددی در حیوانات و انسان نشان دهنده اثر وازوپرسین بر حافظه و یادگیری و رفتار است [۲۵، ۲۰، ۱۶، ۸، ۷]. تجویز داخل مغزی یک پیتید سنتتیک وازوپرسین موجب بجهود حافظه اجتماعی و هم پاسخ اجتنابی پاسیو در رت سالم گردید [۱۲]. در

مواد و روش‌ها

گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند و روز چهارم، آزمایش اصلی انجام شد.

در این روز کلیه رت‌ها به مدت ۱۶ ساعت تشنگی نگهداشته شدند و به هر یک از رت‌های گروه تجربی، مقدار $10 \text{ }\mu\text{g/kg}$ B.W در صورت داخل صفاقی دسموپرسین و به هر یک از رت‌های گروه کنترل به حجم مساوی کلوروسدیم $9/0$ درصد به طور مشابه تزریق شد و ده دقیقه پس از تزریق، هر رت تحت اثر شوک الکتریکی باشد ۵۰ ولت و زمان ۲ ثانیه قرار گرفت. ده دقیقه پس از ختم شوک، هر رت وارد ماز چوبی گردید و مدت زمان رسیدن به پاداش و تعداد خطاهای برای هر رت ثبت شد. میانگین مدت زمان و تعداد خطاهای برای رت‌های هر گروه در سه جلسه متوالی آموزشی به عنوان روز قبل از تجربه در نظر گرفته شد و با میانگین در روز تجربه مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در روزهای اول و سوم و دهم پس از روز تجربه نیز بدون دریافت شوک و با شرایط ۱۶ ساعت تشنگی، رت‌های هر گروه مورد مطالعه قرار گرفتند و میانگین هر یک از این روزها با روز قبل از تجربه مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (۲ رت از هر گروه به دلیل عدم تحمل شوک در روز تجربه از مطالعه حذف شدند).

مطالعه در مازآبی موریس. مازآبی شامل یک مخزن استوانه‌ای فلزی به قطر 140 و ارتفاع 45 سانتی‌متر و یک سکوی استوانه‌ای متحرک به قطر 10 و ارتفاع 25 سانتی‌متر می‌باشد. داخل مخزن، تا ارتفاع 27 سانتی‌متر با آب تقریباً 23 درجه سانتی‌گراد پر می‌شود تا سکو، 2 سانتی‌متر زیر سطح آب قرار گیرد. مخزن را در یک اتاق مناسب قرار داده و راهنمایی خارجی متعدد شامل تصاویر، چراغ روشنایی،... به طور ثابت در اطراف مخزن قرار دادیم تا برای جهت‌یابی فضایی حیوان، مورد استفاده قرار گیرد. ماز با علامت گذاشتن روی دیواره خارجی مخزن به 4 ربع مساوی تقسیم شد. برای مطالعه، در این ماز نیز 20 سرعت انتخاب شدند و

مطالعه Pilot. ابتدا یک بررسی Pilot روی 5 سرعت نر، مشابه تجربه اصلی به عمل آمد و طی چهار جلسه آموزش با ماز چوبی و تشنگی 14 تا 18 ساعته و سپس با وارد کردن شوک الکتریکی با ولتاژ و مدت زمان‌های مختلف [۷، ۱۶] از آن، درنهایت، زمان تشنگی 16 ساعته و شدت شوک 50 ولت با مدت زمان 2 ثانیه برای ایجاد تشنج تونیک-کلونیک و ایجاد فراموشی محاسبه گردید.

حیوانات. در این پژوهش، تعداد 40 سرعت نر از نژاد Wistar آلبینو با سن $3-4$ ماه و وزن $260-290$ گرم انتخاب شده و به طور تصادفی به دو دسته 20 تایی برای مطالعه در هر یک از مازهای چوبی و آبی تقسیم شدند. در سراسر دوره آزمایش، رت‌ها تحت شرایط استاندارد و سیکل روشنایی/تاریکی 12 ساعته و غذای فشرده تهیه شده توسط شرکت جوانه خراسان و آب شهر، در خانه حیوانات دانشکده پزشکی نگهداری شدند. در این پژوهش از داروی دسموپرسین به مقدار $10 \text{ }\mu\text{g/kg}$ B.W 10 ، بیست دقیقه قبل از ارزیابی حافظه به صورت تزریق داخل صفاقی استفاده گردید [۱۳، ۱۶].

مطالعه با ماز چوبی. ماز چوبی مورد استفاده، یک ماز T شکل پیچیده و چند واحدی بود. جلسه اول، تمامی 20 سرعت بدون تشنگی و برای آشنازی، هر یک به مدت $2-3$ دقیقه در ماز قرار داده شدند. سپس 3 روز متوالی و هر روز یک جلسه پس از 16 ساعت تشنگی، هر یک از رت‌ها در ماز قرار داده شدند و زمان رسیدن به پاداش (آب) توسط کرونومتر و تعداد خطاهای با شمارش توسط پژوهشگر برای هر حیوان ثبت گردید. پس از رسیدن به پاداش، به حیوان اجازه داده شد به مدت 3 دقیقه آب بتوشد و سپس به قفس برگردانده شد [۲۱]. در پایان سه جلسه بیش از نیمی از رت‌ها توانستند مسیر ماز را بدون خطای طی نمایند. در پایان جلسه سوم، رت‌ها به طور تصادفی به دو دسته مساری 10 تایی به عنوان

موقعیت رت برای شناکردن در فضای داخل ماز، روزانه تغییر می کرد و لذا با این عمل می توان اجزاء حافظه عملی را مورد مطالعه قرار داد. در هر روز، ۴ آزمایش انجام شد و حافظه عملی در متوسط زمانی ۱۲ آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین زمان $4 \times 3 / 12$ به عنوان ملاک حافظه فضایی در روز قبل از تجربه منظور گردید. بعد از ظهر روز دهم، رت ها به طور تصادفی به دو گروه مساوی ۱۰ تایی (تجربی و کنترل) تقسیم شدند. رت ها مجدداً وزن گردیدند و از هر گروه، ۲ رت که افزایش وزن شدید پیدا کرده و با سایر رت ها همگون نبودند حذف شدند.

(d) آزمایش اصلی (روز تجربه). این آزمایش، روز یازدهم در یک جلسه در صبح و با شرایط یکسان و مشابه انجام شد. ابتدا یک رت از گروه تجربی و یک رت از گروه کنترل انتخاب و به ترتیب به آنها دسموپرسین، 0.5 mg/kg به صورت داخل صفاتی و مقدار مشابه، نرمال سالین تزریق و پس از ۱۰ دقیقه تحت تأثیر شوک الکتریکی (با شدت ۵۰ ولت و زمان ۱ ثانیه) قرار گرفتند و ۱۰ دقیقه پس از شوک، هر رت به مدت ۱۵ ثانیه روی سکوی مخفی که در موقعیت جدیدی گذاشته شده بود قرار گرفت و سپس به طور تصادفی از یکی از ربع ها، داخل آب مخزن انداخته شد و زمان رسیدن به سکوی مخفی اندازه گیری شد. سکو مثل آزمایش حافظه عملی، در وسط یک ربع مخزن قرار داشت و رت ها در هر چهار موقعیت، تحت آزمون قرار گرفتند. مراحل مذکور برای تمام رت های دو گروه انجام شد. میانگین زمان رسیدن به سکوی مخفی در این روز (روز تجربه) بد عنوان میانگین حافظه فضایی روز تجربه در نظر گرفته شد و با میانگین قبل از تجربه (آزمون حافظه عملی در سه روز متولی) مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در روزهای اول، سوم و دهم پس از تجربه نیز - بدون ذریافت شوک - آزمون انجام و میانگین حاصل با میانگین قبل از تجربه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها


به شرح زیر تحت آزمون قرار گرفتند [۲۴]:

(a) آموزش (Training). کلیه رت ها، در این آزمون به مدت ۶ روز و هر روز ۲ جلسه (صبح و عصر) و هر جلسه در دو موقعیت، تحت آموزش قرار گرفتند. سکوی مخفی در تمام دوره آموزش (دو آزمون) به صورت تصادفی و در وضعیت ثابت در وسط یک ربع مخزن با فاصله مساوی از مرکز و کناره مخزن قرار داشت. در هر جلسه، رت را از یکی از موقعیت ها به صورت رو به دیواره مخزن، داخل آب انداختیم و مدت زمان رسیدن به سکوی مخفی را با کرونومتر اندازه گرفتیم. رت پس از یافتن سکو اجازه می یافت به مدت ۱۵ ثانیه روی سکو بماند و سپس به قفس برگردانده می شد. چنانچه رت در مدت ۹۰ ثانیه، سکو را پیدا نمی کرد آزمون خاتمه می یافت و حداکثر نمره ۹۰ ثانیه برای حیوان منظور می شد. در این آزمون در روز ششم، تمام رت ها توانستند با شناکردن، سکو را پیدا کنند.

(b) آزمون جستجوی فضایی (Spatial probe-trial). این آزمون، روز هفتم انجام شد. سکوی مخفی از داخل مخزن خارج گردید و رت ها در یک آزمون جستجوی فضایی ۳۰ ثانیه ای در یکی از موقعیت ها رها شده و زمان رسیدن به محل سکوی قبلی اندازه گیری و ثبت شد. در این آزمون نیز تمام رت ها توانستند محل قبلی سکو را پیدا نمایند.

(c) آزمون حافظه عملی (Working memory test). این آزمون، در روزهای هشتم و نهم و دهم انجام گرفت. در هر روز سکوی مخفی، در وسط یک ربع مخزن بود ولی روزانه تغییر می کرد. هر رت در هر یک از روزهای مذکور یک بار (صبح) و در هر چهار موقعیت تحت آزمون قرار گرفت. ابتدا رت را برابر روی سکو در وضعیت جدید همان روز به مدت ۱۵ ثانیه برای جهت یابی فضایی قرار داده سپس او را به طور تصادفی در یک موقعیت از ربع ها داخل آب گذاشته و زمان رسیدن به سکوی مخفی را اندازه گیری و ثبت تmodیم.

در شکل شماره ۲ در روز تجربه، بین میانگین تعداد خطاهای در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد ولی یک روز پس از تجربه، در حالی که تعداد خطاهای در گروه تجربی تغییری نشان نمی‌دهد، خطاهای گروه کنترل افزایش یافته و تفاوت معنی‌داری را بین دو گروه به وجود می‌آورد ($P=0.03$). در روز سوم بعد از تجربه، در گروه تجربی میانگین تعداد خطاهای در مقایسه با قبل از تجربه به طور معنی‌داری کاهش یافته است ($P=0.02$).



شکل ۲. مقایسه میانگین تعداد خطاهای در دو گروه تجربی و کنترل در روزهای مختلف در مازچوبی. نتایج به صورت $Mean \pm sem$ برای ۸ رت در هر گروه می‌باشد.


همان‌طوری که در شکل شماره ۳ دیده می‌شود میانگین مدت زمان رسیدن به سکوی مخفی در گروه تجربی در مقایسه با قبل از تجربه تفاوت معنی‌داری ندارد ولی یک روز بعد از تجربه در حیوانات این گروه، زمان رسیدن به سکو به‌طور معنی‌داری کاهش یافته است ($P=0.014$). در گروه کنترل، زمان یافتن سکوی مخفی در روز تجربه افزایش معنی‌داری یافته است ($P=0.04$). در این گروه، نتایج یک روز بعد از تجربه در مقایسه با قبل از تجربه تفاوت معنی‌دار ندارد. بین دو گروه تجربی و کنترل در روزهای تجربه و یک روز پس از تجربه تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. در مازآبی، نتایج روزهای سوم و دهم بسیار مشابه روز اول پس از تجربه بود و لذا حذف گردید.

پس از کدگذاری لازم با نرم‌افزار آماری SPSS انجام شد. در توصیف داده‌ها از شاخص میانگین و انحراف معیار و در تحلیل داده‌ها از آزمون‌های T زوجی و T مستقل و هر جا که $P < 0.05$ بود، تفاوت‌ها معنی‌دار تلقی گردید.

نتایج

در این پژوهش، میانگین مدت زمان رسیدن به پاداش و تعداد خطاهای در مازچوبی به عنوان معیار یادگیری و حافظه و مدت زمان رسیدن به سکوی مخفی در مازآبی نیز به عنوان معیار یادگیری و حافظه فضایی در نظر گرفته شد.

همان‌طور که در شکل شماره ۱ دیده می‌شود میانگین مدت زمان رسیدن به پاداش، قبل از تجربه در دو گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی‌داری ندارد، اما این میانگین در روز تجربه در دو گروه، تفاوت معنی‌داری دارد ($P=0.032$). زمان رسیدن به هدف در دو گروه تجربی و کنترل در روزهای اول، سوم و دهم پس از تجربه تفاوت معنی‌داری ندارد، اگرچه این زمان در گروه تجربی در روز یکم و سوم افزایش جزئی یافته و سپس در روز دهم به سطح قبل از تجربه برگشته است. در گروه کنترل نیز در روز اول پس از تجربه، میانگین مدت زمان رسیدن به هدف افزایش یافته که در مقایسه با قبل از تجربه، تفاوت معنی‌داری دارد ($P=0.02$).




شکل ۱. مقایسه مدت زمان رسیدن به پاداش در دو گروه تجربی و کنترل در روزهای مختلف در مازچوبی. نتایج به صورت $mean \pm sem$ برای ۸ رت در هر گروه می‌باشد.


به آنها نرمال‌سالین تزریق شده بود نشان دهنده تأثیر شوک بر این رت‌هاست، اگرچه تفاوت زمانی در روز تجربه با روز قبل از تجربه معنی‌دار نیست؛ که ممکن است بخشی به علت آزاد شدن هورمون‌های استرسی آندوژن و مؤثر بر حافظه، مثل ACTH، وازوپرسين و نوراپی‌نفرين باشد [۱۵، ۲۳]. تغییراتی که در روزهای اول، سوم و دهم پس از تجربه در گروه کنترل در زمان رسیدن به پاداش دیده می‌شود می‌تواند نشان دهنده فراموشی ناشی از ECS و عدم تأثیر نرمال‌سالین در جلوگیری از این فراموشی باشد. همان‌طوری که در نمودار شماره ۱ دیده می‌شود در روز تجربه، تفاوت معنی‌داری در زمان رسیدن به پاداش در گروه تجربی در مدت زمان کمتری به پاداش رسیده‌اند که می‌تواند نشان دهنده تأثیر دسموپرسين بر جلوگیری از فراموشی بر اثر ECS و به خاطرآوری اطلاعات در این گروه باشد.

میانگین تعداد خطاهای در مازچوبی نیز یک روز پس از تجربه در حیوانات گروه تجربی به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل است که نشان دهنده اثر دسموپرسين بر حافظه در این گروه و جلوگیری از فراموشی می‌باشد؛ اما رت‌های گروه کنترل مسیر مازرا فراموش کرده و پیشرفتی در یادگیری و حافظه نشان نمی‌دهند (در روزهای پس از تجربه، نمودار ۲). همان‌طور که نمودار شماره ۳ نشان می‌دهد در گروه تجربی که قبیل از شوک به آنها دسموپرسين تجویز شده بود، در روز تجربه کاهش جزئی و یک روز پس از تجربه، کاهش معنی‌داری در زمان یافتن سکو به وجود آمده است که نشان دهنده تأثیر دسموپرسين بر حافظه فضایی و جلوگیری از فراموشی در این حیوانات است. در گروه کنترل، متعاقب ECS، حافظه فضایی دچار اختلال شده و مدت زمان رسیدن به سکو در روز تجربه به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد و به عبارت دیگر رت‌های این گروه دچار فراموشی شده‌اند. اگرچه در روز تجربه، تفاوت بین دو

در شکل شماره ۴، تفاصل میانگین مدت زمان رسیدن به سکوی مخفی در مازآبی در قبیل از تجربه و روز تجربه برای دو گروه تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهد ($P=0.047$). این تفاصل برای گروه تجربی، منفی است یعنی در روز تجربه مدت زمان رسیدن به سکو کاهش یافته ولی در گروه کنترل، مثبت است یعنی زمان رسیدن به سکوی مخفی در مقایسه با قبل از تجربه افزایش یافته است.



شکل ۳. مقایسه میانگین مدت زمان رسیدن به سکو در دو گروه تجربی و کنترل در روزهای مختلف در ماز چوبی. نتایج به صورت $mean \pm sem$ برای ۸ رت در هر گروه می‌باشد.



شکل ۴. مقایسه میانگین تفاصل مدت زمان رسیدن به سکو در قبیل از تجربه و روز تجربه در ماز آبی. نتایج به صورت $Mean \pm sem$ برای ۸ رت در هر گروه می‌باشد.

بحث

در پژوهش حاضر (در مازچوبی) افزایش مدت زمان رسیدن به پاداش در گروه کنترل که قبیل از دریافت شوک

ممکن است از مسیرهای گوناگونی باشد که برخی از آنها عبارتند از:

۱- فعال کردن مکانیسم‌های کولینریک که در حافظه نقش دارند [۹]. ۲- عمل به عنوان یک نروترانسミتر و تحریک تولید مواد شیمیایی و نروترانسミترها و ایجاد اثرات نرومدیاتوری [۱۰]. ۳- اثر بر سیستم‌های پیام‌رسان ثانویه دخیل در حافظه از جمله مسیر کلسیم کالmodولین-پروتئین‌کیناز II و پروتئین‌کیناز A و تأثیر بر گیرندهای NMDA در ناحیه CA1 هیپوکامپ که در حافظه، نقش دارند (ایجاد LTP) [۱۱، ۱۲]. ۴- افزایش فعالیت آنزیم کولین‌استیل‌ترانسفراز در قشر پیشانی، تحریک آزادسازی استیل‌کولین و تحریک متابولیسم اینوزیتول فسفولیپید در هیپوکامپ [۱۳، ۱۴] و افزایش بیان ژن NGF (فاکتور رشد عصبی) در هیپوکامپ و قشر مغز [۱۵].

به طور خلاصه واژوپرسین و آنالوگ‌های آن از جمله دسموپرسین همان‌طور که در پژوهش حاضر دیده می‌شود و نیز گزارشات متعدد دیگر نشان می‌دهند، می‌تواند موجب تسهیل در یادآوری (مازچوبی) و تثبیت حافظه فضایی کوتاه‌مدت در مازآبی گردد و احیاناً در مواردی مثل فراموشی بر اثر الکتروشوک درمانی، پیشگیری از زوال عقلی در سالمندان و بیماران آزاریم و بهبود عملکرد حافظه بزرگسالان و شاید برای رفع فراموشی در بیمارانی که به علت آسیب‌های مغزی دچار فراموشی شده‌اند مؤثر باشند و با توجه به نداشتن عوارض چندان و سهولت جذب از راه بینی تجویز آن را می‌توان در بیماران مذکور توصیه نمود.

منابع

- [۱] رضائزاد‌جولاوی، ج.، بررسی اثرات هیپوکامپ مادری و تیروکسین درمانی در دوران قبل و بعد از تولد بر میزان یادگیری نوزادان در رت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زیست‌شناسی

گروه معنی‌دار نیست ($P=0.6$)؛ که احتمالاً کم بودن تعداد نمونه می‌تواند علت آن باشد ولی اختلاف میانگین بین روز قبل و روز تجربه در دو گروه معنی‌دار است (نمودار ۴). این یافته‌ها نیز تأثیر مثبت دسموپرسین بر جلوگیری از فراموشی در گروه تجربی را نشان می‌دهد. محققان دیگر با استفاده از پاسخ اجتنابی پاسیو دریافتند که واژوپرسین موجب کاهش و یا بهبود ECS فراموشی قبلی (Retrograde Amnesia) ناشی از الکل و هیپوکسی در رت می‌شود [۱۶، ۱۷]. این گزارشات یافته‌های ما در پژوهش حاضر را تأیید می‌کنند و با آن هماهنگی دارند. Tanaka و همکارانش (۱۹۹۸) نشان دادند که پروتئین NC-۱۹۰۰ (یکی از آنالوگ‌های واژوپرسین) موجب تسهیل حافظه رجوعی فضایی رت‌ها در مازآبی می‌شود و از زوال عقلی ایجاد شده به دنبال تزریق داخل‌بطنی پروتئین β -آمیلوئید جلوگیری می‌نماید [۱۸]، بهبود حافظه اجتماعی در رت‌ها که یک نوع حافظه کوتاه‌مدت محسوب می‌شود توسط واژوپرسین تعدیل می‌گردد [۱۹]. Faiman و همکارانش (۱۹۹۸) نشان دادند که لیزین - واژوپرسین موجب افزایش اثر مهاری در پاسخ اجتنابی در موس سوری گردیده و بر فرایند تحکیم حافظه و یادآوری اثر مثبت دارد [۲۰]؛ این یافته‌ها نیز نتایج پژوهش حاضر با دسموپرسین را تأیید می‌نماید.

در مطالعات انسانی نیز بر طرف کردن اختلال حافظه رتروگراد متعاقب ECS با تجویز دسموپرسین گزارش شده است [۲۱]. لذا هم تجارت حیوانی - از جمله پژوهش حاضر - و هم مطالعات انسانی، اثر مثبت واژوپرسین و آنالوگ‌های آن را بر حافظه و یادگیری و جلوگیری از اختلالات حافظه نشان می‌دهند.

به نظر می‌رسد که اثر واژوپرسین بر حافظه، مربوط به اثر هورمونی آن نباشد [۲۲] و نیز در عین اینکه مکانیسم‌های دقیق اثرات واژوپرسین بر یادگیری و حافظه به طور کامل شناخته شده نیست، اما این اثرات

- on learning and memory processes in rats with experimental amnesia. *Pol. J. Pharmacol.* 45 (1993) 11-22.
- [9] Claudia, P.F., Gabriel, A.E. and Carlos, M.B., Vasopressin modulates the activity of nicotinic cholinergic mechanisms during memory retrieval in mice, *Behavioral and Neural Biology*, 50 (1988) 121-119.
- [10] Croiset, G., Nijesn, M.J. and Kamphuis, P.J., Role of Corticotropin - releasing factor, Vasopressin and the autonomic nervous system in learning and memory, *Eur. J. Pharmacol.*, 405 (2000) 225-34.
- [11] Engelman, M., Bures, J. and Landgraf, R., Vasopressin administration via microdialysis into the septum interferes with the acquisition of spatial memory in rats, *Neuroscience letters*, 142 (1992) 69-72.
- [12] Everts, H.G. and Koolhaas, J.M., Lateral septal vasopressin in rats: role in social and objects recognitions, *Brain Res.*, 760 (1997) 1-7.
- [13] Faiman, C.P., Erausquin, G.A.D. and Baratti, C.M., Vasopressin modulates the activity of nicotinic cholinergic mechanisms during memory retrieval in mice. *Behavioral and Neural Biology*, 50 (1998) 112-119.
- [14] Ganong, W.F., Review of medical physiology, 19th ed., Appleton & Lange Inc., Stanford, 1999, Pp:230-260.
- [15] Isenberg, K.E. and Zorumski, C.F. Electroconvulsive therapy, In: Comprehensive Textbook of Psychiatry.
- جانوری، دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، ۴۵-۷۵، ص ۱۳۷۶
- [۲] غفاری مقدم، غ.، بررسی اثرات مصرف عصاره آبی کندر در طی دوران حاملگی و شیردادن به نوزادان بر روند یادگیری و تقویت حافظه زاده ها در رت. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم جانوری. دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۷، ص ۵۴-۱۰.
- [۳] افیتز جرالد، ام. جی. تی. (نویسنده)، میناگر، ع. ر. و وثوق آزاد، ز.، (مترجمین)، نروآناatomsی پایه و کاربردی، چاپ اول، انتشارات دانش، تهران، سال ۱۳۷۰، ص ۲۷۱-۳۵۱ و ۳۸۰-۲۵۵.
- [۴] نقدی، ن.، نفیسی، ن. و مجلسی، ن.، بررسی تأثیر تزریق داخل هیپوکامپی تستوسترون بر یادگیری فضایی موش های صحرایی. *فیزیولوژی و فارماکولوژی*، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، ص ۱۷۳-۱۸۰.
- [۵] اوفایی، ع. و رشیدی پور، ع.، نقش گیرنده های گلوكوكورتيكونيد آمیگدال و هیپوکمپ در فرایند ذخیره حافظه در موش بزرگ آزمایشگاهی. کوشش، جلد ۲، شماره ۳ و ۴، تابستان ۱۳۸۰، ص ۱۲۳-۱۳۵.
- [6] Beckwith, B.E. and Till, R.E., Sentence memory affected by AVP analog (DDAVP) in cross - over experiment, *Peptides*, 6 (1985) 397-402.
- [7] Car, H., Borawska, M. and Wisniewski, K., The effect of vasopressin analogue [d(CH₂)₁(5), Tyr(Me)₂] AVP on memory process in rats with experimental amnesia, *Acta Neurobiol. Exp.*, 55 (1995) 207-221.
- [8] Car, H., Borawska, M. and Wisniewski, K., The effect of vasopressin analogue [d(CH₂)₁(5), Tyr(Me)₂-delta(3)Pro(7)] AVP

- C.F., Vasopressin peptide (DDAVP) may narrow the focus of attention in normal elderly, *Psychiatry Res.*, 17 (1989) 31-9.
- [21] Parfitt, K., Martindale: the Complete Drug Reference, 32th ed., Pharmacoutical press, London, 1999, Pp:1245-1246.
- [22] Reghunandanan, V., Reghunandanan, R. and Mahajan, K.K., Arginine vasopressin as a neurotransmitter in brain, *Indian J. Exp. Biol.*, 36 (1998) 635-643.
- [23] Swarts, C.M., Neuroendocrine effects of electroconvulsive therapy (ect)., *Psychopharmacol. Bull.*, 33 (1997) 265-71.
- [24] Tanaka, T., Yamada, K., Senzaki, K., Narimatsu, H., Nishimura, K., Kameyama, T. and Nabeshima, T., NC-1900, an active fragment analog of arginine vasopressin, improves learning and memory deficits induced by β -amyloid protein in rats, *European Journal of Pharmacology*, 352 (1998) 132-142.
- [25] Weingartner, H., Gold, P., Ballenger, J.C., Smallberg, S.A., Summers, R., Rubinow, D.R., Post, P.M. and Goodwin, F.K., Effect of vasopressin on human memory functions, *Science*, 6 (1981) 601-3.
- Kaplan and Sadock (eds), Vol 2, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000, Pp:2503-2515.
- [16] Izquierdo, I.A., Schroder, N., Ardenghi, P., Quevedo, J., Netto, C.A., Medina, J.H. and Izquierdo, I., Systemic administration of ACTH or vasopressin reverses the amnestic effect of posttraining - endorphin or electroconvulsive shock but not that of intrahippocampal infusion of protein kinase inhibitors, *Neurobiology of Learning and Memory*, 68 (1997) 197-202.
- [17] Jachimowicz, A., Holy, Z. and Wisniewski, The participation of nitric oxide in the facilitator effect of arginine vasopressin on memory, *Acta Neurobiol. Exp. Warsz.*, 58 (1998) 37-45.
- [18] Mark, D.E. and Michael, P.A., The clinical profiles, recovery and rehabilitation of memory disorders, *Neuro-Rehabilitation*, 5 (1995) 141-159.
- [19] Muller, D., Florkowski, H., Chavez-Kattau, K., Carlsson, G. and Eggert, P., The effect of desmopressin on short-term memory in children with primary nocturnal enuresis, *J. Uro.*, Dec., 166 (2001) 2432-4.
- [20] Nebes, R.D., Jennings, J.R. and Reynolds,

The effects of vasopressin on amnesia-induced by electroconvulsive shock in rats

M. Hadjzadeh¹(MD,Ph.D), H.Miladi Gorgi^{*2}(M.Sc), E. Jalali¹(Ph.D), H. Esmaili¹(Ph.D)

1 - Dept. Of Physiology , School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences

2 - Dept. Of Physiology , School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences

Introduction: Vasopressin as a neurotransmitter can improve the memory disorders due to ECS, brain trauma, diabetes insipidus, Alzheimer's disease and senile dementia. In the present experiment the effects of desmopressin were studied on amnesia due To electroconvulsive shock (ECS) in rats.

Materials and Methods: Forty male Wistar albino rats, aged 3-4 months with 190-260 gr body weight were studied in complex T maze or Morris water maze (MWM). After a primary introduction to T maze (four day), Twenty rats with a 16 hr period of thirsty introduced to the maze, which they have to find a bottel of water to drink. In MWM twenty rats were treated for ten days in training trials, spatial exploration and working memory trials, they have to swim in water to find the hidden platform where can rest. Then each rat in test group recived 10 μ g/kg B.W of desmopressin and each rat in control group recived the same volume of 0.9% salin by ip injection Ten min perior to ECS. Ten min after injection each rat was treated with ECS and 10 min after that rat was put in T-maze and / or water maze.

Results: For both test and control groups the average time to reach the goal in T and water maze and the unmrber of errors in T maze was not statistically different on the day before experiment. On the other hand, on the day of experiment by T maze the average of the time to find the goal for test group was 9 ± 4.78 sec and for control group was 15.25 ± 5.67 sec and the difference are statistically significant ($P=0.032$). With water maze the difference between the time to find the platform in the day befor and on the day of experiment in test group was -0.489 sec and in control was + 5.07 sec which is statistically significant ($p=0.047$).

Conclusion: It may be concluded that desmopressin can facilitate retrieval and consolidation of spatial memory and improve the retrograde and anterograde amnesia due to ECS.

Keywords: Vasopressin; Desmopressin; Amnesia; Learning; Memory; ECS; T maze; MWM

* Corresponding author. Fax:0231-3331551; Tel: 0231-3332080