



فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی

ISSN : 2322-178X

دوره: ۲ شماره: ۲، ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۲

Downloaded from ijmsn.ir at 12:59 +0330 on Saturday December 15th 2018



مقالات پژوهشی

- فرایند تطابق در دریافت کنندگان پیوند کلیه: یک مطالعه گراند تئوری..... ۱
مسعود ریانی، مهوش صلصالی، عباس عباسزاده
- تأثیر بازتاب درمانی بر کیفیت خواب سالمندان: کارآزمایی بالینی..... ۱۱
آلهه سید رسولی، لیلا ولیزاده، خدیجه نصیری، وحید زمانزاده، سکینه گلجاریان، امید قاسمی
- خودارزیابی پرستاران در زمینه مهارت بررسی وضعیت سلامت سیستم قلب و عروق..... ۱۹
محسن ادیب حاجباقری، آزاده صفا، علیرضا فاضل دربندی
- تأثیر رایجه درمانی بر تغییرات همودینامیک بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر..... ۲۶
حمیرا طهماسبی، علیه عباسی، ماندانا زعفری، هادی درویشی خضری
- تأثیر آموزش کیفیت زندگی بر خودکارآمدی بیماران تحت درمان با همودیالیز..... ۳۳
سمیه سلطانی نژاد، زهرا عباسی دولت آبادی، محمود محمودی
- مقایسه دو روش شیردهی کرال و معمول بر رفتار شیردهی موفق در دو ساعت اول بعد از زایمان..... ۳۹
شهین دخت نوابی ریگی، ابراهیم ابراهیمی طبس، سمیه خزانیان
- تغییرات کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بیمارستان امام خمینی^(۵) ارومیه..... ۴۵
مدینه جاسمی، وحید زمانزاده، حمداله علی نژاد
- مقایسه تأثیر پماد سولفادیاژین نقره ۱ درصد و پماد گیاهی فاندرومول بر کاهش درد بیماران با سوختگی درجه دو..... ۵۱
محمد حیدری، سارا شهبازی
- ارتباط بین نشانگان پای بیقرار با اختلال کیفیت خواب در بیماران تحت همودیالیز..... ۵۷
حسین حبیب زاده، نصیبه لازاری، رضا قانعی قشلاق
- ارتباط استاد و دانشجو در آموزش بالینی پرستاری: تحلیل محتوای کیفی..... ۶۳
فریبا یعقوبی نیا، عباس حیدری، رباب لطیف نژاد رودسری



انجمن علمی پرستاری ایران

فصلنامه پرستاری داخلی و جراحی



دوره ۲، شماره ۱ و ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۲

آدرس سایت مجله: <http://www.ijmsn.ir>

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده پرستاری و مامایی

دارای رتبه علمی پژوهشی از یکصد و دهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره ۱۰۰/۵۰۷ مورخ ۹۲/۳/۲۷

امور نشر (ویراستاری، صفحه آرایی و طراحی):

شرکت فرزنانگان راندیش

کارشناسان اجرایی: مهدیه رضایی، نازی مبین فر

مدیر پایگاه: مهدیه رضایی

شماره استاندارد بین المللی نشریه: ۲۳۲۲-۱۷۸۸

شماره مجوز ارشاد اسلامی: ۹۰/۷/۲۴، ۱۹۱۹۱/۹۰

مدیر مسئول: دکتر علی نویدیان (استادیار راهنمایی و مشاوره)

سر دبیر: دکتر هوشنگ سندگل (دانشیار بیماریهای داخلی)

مدیر اجرایی: فتیحه کرمان ساروی (استادیار پرستاری)

اسامی هیئت تحریریه

دکتر ملیحه متانت: دانشیار بیماریهای عفونی و طب گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر عیسی محمدی: دانشیار پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر زهرا مودی: استادیار مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر ندا مهرداد: استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرشته نجفی: مربی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر علی نویدیان: استادیار راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

علیرضا نیکبخت نصرآبادی: استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر فریبا یعقوبی نیا: استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر فریده یغمایی: دانشیار پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دکتر عزیزاله اربابی سرجو: استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر فاطمه الحانی: دانشیار پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر محمود ایمانی: دانشیار بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر فاطمه رخشانی: استاد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مسعود رودباری: دانشیار آماردانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر هوشنگ سندگل: دانشیار بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر محسن طاهری: استادیار ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دکتر عباس عبادی: استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهر تهران

دکتر مسعود فلاحي خشکناپ: دانشیار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

فتیحه کرمان ساروی: استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

اسامی داوران این شماره:

دکتر فضل اله احمدی، دکتر اکرم ثناگو، دکتر ناهید رژه، دکتر مسعود رودباری، دکتر سکینه سبزواری، دکتر رضا ضیغمی، دکتر عباس

عباس زاده، دکتر مسعود فلاحي خشکناپ، دکتر رضا مسعودی، فرشته نجفی، دکتر علی نویدیان، دکتر فریبا یعقوبی نیا.

زمینه موضوعی: تخصصی پرستاری

حمایت علمی و تامین اعتبارات مالی مجله: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، با

همکاری انجمن علمی پرستاری ایران

لیتوگرافی و چاپ و صحافی: چاپخانه کارینو، زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه ۲۹

شمارگان: ۵۰۰ جلد

استفاده از مطالب نشریه با ذکر منابع بلامانع می باشد.

آدرس: زاهدان، میدان مشاهیر، دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، کدپستی: ۹۸۱۶۹۱۳۳۹۶

تلفن: ۲۴۳۸۴۷۳ - ۰۵۴۱ - ۲۴۴۲۴۸۱ - ۰۵۴۱ - ۲۴۴۲۴۸۱ Email: ijmsn@zaums.ac.ir

ارتباط بین نشانگان پای بی‌قرار با اختلال کیفیت خواب در بیماران تحت همودیالیز

حسین حبیب زاده^۱، نصیبه لازاری^۲، رضا قانعی قشلاق^۳

مقاله پژوهشی

۱. استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
۲. کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
۳. دانشجوی دکتری پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، سال دوم، شماره ۲ و ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صفحات ۶۲-۵۷

چکیده

زمینه و هدف: همودیالیز، شایع‌ترین درمان جایگزین در بیماران کلیوی در مراحل انتهایی است. هر چند این روش میزان بقا و امید به زندگی را بالا می‌برد، اما بیماران را با مشکلات زیادی از قبیل اختلال خواب و نشانگان پای بی‌قرار روبه‌رو می‌سازد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین نشانگان پای بی‌قرار با اختلال خواب بیماران تحت همودیالیز انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد-شاهدی، تعداد ۷۴ بیمار تحت همودیالیز دارای اختلال خواب (مورد) به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و با ۷۴ بیمار تحت همودیالیز بدون اختلال خواب (شاهد) از نظر جنس و سن همسان‌سازی شدند. سپس هر دو گروه از نظر مشکل نشانگان پای بی‌قرار و شدت آن با هم مقایسه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های اطلاعات دموگرافیک، چهار معیار ارایه شده توسط انجمن بین‌المللی مطالعات نشانگان پای بی‌قرار (International Restless Legs Syndrome Study Group) و کیفیت خواب Pittsburgh استفاده گردید. برای تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون‌های آماری تی مستقل و کای دو استفاده شد.

یافته‌ها: ۳۷/۸ درصد از افراد مورد مطالعه، مبتلا به نشانگان پای بی‌قرار بودند. در گروه دارای اختلال کیفیت خواب، ۵۴/۱ درصد و در گروه فاقد اختلال کیفیت خواب، ۲۱/۶ درصد مبتلا به نشانگان پای بی‌قرار بودند. شانس ابتلا به نشانگان پای بی‌قرار در افراد دارای اختلال کیفیت خواب، ۴/۲۶ برابر افراد فاقد اختلال کیفیت خواب بود ($OR = 4/26$) و $95\% CI = 2/08 - 8/74$.

نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط بین نشانگان پای بی‌قرار و اختلال خواب، غربالگری بیماران تحت همودیالیز از نظر نشانگان پای بی‌قرار لازم به نظر می‌رسد.

کلید واژه‌ها: نشانگان پای بی‌قرار، کیفیت خواب، همودیالیز

نویسنده مسؤول:

رضا قانعی قشلاق

دانشگاه علوم بهزیستی و

توانبخشی

پست الکترونیکی:

rezaghane30@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله: ۹۱/۱۲/۲۶

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۲/۳/۱۱

مقدمه

دو برابر افراد سالم در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند.^۸ اختلال خواب با تأثیر منفی روی عملکردهای متابولیکی و ایمنی بیمار، منجر به اختلال سیستم ایمنی، نقص در ساخت پروتئین و تقسیم سلولی می‌شود و در کل میزان بیماری و مرگ و میر را افزایش می‌دهد.^۹ یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غیر قابل تشخیص که چالشی برای مراقبت از خواب بیماران به حساب می‌آید، نشانگان پای بی‌قرار است.^{۱۰} این اختلال برای اولین بار در سال ۱۶۸۵ توسط پزشک انگلیسی Thomas Willis شناسایی و در سال ۱۹۴۵ توسط Karl Ekbom نام‌گذاری شد.^{۱۱} نشانگان پای بی‌قرار، اختلال حرکتی است که با تمایل شدید به حرکت پاها حین استراحت مشخص می‌شود. این تمایل به حرکت با احساس ناخوشایندی در پاها همراه است که بیماران مبتلا آن را با عباراتی از قبیل احساس ضربان، سوزش یا مورمور شدن، احساس وجود حشره و یا جریان برق در پا توصیف می‌کنند و محل این احساس ناخوشایند در مچ پا تا زانوها است.^{۱۲، ۱۳} برای تشخیص این اختلال معیارهای ویژه‌ای توسط انجمن بین‌المللی مطالعات نشانگان پاهای بی‌قرار

نارسیایی مزمن کلیه، کاهش غیر قابل برگشت و پیش‌رونده عملکرد کلیه‌ها است که در نهایت و در مراحل انتهایی منجر به بیماری کلیوی می‌شود.^۱ اگرچه روش‌های درمانی متفاوتی در خصوص جایگزینی کلیه وجود دارد، اما فراوان‌ترین روش مورد استفاده در اغلب بیماران «همودیالیز» است.^۲ اگرچه درمان با همودیالیز سبب بقای زندگی و افزایش امید به زندگی در بیمار می‌گردد، اما این روش درمانی باعث می‌شود که بیماران با مشکلات متعددی از قبیل تنش‌های روانی، انزوای اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی مواجه شوند.^{۳، ۴} یکی از مشکلات عمده‌ای که بیماران تحت همودیالیز با آن مواجه هستند، اختلال خواب است؛ به طوری که بیش از ۸۵ درصد بیماران تحت همودیالیز، مشکل اساسی خواب دارند.^۵

خواب، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی انسان و یکی از مهم‌ترین چرخه‌های زیستی است که با مکانیسم‌های متفاوت سبب رفع خستگی و آمادگی مجدد انسان برای فعالیت‌های روزانه می‌شود.^۶ سلامت انسان در هر سنی با کمیت و کیفیت خواب مرتبط است؛^۷ به طوری که افراد دارای اختلال کیفیت خواب

همسان شده بود، به عنوان شاهد انتخاب شد. از جامعه آماری مذکور ۷۴ بیمار همودیالیز دارای اختلال خواب (مورد) و ۷۴ بیمار همودیالیز بدون اختلال خواب (شاهد) با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی از نوع آسان انتخاب شدند. بیماران دو گروه از نظر مشکل نشانگان پای بی‌قرار و شدت آن با هم مقایسه شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل رضایت جهت شرکت در مطالعه، سواد خواندن و نوشتن، عدم اعتیاد به مواد مخدر و خواب‌آورها، حامله نبودن و طول مدت همودیالیز بیش از ۳ ماه بود.

ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه بود. بخش اول پرسش‌نامه بررسی وضعیت دموگرافیک بیماران از قبیل سن، جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات و طول مدت همودیالیز بود. بخش دوم شامل چهار معیار معرفی شده انجمن بین‌المللی تشخیص نشانگان پاهای بی‌قرار بود و در صورتی که بیمار هر چهار معیار را دارا می‌بود به عنوان بیمار مبتلا به نشانگان پای بی‌قرار در نظر گرفته می‌شد. ابزار بررسی شدت نشانگان پای بی‌قرار دارای ده سؤال پنج‌گزینه‌ای بود که هر سؤال صفر تا چهار امتیاز داشت. شدت این اختلال بر اساس امتیازات کسب شده به پنج دسته [فاقد مشکل (صفر)، خفیف (۱ تا ۱۰)، متوسط (۱۱ تا ۲۰)، شدید (۲۱ تا ۳۰) و خیلی شدید (۳۱ تا ۴۰)] طبقه‌بندی می‌شد.^{۱۹،۲۲} روایی و پایایی معیارهای غربالگری نشانگان پای بی‌قرار در مطالعه ملاحسینی و همکاران در ایران نیز تأیید شده است.^{۲۰} جهت تعیین اعتبار علمی پرسش‌نامه از اعتبار محتوا و به منظور تعیین اعتماد علمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی پرسش‌نامه شدت نشانگان پای بی‌قرار برابر با ۹۷ درصد محاسبه شد.

از پرسش‌نامه کیفیت خواب Pittsburgh برای بررسی کیفیت خواب بیماران طی ماه گذشته استفاده گردید. این پرسش‌نامه استاندارد ۱۹ سؤالی خواب مطلوب (پرکیفیت) را از نامطلوب (بی‌کیفیت) با ارزیابی هفت ویژگی خواب بیماران طی ماه گذشته مشخص می‌سازد. این هفت ویژگی عبارت است از کیفیت ذهنی خواب، تأخیر خواب، طول مدت خواب، کارایی خواب، مشکلات زمان خواب، استفاده از خواب‌آورها و اختلال عملکرد روزانه. امتیاز هر سؤال بین صفر تا سه و امتیاز هر جز نیز حداکثر سه است. مجموع میانگین نمرات این هفت جز، نمره کلی ابزار را تشکیل می‌دهد که دامنه آن از صفر تا ۲۱ می‌باشد. هر چه نمره کسب شده بالاتر باشد، کیفیت خواب پایین‌تر است و در مجموع نمره بالاتر از ۶ دلالت بر کیفیت خواب نامطلوب دارد.^{۲۳،۲۴}

در مطالعه صالحیوهمکاران پایایی پرسش‌نامه Pittsburgh با آلفای کرونباخ برابر با ۰/۹۴ تأیید شده بود.^{۲۵} در این مطالعه میزان پایایی پرسش‌نامه کیفیت خواب Pittsburgh بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۳ بود. متغیر کیفیت خواب به صورت کیفی و در مقیاس اسمی (دارای اختلال کیفیت خواب و فاقد اختلال کیفیت خواب) تحلیل شد. در ابتدای مطالعه، پژوهشگران خود و اهداف مطالعه را به واحدها معرفی و از آن‌ها برای شرکت در مطالعه کسب اجازه کردند. شرکت در مطالعه کاملاً اختیاری بود و کلیه نمونه‌ها جهت خروج از مطالعه آزاد بودند. به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، نام

(International Restless Legs Syndrome Study Group) مطرح شده است که شامل چهار مورد تمایل به حرکت انتهایها به طور مکرر در رابطه با احساس غیر طبیعی پوست، تسکین موقتی علائم ناخوشایند با حرکت دادن، شروع یا تشدید علائم با استراحت یا عدم تحرک و شروع یا تشدید علائم در غروب یا شب است.^{۱۴} شروع یا تشدید علائم در شب ممکن است منجر به اختلال خواب (و نوعی شب‌زنده‌داری) در بیماران مبتلا شود.^{۱۲}

نشانگان پای بی‌قرار به عنوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غیر قابل تشخیص، مطرح شده است.^{۱۵} Mucsi و همکاران بر این عقیده بودند که بیش از دو سوم بیماران مبتلا به نشانگان پای بی‌قرار دارای اختلال کیفیت خواب می‌باشند.^{۱۶} Bogan به نقل از یک مطالعه چینی میزان شیوع نشانگان پای بی‌قرار در جمعیت تحت همودیالیز را ۷۰ درصد می‌داند.^{۱۷} علل شیوع این اختلال در بیماران تحت همودیالیز نامشخص است.^{۱۸} میزان شیوع نشانگان پای بی‌قرار در بیماران همودیالیز کره و چین به ترتیب ۲۸ و ۶۲ درصد گزارش شده است.^{۱۹} در مطالعه علیدوستی و همکاران^۴ و ملاحسینی و همکاران^{۲۰} به ترتیب ۶۱/۵ و ۵۷/۳ درصد بیماران تحت همودیالیز، مبتلا به نشانگان پاهای بی‌قرار بودند. نشانگان پای بی‌قرار سبب افزایش بروز اختلالات روانی، کاهش کیفیت زندگی، افزایش خطر بیماری‌های قلبی، افسردگی، اضطراب و خستگی می‌شود.^{۱۹،۲۱} بیماران دارای نشانگان پای بی‌قرار فعالیت‌های نیازمند دوره‌های طولانی نشستن و بی‌تحرکی از قبیل مسافرت، تئاتر رفتن و خوابیدن را به سختی تحمل می‌کنند؛ چرا که دوره‌های بی‌حرکتی علائم بیماری را تشدید می‌کند؛ در نتیجه نشانگان پای بی‌قرار سبب خستگی مفرط روزانه، اختلال عملکرد، افسردگی، ایجاد انزوای اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی می‌گردد.^{۲۱،۲۲}

در مجموع مواجهه با مشکلات ناشی از همودیالیز از قبیل کاهش کارایی، ضعف و خستگی، انزوای اجتماعی، عدم تحرک و کاهش اعتماد به نفس و از سوی دیگر مواجهه با مشکلات ناشی از نشانگان پای بی‌قرار، زندگی را برای بیماران و حتی خانواده‌هایشان پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند.^۲ با وجود این که اغلب بیماران تحت همودیالیز از اختلال خواب رنج می‌برند، اما ارتباط بین نشانگان پای بی‌قرار با اختلال خواب در مطالعات محدود داخلی بررسی شده است. برای روشن شدن روابط فرضی بین این دو متغیر مهم، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین نشانگان پای بی‌قرار با اختلال خواب در بیماران تحت همودیالیز انجام شد.

مواد و روش‌ها

این پژوهش یک مطالعه مورد-شاهدی بود که در سال ۱۳۸۹ بر روی ۱۴۸ بیمار تحت همودیالیز واجد شرایط (از ۲۵۰ بیمار) مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان طالقانی ارومیه انجام شد. جامعه آماری مطالعه را بیماران تحت همودیالیز مبتلا به اختلال خواب تشکیل دادند که بر اساس پرسش‌نامه کیفیت خواب Pittsburgh نمره بالاتر از ۶ کسب کرده بودند و مشکل آن‌ها تأیید شده بود. به ازای هر بیمار تحت همودیالیز مبتلا به اختلال خواب، یک بیمار همودیالیز بدون مشکل خواب که از نظر جنس و سن با گروه مورد

جدول ۲: توزیع فراوانی نسبی و مطلق واحدهای مورد مطالعه بر اساس

P	مجموعه و عدم وجود نشانه‌های پای بی‌قرار		گروه‌ها فراوانی نشانه‌های پای بی‌قرار
	فاقد اختلال کیفیت خواب	دارای اختلال کیفیت خواب	
	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	
	۱۶ (۲۱/۶)	۴۰ (۵۴/۱)	دارد
۰/۰۰۱	۵۸ (۷۸/۴)	۳۴ (۴۵/۹)	ندارد
	۷۴ (۱۰۰)	۷۴ (۱۰۰)	جمع

جدول ۳: توزیع فراوانی مطلق و نسبی شدت علائم نشانه‌های پای بی‌قرار در دو گروه دارای اختلال خواب و فاقد اختلال خواب

شدت علائم	گروه	
	دارای اختلال خواب	فاقد اختلال خواب
	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)
خفیف	۹ (۵۴/۱)	۱۶ (۲۱/۶)
متوسط	۳۰ (۴۵/۹)	۵۸ (۷۸/۴)
شدید و خیلی شدید	۳۵ (۴۷/۳)	۱۶ (۲۱/۶)
جمع	۷۴ (۱۰۰)	۷۴ (۱۰۰)
P	< ۰/۰۰۱	

بحث

در مطالعه فعلی بین اختلال کیفیت خواب با نشانه‌های پای بی‌قرار ارتباط معنی‌داری وجود داشت؛ به طوری که شانس نشانه‌های پای بی‌قرار در افراد دارای اختلال خواب ۴/۲۶ برابر افراد فاقد اختلال خواب بود. در مطالعه ملاحسینی و همکاران که با هدف بررسی فراوانی اختلال خواب و نشانه‌های پای بی‌قرار در بیماران تحت هومودیالیز شهر تهران انجام شد، ۶۱/۵ درصد بیماران دارای نشانه‌های پای بی‌قرار بودند و تمام افرادی که از اختلال خواب رنج می‌بردند همزمان به نشانه‌های پای بی‌قرار نیز مبتلا بودند. ^۴ در مطالعه علی دوستی و همکاران نیز ۵۷/۳ بیماران تحت هومودیالیز دارای علائم نشانه‌های پای بی‌قرار بودند و میانگین نمره کیفیت خواب بیماران تحت هومودیالیز مبتلا به نشانه‌های پای بی‌قرار بیش از بیماران فاقد نشانه‌های پای بی‌قرار بود. ^۴ در مطالعه سلیم‌پور و همکاران هم ۳۳/۱ درصد بیماران تحت دیالیز دارای نشانه‌های پای بی‌قرار بودند. ^{۱۸} Winkelman و همکاران گزارش کردند که ۸۸ درصد بیماران مبتلا به نشانه‌های پای بی‌قرار دارای اختلال کیفیت خواب هستند. ^{۲۶} در مطالعه Mucsi و همکاران ^{۱۶} و Holmes و همکاران ^{۱۱} هم به ترتیب ۷۹ و ۹۰ درصد بیماران مبتلا به نشانه‌های پای بی‌قرار دارای اختلال کیفیت خواب بودند. در مطالعه Merlino و همکاران هم ۱۸/۴ درصد بیماران دارای نشانه‌های پای بی‌قرار بودند. ^{۱۷} با توجه به این که نشانه‌های پای بی‌قرار یک بیماری پیچیده و چند عاملی است، به نظر می‌رسد عوامل ژنتیکی و محیطی نیز در بروز آن دخیل باشد. تفاوت‌های نژادی، وجود عوامل مستعد کننده و عوامل محیطی می‌توانند منجر به ایجاد اختلاف وسیع در میزان شیوع نشانه‌های پای بی‌قرار در مطالعات مختلف شوند. نتایج مطالعه‌ای که با هدف بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های پای بی‌قرار در بیماران تحت هومودیالیز قفقازی و

و نام خانوادگی بیماران در پرسش‌نامه‌ها درج نشد. برای تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ استفاده گردید. داده‌های پژوهش به کمک روش‌های آماری توصیفی، آزمون تی مستقل و کای دو تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی‌داری $P < ۰/۰۵$ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

بیماران تحت هومودیالیز مورد مطالعه از نظر سن و جنس همسان شده بودند؛ به طوری که در هر گروه ۳۸ زن (۵۱/۴ درصد) و ۳۶ مرد (۴۸/۶ درصد) قرار داشتند. اکثریت افراد مورد مطالعه (۸۳ نفر، ۵۶/۱ درصد) در محدوده سنی ۶۰-۳۰ سال بودند (جدول ۱).

میانگین طول مدت دیالیز بیماران ۳۶/۹ ماه و میانگین طول مدت دیالیز بیماران دارای نشانه‌های پای بی‌قرار (۴۲/۹ ماه) بیشتر از بیماران فاقد نشانه‌های پای بی‌قرار (۳۳/۲ ماه) بود. بر اساس آزمون تی مستقل، این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. در گروه دارای اختلال کیفیت خواب، ۵۴/۱ درصد بیماران تحت هومودیالیز و در گروه فاقد اختلال کیفیت خواب، ۲۱/۶ درصد بیماران تحت هومودیالیز مبتلا به نشانه‌های پای بی‌قرار بودند. طبق آزمون کای دو، شانس ابتلا به نشانه‌های پای بی‌قرار در افراد دارای اختلال کیفیت خواب ۴/۲۶ برابر افراد فاقد اختلال کیفیت خواب بود $OR = ۴/۲۶$ و $95\% CI (Confidence intervals)$ (جدول ۲).

بیشتر واحدهای مورد مطالعه (۴۷/۳ درصد) در گروه دارای اختلال خواب علائم شدید و خیلی شدید نشانه‌های پای بی‌قرار را دارا بودند؛ در حالی که بیشتر واحدهای مورد مطالعه (۷۳ درصد) در گروه فاقد اختلال خواب، علائم متوسط نشانه‌های پای بی‌قرار را تجربه کرده بودند. همچنین آزمون آماری کای دو نشان داد که توزیع شدت علائم پای بی‌قرار در واحدهای مورد مطالعه در دو گروه دارای اختلال خواب و فاقد اختلال خواب یکسان نبود ($P < ۰/۰۰۱$) (جدول ۳).

جدول ۱: توزیع فراوانی نسبی و مطلق اختلال کیفیت خواب واحدهای مورد

متغیر	مطالعه بر اساس متغیرهای دموگرافیک	
	گروه	فاقد اختلال کیفیت خواب
	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)
جنسیت	مرد	۳۸ (۵۰/۰)
	زن	۳۶ (۵۰/۰)
وضعیت تأهل	مجرد	۵ (۶/۸)
	متاهل	۶۸ (۹۳/۲)
مدت دیالیز	۳ ماه تا ۲ سال	۳۷ (۵۰/۰)
	۲ تا ۵ سال	۲۲ (۲۹/۷)
	بیش از ۵ سال	۱۵ (۲۰/۳)
تحصیلات	بی‌سواد	۴۵ (۶۰/۸)
	ابتدایی و راهنمایی	۱۰ (۱۳/۵)
	دبیرستان و دیپلم	۱۰ (۱۳/۵)
	دیپلم به بالا	۹ (۱۲/۲)

نتیجه گیری

با توجه به این که نشانگان پای بی‌قرار از عوامل مؤثر بر اختلال کیفیت خواب می‌باشد، آموزش اقداماتی از قبیل ماساژ، حمام آب گرم و تکنیک انحراف فکر برای کنترل و تسکین علائم ناخوشایند نشانگان پای بی‌قرار در جهت بهبود کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز توصیه می‌شود.

تعارض منافع

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.

سهم نویسندگان

حسین حبیب زاده: طراحی و اجرای طرح، تجزیه و تحلیل داده‌ها و تدوین اولیه مقاله

نصیبه لازاری: جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها، مشارکت در تدوین مقاله

رضا قانعی: جمع‌آوری داده‌ها و تأیید نهایی مقاله

سپاسگزاری

این پژوهش حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با شماره ۲۵۵-۳۳-۰۱-۸۹ می‌باشد. پژوهشگران بر خود لازم می‌دانند که از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به دلیل حمایت مالی و نیز از همکاری صمیمانه واحد همودیالیز بیمارستان طالقانی و تمامی بیماران مشارکت کننده در پژوهش کمال سپاسگزاری را داشته باشند.

آفریقایی-آمریکایی انجام شده بود، نشان داد که ابتلا به نشانگان پای بی‌قرار در بیماران قفقازی بیش از بیماران آفریقایی‌های آمریکایی تبار بوده است.^{۲۸} در این مطالعه ۲۱/۶ درصد بیماران فاقد اختلال خواب، دارای علائم شدید نشانگان پای بی‌قرار بودند و ۴۷/۳ درصد بیماران دارای اختلال خواب از علائم شدید نشانگان پای بی‌قرار رنج می‌بردند. اغلب افراد تحت همودیالیز (۴۰/۹ درصد) در مطالعه Merlino و همکاران دارای علائم متوسط نشانگان پای بی‌قرار بودند.^{۲۷} اغلب بیماران در مطالعه Araujo و همکاران دارای علائم متوسط و شدید نشانگان پای بی‌قرار بودند.^{۲۹} مطالعه Wetter و همکاران هم نشان داد که بیماران مبتلا به نشانگان پای بی‌قرار خفیف و متوسط کمتر از سه شب در هفته علائم اختلال خواب را گزارش می‌کنند و علائم آن‌ها فقط در طول شب بروز می‌کرد و در طول روز هیچ علامتی نداشتند، اما بیماران مبتلا به نشانگان پای بی‌قرار شدید در تمامی طول شبانه‌روز علائم ناخوشایند بیماری را داشتند.^{۳۰} تمامی مطالعات ذکر شده نتیجه پژوهش حاضر در مورد ارتباط بین نشانگان پای بی‌قرار با اختلال کیفیت خواب را تأیید می‌کنند. در مطالعه فعلی میانگین طول مدت دیالیز در دو گروه بیماران دارای نشانگان پای بی‌قرار و فاقد نشانگان پای بی‌قرار اختلاف معنی‌داری نداشت که با نتیجه مطالعه علیدوستی و همکاران،^۴ سلیم‌پور و همکاران^{۱۸} و Kim و همکاران^{۱۹} همخوانی دارد. یکی از محدودیت‌های این مطالعه، حجم نمونه پایین و عدم پاسخگویی برخی از بیماران تحت همودیالیز بود که قابلیت تعمیم نتایج را کاهش می‌دهد.

References

- Mohseni R, Ilali ES. Assessment of Adequacy of Dialysis in Patients Undergoing Dialysis with Bicarbonate Solution. *Hayat* 2011; 17(4): 63-72. [In Persian].
- Aliloo LL, Shakibi A, Shargh A. The efficacy of home care education on knowledge and performance of hemodialysis renal patients discharged from hospitals. *Urmia Med J* 2011; 22(5): 410-5. [In Persian].
- Otaghi M, Hassani P, Zaghari Tafreshi M, Nikbakht Nasrabadi A. Challenge in Acceptance of Hemodialysis: A Part of a Grounded Theory. *Journal of Gorgan Bouyeh Faculty of Nursing and Midwifery* 2013; 11(3): 26-34. [In Persian].
- Alidosti M, Hemate Z, Reisi M. Relationship between the quality of sleep and restless legs syndrome among. *Feyz* 2013; 17(1): 85-90. [In Persian].
- Arab Z, Shariati AR, Bahrami HR, Asayesh H, Vakili MA. The effect of acupressure on quality of sleep in hemodialysis patient. *J Urmia Nurs Midwifery Fac* 2012; 10(2): 237-45. [In Persian].
- Emkani M, Khanjani N. Sleep quality and its related factors in intercity bus drivers. *J Mil Med* 2012; 14(2): 137-41. [In Persian].
- Gaffari F, Zeighami Mohammadi SH. Frequency of daytime sleepiness in hypertensive women. *Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac* 2011; 19(1): 5-13. [In Persian].
- Jafarian Amiri S, Zabihi A, Babaie F, Sefidchian A, Bijanee A. Sleep quality and associated factors in hospitalized patients in Babol, Iran. *Hormozgan Med J* 2011; 15(2): 144-51. [In Persian].
- Tamburri LM, DiBrienza R, Zozula R, Redeker NS. Nocturnal care interactions with patients in critical care units. *Am J Crit Care* 2004; 13(2): 102-12.
- Spolador T, Allis JC, Ponde MP. Treatment of restless legs syndrome. *Rev Bras Psiquiatr* 2006; 28(4): 308-15.
- Cotter PE, O'Keeffe ST. Restless leg syndrome: is it a real problem? *Ther Clin Risk Manag* 2006; 2(4): 465-75.
- Kushida C, Martin M, Nikam P, Blaisdell B, Wallenstein G, Ferini-Strambi L, et al. Burden of restless legs syndrome on health-related quality of life. *Qual Life Res* 2007; 16(4): 617-24.
- DeSimone EM, Petrov K. Restless Legs Syndrome: A Common, Underdiagnosed Disorder. *US Pharmacist* 2009; 34(1): 24-9.
- Skidmore FM, Drago V, Foster PS, Heilman KM. Bilateral restless legs affecting a phantom limb, treated with dopamine agonists. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2009; 80(5): 569-70.
- Habibzade H, Khalkhali H, Ghaneii R. Study of the relationship between restless legs syndrome and sleep disturbance among patients in Critical Care Units. *Iran J Crit Care Nurs* 2011; 4(3): 153-8. [In Persian].
- Mucsi I, Molnar MZ, Ambrus C, Szeifert L, Kovacs AZ, Zoller R, et al. Restless legs syndrome, insomnia and quality of life in patients on maintenance dialysis. *Nephrol Dial Transplant* 2005; 20(3): 571-7.
- Bogan RK. Effects of restless legs syndrome (RLS) on

- sleep. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2006; 2(4): 513-9.
18. Salimpour H, Azizi F, Motamed N, Taiebi N, DelavarKasmaie H, Karimi M. Restless leg syndrome and its association with serum ferritin in dialysis patients in Bushehr province, 2006. *Iran South Med J* 2009; 12(3): 206-13. [In Persian].
 19. Kim JM, Kwon HM, Lim CS, Kim YS, Lee SJ, Nam H. Restless legs syndrome in patients on hemodialysis: symptom severity and risk factors. *J ClinNeurol* 2008; 4(4): 153-7.
 20. MolahosseiniSh, MohammadzadehSh, Kamali P, TavakkoliShoostari M. Frequency of sleep disorder and restless legs syndrome in patients referring to hemodialysis units in university hospitals in Tehran in 2003. *Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch* 2005; 15(1): 27-30. [In Persian].
 21. Holmes R, Tluk S, Metta V, Patel P, Rao R, Williams A, et al. Nature and variants of idiopathic restless legs syndrome: observations from 152 patients referred to secondary care in the UK. *J Neural Transm* 2007; 114(7): 929-34.
 22. Masuko AH, Carvalho LB, Machado MA, Morais JF, Prado LB, Prado GF. Translation and validation into the Brazilian Portuguese of the restless legs syndrome rating scale of the International Restless Legs Syndrome Study Group. *ArqNeuropsiquiatr* 2008; 66(4): 832-6.
 23. Mondal P, Gjevre JA, Taylor-Gjevre RM, Lim HJ. Relationship between the Pittsburgh Sleep Quality Index and the Epworth Sleepiness Scale in a sleep laboratory referral population. *Nat Sci Sleep* 2013; 5: 15-21.
 24. Buysse DJ, Reynolds CF, III, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Res* 1989; 28(2): 193-213.
 25. Salehi K, Alhani F, Sadegh-NiatKh, Mahmoudifar Y, Rouhi N. Quality of Sleep and Related Factors among Imam Khomeini Hospital Staff Nurses. *Iran J Nurs* 2010; 23(63): 18-25. [In Persian].
 26. Winkelman JW, Redline S, Baldwin CM, Resnick HE, Newman AB, Gottlieb DJ. Polysomnographic and health-related quality of life correlates of restless legs syndrome in the Sleep Heart Health Study. *Sleep* 2009; 32(6): 772-8.
 27. Merlino G, Piani A, Dolso P, Adorati M, Cancelli I, Valente M, et al. Sleep disorders in patients with end-stage renal disease undergoing dialysis therapy. *Nephrol Dial Transplant* 2006; 21(1): 184-90.
 28. Kutner NG, Bliwise DL. Restless legs complaint in African-American and Caucasian hemodialysis patients. *Sleep Med* 2002; 3(6): 497-500.
 29. Araujo SM, de Bruin VM, Nepomuceno LA, Maximo ML, Daher EF, CorreiaFerrer DP, et al. Restless legs syndrome in end-stage renal disease: Clinical characteristics and associated comorbidities. *Sleep Med* 2010; 11(8): 785-90.
 30. Wetter TC, Collado-Seidel V, Oertel H, Uhr M, Yassouridis A, Trenkwalder C. Endocrine rhythms in patients with restless legs syndrome. *J Neurol* 2002; 249(2): 146-51.

Relationship between restless legs syndrome and sleep quality in hemodialysis patients

Hosein Habibzadeh¹, Nasibeh Lazari², Reza Ghanei-Gheshlagh³

Original Article

1. Assistant Professor of Nursing, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
2. MSc of Nursing, Urmia Imam Khomeini Hospital, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
3. PhD Student of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

Medical - Surgical Nursing Journal, 2013; 2(1,2): 57-62

ABSTRACT

Background and Objective: Hemodialysis is the most common renal replacement therapy in patients with end-stage renal disease. Although this method increases survival rate and life expectancy, but this patients face with many problems such as sleep disorder and restless legs syndrome. The present study was carried out to investigate the relationship between restless legs syndrome and sleep quality among hemodialysis patients.

Materials and Methods: In this case-control study, 74 hemodialysis patients with sleep disorders (cases) were selected by convenience sampling method and matched with 74 hemodialysis patients without sleep disorders (control) in sex and age (± 5). Then, restless legs syndrome and its severity were compared in the both groups. The data collection instruments included demographic information questionnaire, four criteria for restless leg syndrome based on the International Restless Legs Syndrome Study Group, and Pittsburgh Sleep Quality Index. Data were analyzed by SPSS 16 independent t and chi-square tests.

Results: Totally, 37.8% of hemodialysis patients showed signs of restless legs syndrome. 54.1% of cases and 21.6% of control have restless legs syndrome. The restless legs syndrome incidence in case group was 4.26 fold higher in patients with than those have no sleep disorders (CI95% = 2.08-8.74, OR = 4.26).

Conclusion: Given to the relationship between restless legs syndrome and sleep disturbance, restless legs syndrome screening in hemodialysis patients seems necessary.

Keywords: Restless legs syndrome, sleep quality, hemodialysis

Correspondence:

Reza Ghanei-Gheshlagh
University of Social
Welfare and
Rehabilitation Sciences

Email:

rezaghanei30@yahoo.com

Rrceived: 17/3/2013

Accepted: 1/6/2013

Please cite this article as: Habibzadeh H, Lazari N, Ghanei-Gheshlagh R. Relationship between restless legs syndrome and sleep quality in hemodialysis patients. Medical - Surgical Nursing Journal 2013; 2(1,2): 57-62.



Medical & Surgical Nursing Journal

Vol. 2, No. 1-2, April 2013



Iranian Nursing Association

Owned and Published by: Zahedan University of Medical Sciences and Health Services, Nursing and Midwifery School

ISSN: 2322-178X

Ministry of Health and Medical Education

License No: 19191/90, 90.7.24

Chairman: Ali Navidian, PhD (Assistant Professor of Family Counseling)

Editor-in-Chief: Houshang Sanadgol, MD (Associate Professor of Internal Medicine)

Executive Manager: Fatiheh Kermansaravi, MSc (Assistant Professor of Nursing)

Executive Manager: Fatiheh Kermansaravi, MSc (Assistant Professor of Nursing)

Copy edit, Layout edit and Design:

Farzanegan Radandish Co.

Editorials Office: Mahdiye Rezaei, Nazi Mobayenfar

Internet Manager: Mahdiye Rezaei

Editorial Board

Alhani F. (PhD), Associate Professor of Nursing, Tarbiat Modares Tehran.

Arbabi-Sarjoo AA. (PhD), Assistant Professor of Nursing, Zahedan University of Medical Sciences.

Ebadi A. (PhD), Assistant Professor of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences.

Falahi Khoshknab M. (PhD), Associate Professor of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation.

Imani M. (MD), Associate Professor of Pediatrics Diseases, Zahedan University of Medical Sciences

Kermansaravi F. (MSc), Assistant Professor of Nursing, Zahedan University of Medical Sciences.

Metanat M. (MD), Associate Professor of Infectious Diseases, Zahedan University of Medical Sciences.

Mehrdad N. (PhD), Assistant Professor of Nursing, Tehran University of Medical Sciences.

Mohammadi I. (PhD), Associate Professor of Nursing, Tarbiat Modares Tehran.

Moodi Z. (PhD), Assistant Professor of Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences.

Najafi F. (MSc), Instructor of Nursing, Zahedan University of Medical Sciences.

Navidian A. (PhD), Assistant Professor of Family Counseling, Zahedan University of Medical Sciences.

Nasrabadi AR. (PhD), Associate Professor of Nursing, Tehran University of Medical Sciences.

Nikbakht Rakhshani F. (PhD), Professor of Health Education, Zahedan University of Medical Sciences.

Rakhshani F. (PhD), Professor of Health Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

Roodbari M. (PhD), Associate Professor of Statistic, Tehran University of Medical Sciences.

Sanadgol H. (MD), Associate Professor of Internal Medicine, Zahedan University of Medical Sciences.

Taheri M. (PhD), Assistant Professor of Medical Genetic, Zahedan University of Medical Sciences.

Yaghmaei F. (PhD), Associate Professor of Nursing, Islamic Azad university Zanjan Branch.

Yaghoobinia F. (PhD), Assistant Professor of Nursing, Zahedan University of Medical Sciences.

The referee of this edition

Ahmadi F. (PhD), Abbaszadeh A. (PhD), Falahi Khoshknab M. (PhD), Masuodi R. (PhD), Najafi F, Navidian A. (PhD), Rezheh N. (PhD), Roodbari M. (PhD), Sabzevari S. (PhD), Sanagoo A. (PhD), Yaghoobinia F. (PhD), Zeighami R. (PhD).

Background and Fields: Nursing

Funded By: Undersecretary for Research at Zahedan University of Medical Sciences with Cooperative by Iranian Nursing Association

Lithography and Publication: Karino Press, Zahedan, Daneshgah St, Daneshgah 29.

Circulation: 500

Reprinting of this publication is subject to citing the references, and all rights reserved.

Address: Medical & Surgical Nursing Journal, Mashahir Square, Zahedan Nursing and Midwifery University. P.O. Box: 98169-13396.

Tel: +98 541 2438473 fax: +98 541 2442481, email: ijmsn@zaums.ac.ir



Iranian Nursing Association

Medical– Surgical Nursing Journal

No 2 , Volume 1-2 , April 2013 , ISSN : 2322-178X



ORIGINAL ARTICLES

- **Coping process in renal transplant recipients: A grounded theory study.....10**
Rayyani M, Salsali M, Abbaszadeh A
- **The effect of reflexology on sleep quality of elderly: A single–blind clinical trial.....18**
Seyedrasooli A, Valizadeh L, Nasiri KH, Zamanzadeh V, Goljariyan S, Ghasemi O
- **Nurses' self-assessment of skills in the cardiovascular physical examination.....25**
Adib-Hajbaghery M, Safa A, Fazel Darbandi A
- **The impact of aromatherapy on hemodynamic condition of patients experiencing coronary angiography.....32**
Tahmasebi H, Abbasi E, Zafari M, Darvishi-Khezri H
- **The effect of quality of life training on self-efficacy in patients under hemodialysis treatment 38**
Soltani-Nejad S, Abbasi-Dolatabadi Z, Mahmoudi M
- **Comparing two methods of crawl and routine breastfeeding on behavior of breastfeeding during two hours after delivery.....44**
Navabi SH, Ebrahimi Tabas E, Khazayan S
- **The changes of life quality in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery; during one year.....50**
Jasemi M, Zamanzadeh V, Hasankhani H
- **Comparing the effect of dressing with silver sulfadiazine 1% or fundermol herbal ointments on pain management in patients with second-degree burn.....56**
Heidari M, Shahbazi S
- **Relationship between restless legs syndrome and sleep quality in hemodialysis patients.....62**
Habibzadeh H, Lazari N, Ghanei-Gheshlagh R
- **Student-educator relationship in clinical nursing education: Qualitative content analysis....71**
Yaghoobinia F, Heydari A, Latifnejad-Roudsari R