



فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی

ISSN : 2322-178X

دوره : ۱۴ شماره : ۱ بهار ۱۴۰۰

مقالات پژوهشی



Medical Surgical Nursing Journal

- ۱ تجربه زندگی بالوپوس اریتماتوز سیستمیک: یک مطالعه پدیدار شناسی
فرشته مظفری آزاد، حیدر علی عابدی، سید علی ناجی
- ۱۰ تأثیر بکارگیری اسپری بیحسی تبخیری بر شدت درد ناشی از تزریق وریدی در کودکان بستری در بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان
مصطفور عرب، بتول تیرگری، فخر ابازری، آسیه حیدری
- ۱۶ ارتباط رضایت جنسی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری
محسن تقدبی، لیلا قنبری افرا، حمید رضا گیلاسی، منیره قنبری افرا، زهراء طاهری خرامه
- ۲۳ تأثیر پروتکل آرام سازی بر سطح هوشیاری بیماران ترومایی وابسته به ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت های ویژه
ابراهیم ابراهیمی طبس، علی اکبر کیخا، عباس عباس زاده، حسین رفیعی، حسن عنایتی، بی بی مهدیه خدادادی حسینی، فربیا برهانی
- ۳۱ تأثیر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت خواب و کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی: یک کارآزمایی بالینی
محسن حجت، مهدی کریمی بارجهرمی، زهراء کرمی
- ۳۹ بررسی میزان رعایت مراقبت استاندارد از تراکثوستومی و برخی موانع موثر بر آن از دیدگاه پرستاران
زهراء موسی زاده ساری، مرضیه مالکی، فروزان آتش زاده شوریده، یدالله محرابی
- ۴۷ مقایسه تأثیر تغذیه لوله ای به دوش بولوس و انفوژیون مداوم بر میزان حجم باقیمانده معده و بروز اسهال در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه
محسن شهریاری، احسانه رضایی
- ۵۴ بررسی تأثیر آموزش گروهی به همسران بر فعالیت های روزانه و کیفیت زندگی بیماران مرد مبتلا به ضایعه نخاعی
فرهاد کهرمازی، طاهره میرشکار



انجمن علمی پرستاری ایران

فصلنامه پرستاری داخلی و جراحی



دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴

آدرس سایت مجله: <http://www.ijmsn.ir>

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده پرستاری و مامایی
دارای رتبه علمی پژوهشی از یکصد و دهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره ۱۰۰/۵۰۷ مورخ ۹۲/۳/۲۷

جانشین سردبیر: فرشته نجفی	شماره استاندارد بین المللی نشریه: ۱۷۸۰-۲۳۲۲
ویراستار علمی و ادبی: فرشته نجفی	شماره شاپا الکترونیکی: ۴۱۶۹-۲۳۲۲
ویراستار انگلیسی: دکتر فربیا یعقوبی نیا	شماره مجوز ارشاد اسلامی: ۹۰/۷/۲۴، ۱۹۱۹۱/۹۰
کارشناس مجله: تکتم کیانیان	مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی نویدیان
کارشناس اجرایی و مدیر پایگاه: مهدیه رضایی	مدیر اجرایی: فتحیه کرمان ساروی

اسامي هيئت تحريري

دکتر عزيزانه اربابی سرجو: استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دکتر فاطمه الحانی: دانشیار پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر محمود ایمانی: دانشیار بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دکتر فاطمه رخشانی: استاد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مسعود روباری: دانشیار آمار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر هوشنج سندگل: دانشیار بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دکتر محسن طاهری: دانشیار زنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دکتر عباس عبادی: دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران
دکتر مسعود فلاحی خشکناب: دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی تهران
فتحیه کرمان ساروی: استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

اسامي داوران اين شماره:

دکتر فروزان آتش زاده شوریده، دکتر حسین انصاری، دکتر ابوالفضل پاینده، زهرا پیشکار مفرد، مهلقا دهقان، دکتر مژگان رهنما، دکتر سکینه سبزواری، دکتر محسن شهریاری، دکتر رضا ضیغمی، دکتر مسعود فلاحی خشکناب، دکتر محمد رضا فیروزکوهی، فرشته قلچایی، دکتر بهمن کرد تمینی، شهین دخت نوابی ریگی، دکتر عصمت نوحی، دکتر علی نویدیان، دکتر فربیا یعقوبی نیا

حیطه تخصصی: پرستاری

حمایت علمی و تامین اعتبارات مالی مجله: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، با همکاری انجمن علمی پرستاری ایران استفاده از مطالب نشریه با ذکر منابع بلا منابع می باشد.

این مجله در پایگاه اینترنتی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، Iran Medex و Magiran نمایه شده است.

آدرس: زاهدان، میدان مشاهیر، دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، کد پستی: ۹۸۱۶۹۱۳۳۹۶

Email: ijmsn@zaums.ac.ir

نمبر: ۰۵۴-۳۳۴۴۲۴۸۱

تلفن: ۰۵۴-۳۳۴۴۸۴۷۳

تأثیر بکارگیری اسپری بی‌حسی تبخیری بر شدت درد ناشی از تزریق وریدی در کودکان

بسته در بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان

منصور عرب^۱, بتول تیرگری^۲, فرج ابازمی^۳, آسیه حیدی^۴

۱. مریبی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمی‌سیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

۲. استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

۳. استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

۴. کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

مقاله پژوهشی

فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، سال چهارم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴، صفحات ۱۵-۱۰

چکیده

زمینه و هدف: تزریق وریدی یکی از رایج‌ترین روش‌های تهاجمی دردناک در کودکان بسته‌ی درد ناشی از تزریق وریدی می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین اثر بخشی اسپری بی‌حسی تبخیری بر شدت درد ناشی از تزریق وریدی در کودکان بسته‌ی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۶۰ کودک ۱۲-۶ ساله بسته‌ی در بیمارستان امام رضا(ع) شهر سیرجان در سال ۱۳۹۲ وارد مطالعه شدند. کودکان به صورت در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه نفری قرار گرفتند. در گروه مداخله ۳۰-۴۰ ثانیه قبل از تزریق وریدی از اسپری بی‌حسی تبخیری استفاده شد و در گروه کنترل، اسپری مشابه اما حاوی نرم‌مال سالین مورد استفاده قرار گرفت. شدت درد حین مداخله با استفاده از مقیاس رفتاری و بلافاصله پس از مداخله با استفاده از مقیاس عددی سنجش درد ارزیابی شد. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و آزمون تی مستقل تحت نرم‌افزار آماری spss ۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: کودکان گروه مداخله در مقایسه با کودکان گروه کنترل در هر دو مقیاس، با توجه به میانگین نمره مقیاس رفتاری سنجش درد $1/85 \pm 1/40$ (p = 0.02) و میانگین مقیاس عددی سنجش درد $2/39 \pm 3/96$ (p = 0.036)، شدت درد کمتری را گزارش کردند.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش استفاده از اسپری بی‌حسی تبخیری می‌تواند درد روبه‌های تزریقی را در کودکان کاهش دهد؛ لذا پیشنهاد می‌شود که اسپری تبخیری قبل از تزریق وریدی در کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: اسپری بی‌حسی تبخیری، کودکان، درد، تزریق وریدی

نویسنده مسؤول:

آسیه حیدی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک:

Hadidi84lar@yahoo.com

تاریخ دریافت مقاله: ۹۳/۰۴/۲۳

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۳/۱۱/۲۳

مقدمه

تزریقات باعث درد، اضطراب و استرس شدید می‌گردد و ناتوانی در کاهش درد، افت همکاری کودکان را بدنبال خواهد داشت.^۵ درد ناشی از تزریق در کودکان با مقاومت، تنفس و اضطراب همراه با انجام رویه همراه است که در طولانی مدت سبب عوارض عاطفی شدید می‌گردد.^۶ بسیاری از کودکان در زمان تزریق وریدی گریه و مقاومت می‌کنند و همکاری مناسبی ندارند.^۷ از طرفی سیستم عصبی کودکان نسبت به تحريكات خیلی حساس است. درد می‌تواند مسیرهای عصبی در مغز را تغییر داده و بر نحوه واکنش به درد در آینده تأثیر بگذارد.^۸ درد نه تنها بر تکامل سیستم عصبی تأثیر دارد، بلکه سبب کاهش آستانه تحمل در جوانی و بزرگسالی می‌شود.^۹ با وجود درک اهمیت درد، عدم توانش از تزریقات در کودکان مورد توجه کمتری قرار گرفته است. هر چند ممکن است این درد به دلیل ترس از تزریق بعدی پنهان نگه داشته شود.^{۱۰} در کودکان درد ناشی از تزریق در هر جلسه درمان، می‌تواند اثرات منفی در سلامت جسمی و روانی آن‌ها داشته باشد^{۱۱} بنابراین کاهش درد ناشی از رویه دردناک به منظور همکاری بهتر در دفعات

تزریق وریدی یکی از رایج‌ترین روش‌های تهاجمی دردناک در کودکان بسته‌ی باشد؛ به طوریکه اینجمن مطالعه درد، آنرا به صورت تجربه ناخوشایند حسی و عاطفی تعریف کرده است که با آسیب بالقوه یا بالفعل بافتی همراه است.^۱ علاوه بر این رویه تزریق یکی از متداول‌ترین راه‌های رساندن دارو به بیماران است که جزو اقدامات دردناک قرار دارد و طف وسیعی از داروها و واکسن‌ها از این طریق وارد بدن می‌شوند.^۲ این رویه دو مین درد شدید در بیمارستان است.^۳ با وجود دردناک بودن؛ تزریق وریدی، یک رویه معمول در بیمارستان‌ها است و دلیل آن اهمیت رساندن مایعات و داروها به بیمار می‌باشد.^۴ در واقع درد، خیلی بیشتر از آنچه قبل از فکر می‌شد در انسان قابل درک است و تأثیرات قابل توجهی بر سلامت روانی انسان دارد.^۵ از طرفی قرار گرفتن زیاد در معرض درد آثار مخربی دارد که می‌بایست از آن‌ها اجتناب شود. شناخت نسبت به درد در دهه گذشته در کودکان افزایش چشم‌گیری داشته است.

معیارهای ورود به پژوهش شامل نیاز به تزریق وریدی بنا به تشخیص پزشک معالج، توان پاسخ دادن به مقیاس دیداری درد، اولین تجربه تزریق وریدی در زمان بسترهای فعلی و عدم ابتلاء به بیماری‌های خاص (اختلالات تیروئید، صرع، بیماری عروق محيطی یا بیماری که باعث کاهش هوشیاری در کودک شود) بود. بروز حساسیت نسبت به اسپری بی‌حس‌کننده و سرمه، همچنین درد شدید حاصل از بیماری کودک نیز به عنوان معیارهای خروج در نظر گرفته شدند.

درد حین و بعد از تزریق در هر گروه به ترتیب به وسیله مقیاس رفتاری درد (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability Scale) FLACC Scale و مقیاس عددی درد (Numeric Rating Scale) مورد ارزیابی قرار گرفت.

مقیاس بررسی رفتاری درد در کودکان جهت تعیین شدت درد حین تزریق وریدی از طریق واکنش‌های رفتاری کودک مورد استفاده قرار گرفت. این مقیاس توسط Markel و همکاران^{۱۹} (۱۹۹۷) طراحی شد و از ۵ بخش صورت، پاه، فعالیت، گریه و قابلیت تسکین تشکیل شده است. هر بخش امتیازی بین ۰-۲ را به خود اختصاص می‌دهد. امتیاز بالاتر نشانه واکنش بیشتر نسبت به درد می‌باشد. نمره هر یک از بخش‌ها به طور جداگانه درج شده و سپس ۵ بخش باهم جمع می‌شوند تا نمره کل درد محاسبه شود. محدوده نمره از ۰ (کمترین) تا ۱۰ (بیشترین) می‌باشد.

نمره کلی به سه طبقه تقسیم می‌شود: ۰-۳ (درد خفیف)، ۴-۷ (درد متوسط) و ۸-۱۰ (درد شدید).^{۲۰-۲۳} پایابی این ابزار در تحقیقات قبلی سنجیده شده است. توسلی^{۲۴} (۱۳۸۷) به روش مداخله مجدد و با استفاده از ضریب همبستگی، پایابی ۷۶ درصد را گزارش کرد.^{۲۱} در مطالعه حاضر پایابی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ^{۲۵}٪۸۵ محاسبه و تأیید گردید.

پس از تزریق وریدی، مقیاس عددی سنجش درد مورد استفاده قرار گرفت. مقیاس خطی صفر تا ده درد یک مقیاس استاندارد برای بررسی درد می‌باشد. محدوده نمره در سه طبقه ۰-۳ (درد خفیف)، ۴-۷ (درد متوسط)، ۸-۱۰ (درد شدید) تقسیم بنده شده است. روایی و پایابی این ابزار در مطالعه باقیان^{۲۶} (۱۳۹۰) مورد تأیید قرار گرفته است.^{۱۱} در مطالعه حاضر پایابی این ابزار با استفاده از نمره ضریب همبستگی^{۰/۸۳} درصد مورد تأیید قرار گرفت. پژوهشگر ابتدا با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان به والدین مراجعه کننده به این واحد که کودکانشان دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند، اهداف پژوهش را توضیح داد و بعد از جلب رضایت آنان برای شرکت در پژوهش، فرم رضایت آگاهانه به صورت کتبی از والدین گرفته شد. پژوهشگر قبل از رگ گیری به کودکان شرکت کننده در هر دو گروه، اسپری (که برای گروه مداخله حاوی اسپری تبخیری و برای گروه کنترل حاوی نرمال سالین بود)، آتشیوکت و وسایل مورد نیاز تزریق وریدی را نشان داد و در مورد نحوه باز کردن راه وریدی و فیکس کردن آن توضیح داد. اسپری تبخیری استفاده شده در این پژوهش اسپری یخ محصول کشور ایتالیا با نمایندگی انحصاری شرکت پژوهشی تجهیزگران طب نوین بود. ناحیه رگ گیری خم آرنج انتخاب گردید. در گروه مداخله قبل از رگ گیری از

بعدی تزریق، بخصوص در افرادی که به کرات نیاز به رگ گیری دارند بسیار مهم است.^{۱۲} روش‌های متعددی برای کاهش درد تزریقات کودکان مورد مداخله قرار گرفته است. این روش‌ها شامل استفاده از بی‌حس‌کننده‌های موضعی^{۱۳}، پوزیشن‌های مختلف در هنگام تزریق^۹، روش‌های مختلف انحراف فکر^{۱۴-۱۵}، استفاده از موسیقی^{۱۶-۱۹} و باد کردن بادکنک هستند.^{۲۰} با این حال بحث در مورد اثربخشی و انتخاب یک روش مؤثر برای پیشگیری از درد کودکان هنگام تزریق ادامه دارد.

مطالعات مختلف نشان دادند که تزریق لیدوکائین سبب کاهش درد به طور قابل توجهی می‌شود.^{۲۱،۲۲} با این حال تزریق لیدوکائین عملی در دادن اک است و احتمال فرورفتن سوزن در دست پرستار را افزایش می‌دهد.^{۲۳} بعلاوه، انجام این روش سبب افزایش آسیب بافتی شده و میزان تزریق وریدی ناموفق را کاهش نداده است.^{۱۵} عوامل بی‌حسی مانند کرم إملانیز بارها مورد استفاده قرار گرفته‌اند،^{۲۴} اما می‌بایست از ۴۵ دقیقه قبل از تزریق چندین بار مورد استفاده قرار گیرند که در بسیاری از موقعیت‌ها امکان پذیر نیست.^{۲۵} این معایب سبب تمایل کمتر به استفاده از این روش‌ها می‌گردد. مکانیزم اثر اسپری‌های بی‌حسی بخار شونده، بر اساس کاهش دمای پوست پس از تبخیر ماده بی‌حسی است. ماده بی‌حسی پس از اسپری شدن، گرمای پوست را می‌گیرد و با از کار انداختن گیرنده‌های حس درد سبب بی‌حسی موقت می‌شود.^{۲۶} با این حال پژوهش‌های انجام شده در مورد تأثیر این اسپری‌ها بر کاهش درد ناشی از تزریق وریدی، نتایج متناقضی را نشان داده‌اند. در حالی که برخی پژوهش‌ها استفاده از این روش‌ها را مؤثر دانسته‌اند،^{۲۷-۲۹} برخی دیگر نتایج مخالفی را نشان داده‌اند.^{۳۰} با توجه به اهمیت تعیین اثربخشی این روش برای استفاده در زمان تزریق وریدی، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر بکارگیری اسپری بی‌حسی تبخیری بر شدت درد ناشی از تزریق وریدی در کودکان بسترهای در بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان در سال ۱۳۹۲ انجام شد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی کودکان ۶-۱۲ ساله بسترهای در بخش کودکان بیمارستان امام رضا (ع) شهر سیرجان در سال ۱۳۹۲ انجام شد. حجم نمونه با توجه به نتایج مطالعات قبلی و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه^{۲۷} $Z_{\alpha-\beta} = \sqrt{\frac{1}{1/\rho}} = 1/28$ ، $Z_{\alpha-\beta} = 1/27$ ، $S_r = 1/27$ ، $S_r = 1/25$ ، $n = 11-12$ توان آزمون ۹۰ درصد و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان ۹۵٪ برای هر گروه ۱۳ نفر محاسبه گردید.^{۵،۱۳} ولیکن با توجه به احتمال ریزش نمونه، تعداد نمونه به ۳۰ نفر در هر گروه افزایش یافت. در نهایت ۶۰ کودک بسترهای در بخش کودکان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. کودکان مراجعه کننده در روزهای زوج به گروه مداخله (دربافت اسپری تبخیری) و کودکان مراجعه کننده در روزهای فرد به گروه کنترل (دربافت اسپری مشابه از نظر شکل ولی حاوی نرمال سالین) اختصاص یافتند.

فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید. همچنین با تأیید نرمال بودن داده‌ها، جهت مقایسه درد در گروه‌های مداخله و کنترل از آزمون تی مستقل استفاده شد.

یافته‌ها

یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بیشترین درصد فراوانی کودکان در هر دو گروه مداخله و کنترل مربوط به جنس پسر بود که در گروه مداخله (۶۶/۷ درصد) و در گروه کنترل (۶۳/۳ درصد) بودند. بیشترین میانگین سنی شرکت کنندگان در گروه مداخله ($9/1 \pm 2/2$) سال و در گروه کنترل ($8/9 \pm 2/17$) سال بود که به لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت. با توجه به نمره واکنش رفتاری درد در گروه مداخله، بیشترین فراوانی مربوط به درد ضعیف (۵۶/۸ درصد) و کمترین فراوانی را درد شدید (۳/۳ درصد) به خود اختصاص داده بود. در حالی که در گروه کنترل بیشترین فراوانی مربوط به درد متوسط (۶۶/۷ درصد) و کمترین فراوانی مربوط به درد شدید (۱۰ درصد) بوده است. در این پژوهش نتایج مقیاس‌های سنجش عددی و رفتاری درد نشان داد که کودکان در گروه مداخله درد کمتری را نسبت به کودکان در گروه کنترل تجربه کرده‌اند و این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار بود (جدول ۱).

اسپری تبخیری استفاده شد؛ به این صورت که اسپری در دمای اتاق توسط پژوهشگر از فاصله ۲۵ سانتی متری به مدت ۱۰-۵ ثانیه تا زمان سفید و رنگ پریده شدن پوست زده شد و سپس بدليل کوتاه اثر بودن ۴۰-۳۰ ثانیه بعد تزریق وریدی توسط پرستار مخصوص آغاز گردید. در گروه مداخله قبل از تزریق وریدی ابتدا اسپری زده شد و بعد ناحیه مورد نظر ضد عفونی گردید. در گروه کنترل نیز از اسپری مشابه به لحاظ شکل ولی حاوی نرمال سالین استفاده شد. روش و زمان استفاده از اسپری در گروه کنترل مشابه با گروه مداخله بود. روش ضد عفونی و تزریق وریدی بصورت کاملاً یکسان در هر دو گروه انجام گرفت؛ به این صورت که برای کلیه کودکان از آثربوکت شماره ۲۲ ساخت شرکت Dibi و الکل ۶۰ درصد ساخت شرکت رازی مورد استفاده قرار گرفت. موضع انجام تزریق وریدی و شرایط محیطی در هر دو گروه یکسان بود. رویه باز کردن رگ در تمامی کودکان، در هر دو گروه مداخله و کنترل توسط پرستار مخصوص با تجربه بخش کودکان انجام گرفت. مقیاس رفتاری درد در کودکان حین تزریق وریدی در هر دو گروه کنترل و ثبت شد. بلافضله بعد از تزریق، شدت درد توسط پژوهشگر کنترل و ثبت شد. پژوهشگر با نشان دادن این مقیاس به کودک، از وی خواست که شدت درد خود را از میان اعداد ۰ تا ۱۰ انتخاب کند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ۱۹ انجام گرفت. از آمار توصیفی جهت توصیف متغیرهای عددی و رفتاری درد مانند

جدول ۱: مقایسه نمره مقیاس (فتاری و عددی سنجش شدت درد در گودکان ۶-۱۲ ساله)

متغیر	گروه	ضعیف	متوسط	شدید	شدت درد	
					تعداد(درصد)	تعداد(درصد)
رفتاری	مداخله	۱۷ (۵۶/۷)	۱۲ (۴۰)	۱	۳/۴±۱/۸۵	۰/۰۰۲
	کنترل	۳ (۱۰)	۲۰ (۶۶/۷)	۷ (۲۳/۳)	۴/۹۶±۱/۹۵	
	عددی	۲۰ (۶۶/۶)	۵ (۱۶/۷)	۵ (۱۶/۷)	۳/۹۶±۲/۳۹	۰/۰۰۳۶
کنترل		۶ (۲۰)	۲۲ (۷۳/۵)	۲ (۶/۵)	۵/۴±۲/۷۶	

*آزمون تی مستقل

بحث

درد می‌باشد. در مطالعه Hijazi و همکاران (۲۰۰۹) گروه مداخله که اسپری تبخیری را دریافت نموده بودند؛ با توجه به مقیاس دیداری سنجش درد، ۱۲ از ۱۰۰ را گزارش دادند^۲ که نشان دهنده کاهش چشم‌گیر شدت درد است. در این مطالعه گروه سنی و ابزار مورد استفاده با مطالعه حاضر یکسان نبوده است، اما نتایج این پژوهش هم جهت با نتایج مطالعه حاضر بود. در پژوهش Cuper و همکاران (۲۰۱۲) که در آن تأثیر اسپری تبخیری و کرم إملا بر کاهش درد پس از تزریق بررسی شد، نتایج حاکی از آن بود که به طور کلی کرم إملا تأثیر بیشتری بر کاهش درد داشته است؛ اما در دردهای با شدت متوسط و خفیف اثر مشابهی داشتند.^۳ علت این تفاوت می‌تواند ناشی

نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از اسپری تبخیری بر کاهش شدت درد ناشی از تزریق وریدی در کودکان ۶-۱۲ ساله مؤثر بوده است. Farion و همکاران (۲۰۰۸) در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور در بیمارستان کودکان اونتاریوی شرقی تأثیر اسپری بی‌حسی تبخیری را با بلاسبو مقایسه کردند. نتایج حاکی از آن بود که بیش از نیمی از کودکانی که اسپری تبخیری را دریافت کردند؛ در مقیاس دیداری سنجش درد، فقدان یا کمترین شدت درد را گزارش دادند که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بوده است.^۴ یکسان بودن روش کار و گروه سنی این پژوهش و هم‌جهت شدن نتایج آن با نتایج مطالعه حاضر گویای تأثیرپذیری این اسپری بر کاهش

اندازه‌گیری بیشتری دارد. جهت رفع این مشکل از یک پرستار کارشناس مسلط جهت سنجش رفتار درد استفاده شد.

نتیجه‌گیری

کودکان گروه مداخله که اسپری تبخیری دریافت کرده بودند در مقایسه با کودکان گروه کنترل که اسپری مشابه از نظر شکل ولی حاوی نرمال سالین دریافت کرده بودند، در هر دو مقیاس رفتاری و عددی سنجش درد، شدت درد کمتری را گزارش کردند. با استفاده از این روش می‌توان تأثیر منفی درد را در کودکان به حداقل رساند و همکاری کودکان را در انجام رویه‌های دردناک بیشتر نمود. با توجه به این که این روش ارزان‌تر و نسبتاً بی‌ضررتر از روش‌های دیگر است و به طور سریع و مؤثر درد ناشی از تزریق وریدی بدون تأخیر در انجام روش کار کاهش می‌دهد، می‌تواند در تزریق وریدی کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندها بیان نشده است.

سهم نویسندها

منصور عرب: نظارت بر طراحی و اجرای پژوهش و تأیید نهایی مقاله
بتول تیرگرگی: تحلیل آماری و مشارکت در تدوین مقاله
فرخ ابازری: مشاور علمی طرح و ویراستار علمی مقاله
آسیه حدیدی: جمع‌آوری داده‌ها و تدوین مقاله.

سپاسگزاری

مقاله حاضر حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته پرستاری می‌باشد که با شماره طرح K ۴۹۱۹۲ و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و شماره IRCT2014060578444N4 ثبت رسیده است. از تمامی مشارکت کنندگان، پرستاران و کارکنان محترم بیمارستان امام رضا (ع) شهر سیرجان، تشکر و قدردانی ویژه به عمل می‌آید.

References

- Black JM, Hawks JH. Clinical management for positive outcomes. 8th ed. Medical-surgical nursing. St. Louis: Mo. Saunders/Elsevier: 2009: 57.
- Arab M, Abbaszade A, Ranjbar E, Pouraboli B, Ryan M. Psychological problems in children with thalassemia and their siblings. Iranian Journal of Nursing Research 2011; 24(7): 61-53.[Persian]
- Kennedy RM, Luhmann J, Zempsky WT. Clinical implications of unmanaged needle-insertion pain and distress in children. Pediatrics 2008; 122(3): 130-3.
- Cuper NJ, de Graaff JC, van Dijk AT, Verdaasdonk RM, van der Werff DB, Kalkman CJ. Predictive factors for difficult intravenous cannulation in pediatric patients at a tertiary pediatric hospital. Pediatric Anesthesia 2012; 22(3): 223-9.
- Farion KJ, Splinter KL, Newhook K, Gaboury I, Splinter WM . The effect of vapocoolant spray on pain due to intravenous cannulation in children: a randomizedcontrolled trial. Canadian Medical Association Journal 2008; 179(1): 31-6.
- Nadine Perry J, Hooper V, Maslongale J. Reduction of Preoperative Anxiety in Pediatric Surgery Patients Using Age-Appropriate Teaching Interventions. Journal of PeriAnesthesia Nursing 2012; 27(2): 69-81.
- Bagnasco A, Pezzi E, Rosa F, Fornonil L, Sasso L. Distraction techniques in children during venipuncture: an Italian experience. Journal of Preventive Medicine and Hygiene 2012; 53(1): 44-8.
- Nagasako EM, Oaklander AL, Dworkin RH. Congenital insensitivity to pain: an update. Pain 2003; 101(3): 213-9.
- Ruda MA, Ling QD, Hohmann AG, Peng YB, Tachibana T. Altered nociceptive neuronal circuits after neonatal peripheral Inflammation. Science 2000; 289(5479): 628-30.
- Hasanpour M, Tootoonchi M, Aein F, Yadegarf G. The effects of two non-pharmacologic pain management methods for intramuscular injection pain in children Persian. Acute pain 2006; 8(1): 7-12. [Persian]

از مدت زمان تأثیرکرم إملا (۴۵-۶۰ دقیقه) نسبت به زمان اسپری تبخیری که ۳۰ ثانیه بعد از استفاده اثربخشی دارد باشد. لذا می‌توان گفت جهت راحتی بیماران اسپری تبخیری ارجح تر خواهد بود. این ویژگی به خصوص در مدت زمان محدود از جمله مواردی که دسترسی به راه وریدی کودکان از موارد اورژانسی محسوب می‌شود، حائز اهمیت است. مطالعات Costello و همکاران (۲۰۰۶) و Farion و همکاران (۲۰۰۸) نشان دادند در گروه دریافت کننده اسپری بی‌حسی تبخیری شدت درد گزارش شده به وسیله مقیاس دیداری سنجش درد در محدوده حداقل درد بوده است.^{۵,۱۳} که در راستای نتایج پژوهش حاضر می‌باشد. با این تفاوت که در مطالعه Costello زمان استفاده از اسپری ۵ ثانیه و در مطالعه Farion ۱۰ ثانیه بود. همچنین Yoon و همکاران (۲۰۰۸) بیان کردند استفاده از یخ نسبت به اسپری تبخیری به طور قابل توجهی درد ناشی از تست پوستی را کاهش داده بود و درصد افزاد این پژوهش بخ را ترجیح داده بودند.^۷ احتمالاً اختلاف ذکر شده می‌تواند به نوع ابزار مورد استفاده در پژوهش مرتبط باشد، چرا که در این پژوهش از مقیاس دیداری به عنوان ابزار سنجش درد استفاده شده است و می‌تواند تحت تأثیر نظر شرکت کنندگان قرار گیرد.علاوه بر این نمردهای مقیاس توسط کودکان می‌تواند تحت تأثیر نداشتن زمان کافی جهت ارزیابی و تفکیک ناراحتی ناشی از احساس بد پوست خود از سرد شدن ناگهانی و درد ناشی از تزریق وریدی قرار گیرد. از سویی دیگر اسپری تبخیری یک دارو است و اضطراب ناشی از ذهنیت عوارض پوستی دارو نسبت به یخ از دید شرکت کنندگان خطای اندازه‌گیری را بیشتر می‌کند.

از جمله محدودیت‌های این پژوهش معیار قرار دادن گریه به عنوان سنجش شدت درد بود که یک معیار تک بعدی بوده و نمی‌تواند ایده آن باشد، اما چون یک روش عینی است دارای خطای اندازه‌گیری کمتری است. معیار سنجش درد بر اساس تغییر چهره و حرکات بدن اگرچه از حساسیت پیشتری برخوردار است، اما تحت تأثیر نظر فرد کنترل گر بوده و خطای

11. Bagheriyani S, Borhani F, Abbaszadeh A, Ranjbar H. The effects of regular breathing exercise and making bubbles on the pain of catheter insertion in school age children. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research* 2011; 16(2): 174-80. [Persian]
12. Minute M, Badina L, Cont G, Montico M, Ronfani L, Barbi E, et al. Videogame playing as distraction technique in course of venipuncture. *Medical and Surgical Pediatrics* 2012; 34(2): 77-83.
13. Costello M, Ramundo M, Christopher NC, Powell KR. Ethyl vinyl chloride vapocoolant spray fails to decrease pain associated with intravenous cannulation in children. *Clinical Pediatrics* 2006; 7(5): 432-628.
14. Zekavat OR, Samani SM, Nasibi S, Karimi M. Clinical Evaluation of the New Topical An-esthetic Formulation in β-Thalassemia Major Patients. *The Journal of Applied Research* 2009; 9(3): 63-70. [persian]
15. Koller D, Goldman RD. Distraction Techniques for Children Undergoing Procedures: A Critical Review of Pediatric Research. *Journal of Pediatric Nursing* 2012; 27(6): 652-81.
16. Alavi A, Zargham A, Abdi Yazdan Z, Nam Nabati M. The comparison of distraction and EMLA cream effects on pain intensity due to intravenous catheters in 5-12 years old Thalassemic children. *Shahrekhord University of Medical Sciences Journal* 2005; 9(3): 7-15. [Persian]
17. Vosoghi N, Chehrzad M, Abotalebi G, AtrkarRoshan Z. Effects of distraction on physiologic indices and pain intensity in children aged 3-6 undergoing IV injection. *The Journal of Tehran University of Medical Sciences* 2011; 16(3-4): 39-47. [Persian]
18. Pourmovahed Z, Salimie T, Dehghani K, Yassinie M, Shakiba M, Tavangar H, et al. Comparative study of the effect of music distraction and Emla cream on pain of the children during intravenous Cannulation. *Iran Journal of Nursing* 2008; 21(55): 47-54.
19. Noguchi L. The effect of music versus nonmusic on behavioral signs of distress and self-report of pain in pediatric injection patients. *Journal of Music Therapy* 2006; 43(1): 16-38.
20. Sadeghi T, Neishaburi M, Soleimani M, BahramiN. The effect of balloon inflating on venous opening pain in children. *The Journal of Qazvin University of Medical Sciences & Health Services* 2010; 14(3): 67-72. [Persian]
21. Robinson PA, Carr S, Pearson S, Frampton C. Lignocaine is a better analgesic than either ethyl chloride or nitrous oxide for peripheral intravenous cannulation. *Emergency Medicine Australasia* 2007; 19(5): 427-32.
22. Harris T, Cameron P, Ugoni A. The use of pre-cannulation local anaesthetic and factors affecting pain perception in the emergency department setting. *Emergency Medicine Journal* 2001; 18(3): 175-7.
23. Page DE, Taylor DM. Vapocoolantspray vs subcutaneous lidocaine injection for reducing the pain of intravenous cannulation: a randomized, controlled, clinical trial. *British journal of anaesthesia* 2010; 5(4): 519-25.
24. Sawyer J, Febbraro S, Masud S, Ashburn MA, Campbell JC. Heated lidocaine/tetracaine patch (Synera, Rapydan) compared with lidocaine/prilocaine cream (EMLA) for topical anaesthesia before vascular access. *British journal of anaesthesia* 2009; 102(2): 210-5.
25. Celik G, Ozbek O, Yilmaz M, Duman I, Ozbek S, Apiliogullari S. Vapocoolant spray vs lidocaine/prilocaine cream for reducing the pain of venipuncture in hemodialysis patients: a randomized, placebo-controlled, crossover study. *International Journal of Medical Sciences* 2011; 8(7): 623-7.
26. Waibel KH, Katial RK. Effect of topical vapocoolant spray on skin test wheal, flare, and pain responses. *Annals of allergy, Asthma & Immunology* 2005; 95(2): 149-53.
27. Yoon WY, Chung SP, Lee HS, Park YS. Analgesic pretreatmentfor antibiotic skin test: vapocoolant spray vs ice cube. *The American Journal of Emergency Medicine* 2008; 26(1): 59-61.
28. Hijazi R, Taylor D, Richardson J. Effect of topical alkane vapocoolant spray on pain with intravenous cannulation in patients in emergency departments: randomised double blind placebo controlled trial. *British Medical Journal* 2009; 3(38): 215.
29. Biran V, Gourrier E, Cimerman P, Walter- Nicolet E, Mitánchez D, Carballo R. Analgesic effects of emla cream and oral sucrose during venipuncture in preterm infants. *Pediatrics* 2012; 133(3): e666-e73
30. Hartstein BH, Barry JD. Mitigation of pain during intravenous catheter placement using a topical skin coolant in the emergency department. *Emergency Medicine Journal(EMJ)* 2008; 25(5): 257-61.
31. HamedTavassoli S, Alhani F, Hajizadeh E. Investigating of the effect of familiarization play on the injective procedural pain in b- thalassemicpre – school children. *Journal of Nursing and Midwifery* 2012; 5(10): 603-9. [Persian]
32. Markel S, Voepel-Lewis, T, Shayevitz, Jay R ,MalviyaS. The FLACC: A behavioral scale for scoring postoperative pain in young children. *Pediatric Nursing* 1997;23(3): 293-7.
33. Azgoli G, Aryamnsh Z, Majab F, AlaviMajd H. Inhale the fragrance of Peppermint effect on pain and anxiety first stage of labor in nulliparous women. *Qom, University of Medical Sciences Journal* 2013; 7(3):21-27.[Persian]

The effect of using anesthesia evaporative spray on pain intensity associated with intravenous injection in hospitalized children in Imam Reza Hospital in Sirjan

Mansoor Arab¹, Batool Tirkari², Farrukh Abazari³, Asiye Hadid⁴

1. Instructor, Infectious and Tropical Disease Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2. Assistant professor, Department of Nursing, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3. Assistant professor, Department of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
4. MSc in Nursing, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

Original Article

Medical - Surgical Nursing Journal, 2015; 4(1): 10-15.

ABSTRACT

Background and Objective: Intravenous injection is one of the most common painful invasive procedures in hospitalized children. This study was conducted aimed to determine the effectiveness of using anesthesia evaporative spray on pain intensity associated with intravenous injection in hospitalized children.

Materials and Method: In this clinical trial study 60 children between 6-12 years old who were hospitalized in Imam Reza Hospital in Sirjan in 2014 were studied. They were selected through convenience sampling and then were randomly assigned into two groups of 30 people. In the intervention group, anesthetic spray evaporation was used 30-40 seconds before intravenous injection and in the control group, the similar spray but containing saline was used. Pain intensity was assessed during the intervention through using the behavioral scale and immediately after the intervention by the visual analog scale. Data analysis was done through SPSS 19 and using central and dispersion indexes and independent t-test.

Results: The children in intervention group reported less pain intensity than control group in both scales. The mean score of behavioral pain scale and VAS in intervention group was respectively 3.4 ± 1.85 ($p = 0.002$) and 3.96 ± 2.39 ($p = 0.036$).

Conclusion: According to results, using the anesthesia evaporative spray can reduce the pain associated with injection procedures in children. Therefore; it is recommended that the evaporative spray used before the intravenous injection in children.

Correspondence:

Asiye Hadidi
Kerman University of
Medical Sciences

Email: Hadidi84lar@yahoo.com

Received: 14/07/2014

Accepted: 14/03/2015

Keywords: Anesthesia evaporative spray, children, pain, intravenous injection

Please cite this article as: Arab M, Tirkari B, Abazari F, Hadid A. The effect of using anesthesia evaporative spray on pain intensity associated with intravenous injection in hospitalized children in Imam Reza Hospital in Sirjan. Medical - Surgical Nursing Journal 2015; 4(1): 10-15.



Medical & Surgical Nursing Journal

Vol. 4, No. 1, 2015



Iranian Nursing Association

Owned and Published by: Zahedan University of Medical Sciences and Health Services, Nursing and Midwifery school

ISSN: 2322-178X

Online ISSN: 2322-4169

Islamic Guidance License No: 19191/90,
90.7.24

Director in Charge: Ali Navidian

Editor-in-Chief : Ali Navidian

Executive Manager: Fatiheh Kermansaravi

Deputy Editor: Fereshteh Najafi

Scientific & Literature Editor: Fereshteh Najafi

English Editor: Fariba Yaghoubinia

Jurnal Expert: Toktam kianian

Executive Expert & Site Manager: Mahdiye Rezaei

Editorial Board

Alhani F. (PhD), Associate Professor of Nursing, Tarbiat Modares Tehran.

Arababi-Sarjoo AA. (PhD), Assistant Professor of Nursing, Zahedan University of Medical Sciences.

Ebad A. (PhD), Associate Professor of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences.

Fallahi Khoshknab M. (PhD), Associate Professor of Nursing, University of Social welfare and Rehabilitation.

Imani M. (MD), Associate Professor of Pediatrics Diseases, Zahedan University of Medical Sciences

Kermansaravi F. (MSc), Assistant Professor of Nursing, Zahedan University of Medical Sciences.

Metanat M. (MD), Associate Professor of Infectious Diseases, Zahedan University of Medical Sciences.

Mehrdad N. (PhD), Associate Professor of Nursing, Tehran University of Medical Sciences.

Mohammadi I. (PhD), Professor of Nursing, Tarbiat Modares Tehran.

Moodi Z. (PhD), Assistant Professor of Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences.

Najafi F. (MSc), Instructor of Nursing, Zahedan University of Medical Sciences.

Navidian A. (PhD), Associate Professor of Councilor Family, Zahedan University of Medical Sciences.

Nikbakht Nasrabadi AR. (PhD), Professor of Nursing, Tehran University of Medical Sciences.

Rakhshani F. (PhD), Professor of Health Education, Zahedan University of Medical Sciences.

Roobbari M. (PhD), Associate Professor of Statistic, Tehran University of Medical Sciences

Sanadgol H. (MD), Associate Professor of Internal Medicine, Zahedan University of Medical Sciences.

Taheri M. (PhD), Associate Professor of Medical Genetic, Zahedan University of Medical Sciences.

Yaghmaei F. (PhD), Associate professor of nursing, Islamic Azad university Zanjan branch.

Yaghoubinia F. (PhD), Assistant Professor of Nursing, Zahedan University of Medical Sciences.

The referee of this issue

Ansari H. (PhD), Atashzade Shourideh F. (PhD), Dehghan M. Fallahi Khoshknab M. (PhD), Firouzkouhi MR. (PhD), Ghaljaei F. Kord Tamini B. (PhD), Navvabi-Rigi SH. Navidian A. (PhD), Noohi E. (PhD), Payandeh A. (PhD), Pishkar Mofrad Z. Rahnama M. (PhD), Sabzevari S. (PhD), Shahriari M. (PhD), Yaghoubinia F. (PhD), Zeighami R. (PhD)

Journal Scope: Nursing

Funded By: Zahedan University of Medical Sciences, Deputy Minister for Research and Technology with cooperation by Iranian Nursing Scientific Association

Reprinting of this publication is subject to citing the references, and all rights reserved.

Address: Medical & Surgical Nursing Journal, Mashahir Square, Zahedan Nursing and Midwifery School. P.O. Box: 98169-13396.

Tel: +98 54 33438473 fax: +98 54 33442481, email: ijmsn@zaums.ac.ir



Iranian Nursing Association

Medical– Surgical Nursing Journal

No 1 , Volume 4 , 2015 , ISSN : 2322-178X



ORIGI

- M e d i c a l S u r g i c a l N u r s i n g J o u r n a l
- ◀ Experience of living with Systemic Lupus Erythematosus: A phenomenological study 10
Fereshteh Mazhariazad, Heidar Ali Abedi, Seyed Ali Naji
 - ◀ The effect of using anesthesia evaporative spray on pain intensity associated with intravenous injection in hospitalized children in Imam Reza Hospital in Sirjan 16
Mansoor Arab, Batool Tirgari, Farrukh Abazari, Asiyeh Hadid
 - ◀ The relationship between sexual satisfaction and quality of life in patients with acute coronary syndrome 23
Mohsen Taghadosi, Leila Ghanbari Afra, Hamid Reza Gilasi, Monireh Ghanbari Afra, Zahra Taheri Kharami
 - ◀ The effect of the sedation protocol on the level of consciousness in ventilator-dependent trauma patients hospitalized in Intensive Care Unit(ICU) 31
Ebrahim Ebrahimi Tabas, Aliakbar Keykha, Abbas Abbaszadeh, Hosein Rafiei, Hasan Enayati, Bibi Mahdieh Khodadadi Hoseini, Fariba Borhani
 - ◀ Effect of continuous care model on sleep quality and dialysis adequacy of hemodialysis Patients: a clinical trial study 39
Mohsen Hojat, Mahdi Karimyan Jahromi, Zahra Karami
 - ◀ The level of observing standard tracheostomy care and some barriers from perspective of nurses 46
Zahra Mosazade Sari, Marzie Maleki, Foroozan Atashzadeh Shoorideh, Yadolah Mehrabi
 - ◀ Comparison the effect of two ways of tube feeding including bolus and continuous infusion on gastric residual volume and diarrhea in patients hospitalized in Intensive Care Unit 53
Mohsen Shahriari, Ehsaneh Rezaei
 - ◀ Effect of wives group training on activities of daily living and quality of life in male patients with spinal cord injury 59
Kahrazei Farhad, Mirshekar Tahereh