



انجمن علمی پرستاری ایران

# فصلنامه پرستاری داخلی و جراحی



دوره ۴، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴

آدرس سایت مجله: <http://www.ijmsn.ir>

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده پرستاری و مامایی  
دارای رتبه علمی پژوهشی از یکصد و دهمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره ۱۰۰/۵۰۷ مورخ ۹۲/۳/۲۷

جانشین سردبیر: فرشته نجفی	شماره استاندارد بین المللی نشریه: ۱۷۸۸-۲۳۲۲
ویراستار علمی و ادبی: فرشته نجفی	شماره شاپا الکترونیکی: ۴۱۶۹-۲۳۲۲
ویراستار انگلیسی: دکتر فربیا یعقوبی نیا	شماره مجوز ارشاد اسلامی: ۹۰/۷/۲۴، ۱۹۱۹۱/۹۰
کارشناس مجله: تکتم کیانیان	مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی نویدیان
کارشناس اجرایی و مدیر پایگاه: مهدیه رضایی	مدیر اجرایی: فتحیه کرمان ساروی

## اسامي هیئت تحریريه(به ترتیب حروف الفبا)

فتیحه کرمان ساروی: استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  
دکتر نگین مسعودی علوی: استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان  
دکتر زهرا مودی: استادیار امامی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  
دکتر رضا نگارنده: استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران  
دکتر علی نویدیان: دانشیار مشاوره خانواده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  
فرشته نجفی: مریم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  
دکتر فربیا یعقوبی نیا: استادیار پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دکتر فضل الله احمدی: استاد پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران  
دکتر حسین انصاری: استادیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  
دکتر مریم رسولی: دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران  
دکتر علی ضرغام: استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر عباس عبادی: دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران  
دکتر عباس زاده: استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران  
دکتر مسعود فلاحت خشکناب: دانشیار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

## اسامي داوران اين شماره (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر فروزان آتش زاده شوریده، دکتر حسین انصاری، دکتر فربیا برهانی، زهرا پیشکار مفرد، مهلاقا دهقان، دکتر مریم رسولی، دکتر نسرین رضایی، دکتر ناهید رژه، دکتر سکینه سبزواری، دکتر رضا ضیغیمی، دکتر فاطمه غیاثی، دکتر محمد رضا فیروزکوهی، دکتر فرشته قلچایی، محدثه محسن پور، مهین نادریفر، شهین دخت نوابی ریگی، دکتر فربیا یعقوبی نیا

حیطه تخصصی: پرستاری

حمایت علمی و تامین اعتبارات مالی مجله: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، با همکاری انجمن علمی پرستاری ایران استفاده از مطالب نشریه با ذکر منابع بلامانع می‌باشد.

این مجله در پایگاه‌های اینترنتی زیر نمایه می‌گردد:

ISC, Iran Medex, Magiran, SID, Google Scholar

آدرس: زاهدان، میدان مشاهیر، دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، کد پستی: ۹۸۱۶۹۱۳۳۹۶

Email: [ijmsn@zaums.ac.ir](mailto:ijmsn@zaums.ac.ir)      تلفن: ۰۵۴-۳۳۴۴۲۴۸۱      نامبر: ۰۵۴-۳۳۴۳۸۴۷۳

# میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان

کبری امیدی<sup>۱</sup>، فروزان آتش زاده شوریده<sup>۲</sup>، اعظم شیرین آبادی فراهانی<sup>۳</sup>، باقر پهلوان زاده<sup>۴</sup>، لیلا خانعلی مجن<sup>۵</sup>

## مقاله پژوهشی

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۲. استادیار، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۳. مریم، دانشجوی دکترای پرستاری، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۴. دانشجوی دکترای تخصصی، گروه آمار زیستی، دانشکده پرایپرسکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

فصلنامه پرستاری داخلی - جراحی، سال چهارم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴، صفحات ۳۲-۲۴

## چکیده

**زمینه و هدف:** پذیرش نوزاد در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان با عوارض زیادی همراه است. یکی از راهکارهای کاهش عوارض، ارایه مراقبت‌های پرستاری مطابق با استانداردهای پذیرش است. این مطالعه به منظور تعیین میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.

**مواد و روش‌ها:** در پژوهش توصیفی مقطعی حاضر، ۲۶۷ مورد مراقبت پرستاری حین پذیرش در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان‌های آموزشی منتخب شهر قزوین در سال ۱۳۹۳ با روش نمونه‌گیری از رویداد سه‌میهای مورد مشاهده قرار گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی نوزادان بستره و پرستاران شاغل، همچنین فهرست وارسی مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد، جمع‌آوری شدند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی تحت نرم افزار آماری SPSS ۲۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری با استانداردها برابر با ۵۱ درصد بود. ۳۶/۸۴ درصد مراقبت‌ها مطلوب، ۱۴۰/۰۳ درصد متوسط و ۴۹/۱۲ درصد مراقبت‌ها ضعیف ارایه می‌شد.

**نتیجه‌گیری:** با توجه به یافته‌ها، عملکرد پرستاران در خصوص مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش در مقایسه با استانداردها در سطح متوسطی قرار داشت. به منظور ارتقای کیفیت مراقبت‌ها، به کارگیری راهنمای بالینی مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد و نظارت بالینی مدیران پرستاری بر حسن اجرای آن‌ها پیشنهاد می‌شود.

**کلیدواهدها:** مراقبت پرستاری، پذیرش، نوزاد، استاندارد

نویسنده مسؤول:

فروزان آتش زاده شوریده  
دانشگاه علوم پزشکی شهید  
بهشتی

پست الکترونیک:

f\_atashzadeh@sbmu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۹۴/۰۱/۲۷

تاریخ پذیرش: ۹۴/۰۳/۳۰

## مقدمه

نیز معمولاً منجر به جدایی و فرصلهای محدود برای مادر و نوزاد جهت اتصال و پیوند می‌شود.<sup>۷</sup> نوزادانی که در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان پذیرش می‌شوند و از مادران جدا می‌مانند، در معرض بیشترین خطر اختلال دلستگی با مادر هستند.<sup>۸</sup>

والدین نیز حین پذیرش نوزاد در بخش، دارای نیازهایی از قبیل نیاز به اطلاعات، آموزش و ارتباط مناسب هستند و همواره اطلاعات را جهت کاهش اثر عاطفی پذیرش نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه جستجو می‌کنند. جستجوی اطلاعات یک راه در گیر شدن در مراقبت از نوزاد است و می‌تواند حس کنترل و مسئولیت والدین را تقویت کند. عواملی مانند آموزش به والدین، در کد نگرانی‌ها و عوامل تنفس‌زا، رفتار حاکی از علاقه و توجه و دقت پرستار سبب می‌شوند تا مراقبتی با کیفیت بالاتر به هنگام پذیرش نوزاد ارایه شود.<sup>۹</sup> اداره سلامت نوزادان از سال ۱۳۸۵ در راستای اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد که سر لوحه آن کاهش کودکان زیر پنج سال تا سال ۲۰۱۵ به میزان دو سوم می‌باشد، سعی نموده به منظور اعたلی

میزان مرگ‌ومیر نوزادان یک شاخص استاندارد جهت توسعه مراقبت بهداشتی، آموزشی و اجتماعی یک کشور می‌باشد و پرداختن به امر سلامت نوزادان از ضروریات امور بهداشتی محسوب می‌شود. هر سال تقریباً ۱۵-۲۰ درصد نوزادان در بخش مراقبت ویژه نوزادان پذیرش می‌شوند و این پذیرش‌ها معمولاً غیر قابل پیش‌بینی هستند.<sup>۱</sup> پذیرش نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان با آسیب‌های زیادی همراه است؛<sup>۲</sup> چرا که رویه‌های تهاجمی در دنارک، به طور مکرر بر روی نوزادان بستری انجام می‌شوند.<sup>۳</sup> مراقبت از این نوزادان آسیب‌پذیر در زمان پذیرش به دلیل شرایط خاص مانند هیپوترمی، ذخایر کم نتری و کمبود سورفکتانت (Surfactant) بفرنج تر می‌شود.<sup>۴</sup> تقریباً ۶۶ تا ۹۳ درصد نوزادان با وزن بسیار کم هنگام تولد و درجه حرارت پایین بدن در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان پذیرش می‌شوند.<sup>۵</sup> این در حالی است که هیپوترمی در زمان پذیرش، خود با افزایش بیماری و مرگ‌ومیر نوزادان نارس همراه است.<sup>۶</sup> پذیرش مستقیم نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه

استفاده از مقالات پژوهشی معتبر ایران و جهان، پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ و کتب مرجع استانداردهای خدمات پرستاری ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ که در رابطه با مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزادان در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان بودند، گردآوری شد.<sup>۱۷</sup>

جهت تعیین روایی فهرست وارسی پذیرش، از روش بررسی روایی صوری و محتوا استفاده شد. فهرست وارسی پذیرش نوزاد پس از طراحی و تدوین بر اساس متون، توسط ۱۰ نفر از متخصصین و اعضای هیئت‌علمی پرستاری و تیم پژوهش، مورد قضاوت و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد.

شاخص روایی محتوا فهرست وارسی پذیرش نوزاد برابر با ۰/۹۴ بود.

جهت بررسی پایایی فهرست وارسی پذیرش نوزاد از روش توافق بین مشاهده‌گران استفاده شد. به این منظور فهرست وارسی پذیرش نوزاد در اختیار مشاهده‌گر دوم که از نظر دقت عمل، مهارت، دانش و آگاهی همانند پژوهشگر (پرستار بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان با ۶ سال سابقه کاری) بود، قرار داده شد. دو مشاهده‌گر فهرست وارسی پذیرش نوزاد را برای ۱۰ مراقبت، هم‌زمان تکمیل کرده و ضریب همبستگی میان مشاهدات آنها برابر با ۰/۹۷ بدلست آمد.

فهرست وارسی پذیرش نوزاد دارای نمره کل ۱۱۴ بوده و در هر عبارت برای سنجش مطابقت اجرای هر مراقبت با استاندارهای حین پذیرش، با مقیاس بله درست انجام می‌شود (نمره ۲)، بله درست انجام نمی‌شود (نمره ۱) و خیر (نمره صفر) سنجیده شد. با توجه به مقدار فراوانی، نمره کل مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد از صفر تا ۱۰۰ درصد بود که در سه گروه ۳۳-۳۴-۶۷ درصد (مراقبت ضعیف)، ۶۷-۶۸ درصد (مراقبت متوسط) و ۶۸-۱۰۰ درصد (مراقبت مطلوب) طبقه‌بندی شد.

به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی از ذکر نام بیمارستان‌ها در بیان نتایج پژوهش خودداری گردید و در رابطه با محترمانه ماندن اطلاعات به مسوولین اطمینان داده شد. به منظور جمع‌آوری اطلاعات، پس از اخذ رضایت‌نامه کتبی از مسوولین، رضایت‌ماکز منتخب نیز اخذ گردید. سپس پژوهشگر با در دست داشتن فهرست وارسی پذیرش، روزانه در سه شیفت صبح، عصر و شب به بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان مراجعه کرده و مشاهده‌ای ساختاریافته بر اساس فهرست وارسی پذیرش نوزاد از ارایه مراقبت‌هایی که در رابطه با پذیرش نوزاد انجام می‌شود، به عمل آورد و نتیجه مشاهدات به صورت انتخاب گزینه‌های فهرست وارسی ثبت شد. تمام مشاهدات توسط یک نفر (پژوهشگر) انجام شد. پژوهشگر جهت کنترل این امر در تمام طول شیفت در بخش حضور داشته و با توجه به رویداد، چک لیست را تکمیل می‌نمود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحت نرم‌افزار آماری spss ۲۱ انجام شد.

### یافته‌ها

۷۰/۸ درصد نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان دارای سن جنینی زیر ۳۷ هفته بودند و اکثرًا ۷۷/۳ (درصد) به روش سزارین متولد

سلامت و کاهش مرگ و میر دوره نوزادی، بهبود کیفیت ارایه خدمات مراقبتی به نوزاد را در اولویت کارهای خود قرار دهد. کیفیت مراقبت از نوزاد به استقرار واحد مراقبت ویژه از نوزاد، حسابرسی منظم و ارزیابی خدمات ارایه شده بستگی دارد.<sup>۱۰</sup>

حسابرسی یکی از مؤلفه‌های مهم برنامه حاکمیت بالینی و یک فرایند ارتقا کیفیت است که با هدف بهبود کیفیت خدمات و مراقبت‌های ارایه شده به بیماران و نتایج حاصل از آن صورت می‌گیرد و این عمل را از طریق مرور نظاممند وضعیت موجود و مطابقت آن‌ها با استانداردهای صریح و روشن و Hubbard and Haines (۲۰۰۶) پیشنهاد شده است که میزان مطابقت مراقبت‌های مرتبط با پذیرش نوزاد در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان به عنوان بخشی از موضوعات بررسی کیفیت خدمات پرستاری انجام شود.<sup>۱۲</sup> با مروری بر مطالعات تا زمان انجام پژوهش کنونی، مطالعه‌ای در زمینه بررسی میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری مرتبط با پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش مراقبت‌های ویژه، یافت نشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد با استانداردها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.

### مواد و روش‌ها

این مطالعه توصیفی مقطعی در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان‌های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ابتدای مرداد ماه تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۳ انجام شد. در این مطالعه به سه گام اول حسابرسی (تهیه استانداردهای مراقبتی، تعیین وضعیت موجود و مقایسه آن با استانداردها) پرداخته شد.<sup>۱۱</sup> کلیه مراقبت‌های پرستاری مرتبط با پذیرش نوزاد، جامعه پژوهش کنونی را تشکیل دادند. بر اساس بررسی متون و با توجه به این که مطالعه‌ای در این خصوص یافت نشد، حجم نمونه لازم در سطح اطمینان ۹۵ درصد و حداقل خطای برآورد ۰/۰۶ بر اساس فرمول حجم نمونه  $Z_{\alpha/2}^2 - Z_1^2 = \frac{4}{n}$  مراقبت به دست آمد.

مورد مراقبت به شیوه نمونه‌گیری از رویداد سهمیه‌ای انتخاب شدند. در نمونه‌گیری از رویداد، مشاهده از واقع و رخدادهای خاص مربوط به مطالعه انجام می‌شود که به داشت پژوهشگر نسبت به موقعیت و شرایط خاصی که رویداد مورد نظر در آن شرایط اتفاق می‌افتد، وابسته است.<sup>۱۴</sup> بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان دو بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان محیط پژوهش انتخاب شدند. به منظور تعیین حجم نمونه از دو بیمارستان؛ ابتدا میانگین تعداد نوزادان پذیرش شده در هر بیمارستان مشخص و سپس با استفاده از نمونه‌گیری سهمیه‌ای از هر بیمارستان، تعداد نوزادان و مراقبت‌ها تعیین شد. به این ترتیب ۲۰۰ مراقبت از بیمارستان الف و ۶۷ مراقبت باقیمانده از بیمارستان ب انتخاب شدند.

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی نوزادان بستری و پرستاران شاغل و نیز فهرست وارسی عبارتی مراقبت‌های پرستاری به روش استاندارد حین پذیرش نوزادان در بخش‌های مراقبت ویژه بود که با

مانیتور متصل می‌نمودند، سطح اشاع اکسیژن نوزاد را اندازه‌گیری می‌نمودند، تزریق آمپول ویتامین k و واکسن هپاتیت B را طبق دستور پزشک انجام می‌دادند، آزمایشات درخواستی پزشک را ارسال و جذب و دفع نوزاد را کنترل می‌نمودند. در ۹۹ درصد موارد، تجهیزات مورد نیاز نوزاد قبل از استفاده گرم نشده بود و در ۹۱ درصد موارد دست‌ها قبل از تماس با نوزاد شسته نشده بود. همچنین در ۱۰۰ درصد موارد جهت انجام مراقبت‌های پرستاری، از والدین نوزاد رضایت اخذ نشده و در یک ساعت اول پذیرش، علایم حیاتی نوزاد هر ۱۰ دقیقه کنترل نشده بود.

شده بودند. ۴۹/۱ درصد نوزادان وزنی کمتر از ۲ کیلوگرم داشتند و ۴۷/۲ درصد فرزند اول خانواده بودند و ۴۰/۸ درصد نوزادان از اتفاق عمل پذیرش شده بودند. سایر ویژگی‌های فردی نوزادان پذیرش شده و ۵۰ پرستار زن شاغل در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در جدول ۱ ارایه شده است. میزان مطابقت اجرای مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش در بخش‌های مراقبت‌های ویژه نوزادان با استانداردها برابر با ۵۱ درصد بود که بیانگر عملکرد متوسط پرستاران در امر مراقبت پرستاری است (جدول ۲). در مجموع ۳۶/۸۴ درصد مراقبت‌ها مطلوب، ۱۴/۰۳ درصد متوسط و ۴۹/۱۲ درصد مراقبت‌ها ضعیف ارایه می‌شد.

جدول ۳ نشان می‌دهد پرستاران در ۱۰۰ درصد موارد نوزاد را تحت مانیتورینگ قلی ریوی قرار می‌دادند، پرورب پالس اکسی‌متر را به نوزاد و

جدول ۱: ویژگی‌های فردی مشاخصه‌کنندگان

متغیر	تعداد (درصد)
سن (روز)	۰-۱ (۲۲۴ (۸۳/۹۰))
نوزادان	۲-۷ (۱۸ (۶/۷۴))
جنسیت	۸-۱۴ (۱۱ (۴/۱۲))
شیفت پذیرش نوزاد	>۱۴ (۱۴ (۵/۲۴))
پرستاران	دختر (۱۱۳ (۴۲/۳۲))
نوع شیفت کاری	پسر (۱۵۴ (۵۷/۶۸))
سن (سال)	صبح (۶۱ (۲۲/۸))
سابقه کاری (سال)	عصر (۱۰۲ (۳۸/۲))
سابقه کاری (سال)	شب (۱۰۴ (۳۹))
میزان تحصیلات	کارشناسی ارشد (۴۸ (۹۶))
گذراندن دوره‌های آموزشی	بلی (۲ (۴))
مراقبت ویژه نوزادان	خریر (۴۷ (۹۴))
پرستاران	صبح (۲ (۴))
سن (سال)	در گردش (۴۷ (۹۴))
سابقه کاری (سال)	شب (۱ (۲))
میزانگین $\pm$ انحراف معیار	میانگین $\pm$ انحراف معیار (۳۲/۰۲ $\pm$ ۶/۲۶)
میزانگین $\pm$ انحراف معیار	میانگین $\pm$ انحراف معیار (۶/۶۲ $\pm$ ۵/۳۳)

جدول ۲: میزان مطابقت مراقبت‌های پرستاری میان پذیرش با استانداردها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان

پذیرش در مقایسه با استانداردها	تعداد (درصد)	اجرای مراقبت‌های پرستاری حین
بلی	درست (۶۸۲۵ (۴۵/۵۴))	
خریر	نادرست (۱۶۸۰ (۱۱/۲))	
جمع	انجام نمی‌شود (۶۴۸۳ (۴۳/۲۶))	
درصد نمره کل	۱۴۹۸۸ (۱۰۰)	

جدول ۱۳: توزیع فراوانی مراقبت‌های پرستاری مین پذیرش مطابق با فهرست وارسی پذیرش نوزاد در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان

				اجرای مراقبت‌های پرستاری
				بلی
				خیر
درست انجام نمی‌شود				درست انجام نمی‌شود
تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)
۵ (۱)	۱۹۰ (۷۲)	۷۲ (۲۶)		تجهیزات مورد نیاز نوزاد را آماده می‌کند.
۲۶۶ (۹۹)	۰ (۰)	۱ (۱)		تجهیزات مورد نیاز نوزاد را قبل از استفاده گرم می‌کند.
۴ (۱)	۸ (۳)	۲۵۵ (۹۶)		وارمر را بر روی مد خود کنترل و دمای تنظیم ۳۶/۵ می‌کند.
۱۹۵ (۷۳)	۵۸ (۲۲)	۱۴ (۵)		دستگاه ساکشن را کنترل و آماده می‌کند.
۲۶۷ (۱۰۰)	۰ (۰)	۰ (۰)		ثواباف را کنترل و آماده می‌کند.
۵۸ (۲۲)	۱۹۶ (۷۳)	۱۳ (۵)		و تیلارور را کنترل و STAND BY می‌کند.
۲۴۴ (۹۱)	۱۶ (۶)	۷ (۳)		دست‌ها را قبل از تماس با نوزاد می‌شوید.
۱۹۳ (۷۲)	۱۰ (۴)	۶۴ (۲۴)		خود را به اعضاء خانواده نوزاد معروف می‌کند.
۲۶ (۱۰)	۱۵۰ (۵۶)	۹۱ (۳۴)		هنگام پذیرش نوزاد به منظور کاهش اضطراب والدین با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند.
۲۶۷ (۱۰۰)	۰ (۰)	۰ (۰)		جهت انجام مراقبت‌های پذیرش از والدین رضایت می‌گیرد.
۱۱۵ (۱۰۰)	۰ (۰)	۰ (۰)		نوزادانی که از خانه، بخش نوزادان و مراکز دیگر پذیرش می‌شوند را از نوزادان دیگر در NICU ایزوله می‌کند.
۶۷ (۲۵)	۰ (۰)	۲۰۰ (۷۵)		دستبند مشخصات نوزاد را کنترل می‌کند.
۶۸ (۲۶)	۰ (۰)	۱۹۹ (۷۴)		بعد از چک مجدد برچسب با مشخصات نوزاد، آن را به هر دو مج پای نوزاد و یک دست می‌بندد.
۲۶۷ (۱۰۰)	(۰)۰	۰ (۰)		از والدین می‌خواهد تا تایید دستبند شناسایی نوزاد را در پرونده به صورت کمی ثبت و امضا نمایند.
۰ (۰)	۰ (۰)	۲۶۷ (۱۰۰)		دستور کمی پذیرش نوزاد را دقیق کنترل می‌کند.
۶ (۲)	۱۸ (۷)	۲۴۳ (۹۱)		نوزاد را تحت یک وارمر تابشی که از قبل گرم شده قرار می‌دهد.
۹۲ (۳۴)	۲ (۰/۱)	۱۷۳ (۶۵/۹)		بعد از قراردادن نوزاد زیر وارمر پوشش نوزاد را بر می‌دارد.
۷ (۲)	۷۰ (۲۶)	۱۹۰ (۷۲)		پروب کنترل درجه حرارت پوست را در قسمت کاری شکم، ترجیحاً روی کبد قرار می‌دهد.
۲۶۷ (۱۰۰)	۰ (۰)	۰ (۰)		محیط را از نظر دمای خنثی کنترل می‌کند.
۲۶۷ (۱۰۰)	۰ (۰)	۰ (۰)		تلفون پلاستیکی را تحت وارمر قرار می‌دهد.
۲۶۷ (۱۰۰)	۰ (۰)	۰ (۰)		درجه حرارت آگزیلاری نوزاد را هر ۱۰ دقیقه در یک ساعت اول کنترل می‌کند.
۰ (۰)	۰ (۰)	۲۶۷ (۱۰۰)		نوزاد را تحت مانیتورینگ قلبی ریوی قرار می‌دهد.
۰ (۰)	۰ (۰)	۲۶۷ (۱۰۰)		پروب پالس اکسی متر را به نوزاد و مانیتور متصل می‌کند.
۰ (۰)	۰ (۰)	۲۶۷ (۱۰۰)		سطح اشباع اکسیژن نوزاد را اندازه گیری می‌کند.
۲۶۷ (۱۰۰)	۰ (۰)	۰ (۰)		میزان $\text{SpO}_2$ را در نوزاد کمتر از ۲۹ هفته در محدوده ۸۷-۸۹ درصد، در نوزاد ۳۲-۲۹ هفته در محدوده ۹۰-۹۲ درصد تنظیم می‌کند.
۲۶۷ (۱۰۰)	۰ (۰)	۰ (۰)		لیدهای قلب را بازیل آبی به قفسه سینه نوزاد دور از منطقه گرافی ریه و به مانیتور وصل می‌کند.
۲۶۷ (۱۰۰)	۰ (۰)	۰ (۰)		محدوده آلام مانیتورینگ را با توجه به وضعیت نوزاد و تا ۲۰٪ حد بالا و پایین تنظیم می‌کند.
۱۹ (۷)	۲ (۰)	۲۴۶ (۹۳)		کاف فشار خون را در اندام دارای پروب پالس اکسی متر نمی‌بندد.
۲۶۷ (۱۰۰)	۰ (۰)	۰ (۰)		فشار خون را هر ۱۰ دقیقه در یک ساعت اول کنترل می‌کند.
۱۴۴ (۵۴)	۱۰۳ (۳۹)	۲۰ (۷)		معاینه فیزیکی را انجام می‌دهد.
۷۵ (۲۸)	۰ (۰)	۱۹۲ (۷۲)		به هنگام پذیرش، نوزاد را وزن می‌کند.

## ادامه جدول ۳

۵۳ (۲۰)	۵۸ (۲۲)	۱۵۶ (۵۸)	پوشش نوزاد را در زمان گرفتن وزن، رعایت می کند.
۲۱۳ (۸۰)	۱۸ (۷)	۳۶ (۱۳)	مقدار وزن را روی برگه چارت در پرونده ثبت می کند.
۹۹ (۳۸)	۲۰ (۷)	۱۴۸ (۵۵)	دور سر نوزاد را اندازه گیری می کند.
۶۹ (۲۶)	۳۶ (۱۳)	۱۶۲ (۶۱)	اندازه دور سر نوزاد را در پرونده ثبت می کند.
۹۲ (۳۴)	۵ (۲)	۱۷۰ (۶۴)	قد نوزاد را اندازه گیری می کند.
۷۱ (۲۷)	۳۵ (۱۳)	۱۶۱ (۶۰)	اندازه قد نوزاد را در پرونده ثبت می کند.
۰ (۰)	۰ (۰)	۲۶۷ (۱۰۰)	اگر آمپول ویتامین ک و واکسن هپاتیت B تزریق نشده، طبق دستور پزشک تزریق را انجام می دهد.
۲۶۷ (۱۰۰)	۰ (۰)	(۰)	تعداد وریتم تنفس نوزاد راهر ۱۰ دقیقه در یک ساعت اول کنترل می کند.
۲۶۷ (۱۰۰)	۰ (۰)	(۰)	تعداد وریتم ضربان قلب نوزاد راهر ۱۰ دقیقه در یک ساعت اول کنترل می کند.
۰ (۰)	۰ (۰)	۲۶۷ (۱۰۰)	آزمایشات دستور داده شده توسط پزشک را ارسال می کند.
۰ (۰)	۴ (۱/۵)	۲۶۳ (۹۸/۵)	مسیر وریدی محیطی برای نوزاد برقرار می کند.
۰ (۰)	۰ (۰)	۲۶۷ (۱۰۰)	درصورت عدم موقیت رگ گیری نوزاد بعد از ۲ بار، این کار را به همکار مجرب خود محول می کند.
۰ (۰)	۰ (۰)	۲۶۷ (۱۰۰)	در صورت دستور تزریق آنتی بیوتیک پرستار با حضور پرستار دیگر پس از گرفتن نمونه کشت خون، اولین دوز را به نوزاد تزریق می کند.
۲۰۰ (۷۵)	۰ (۰)	۶۷ (۲۵)	برای انفوژیون دارو و سرم از پمپ انفوژیون استفاده می کند.
۰ (۰)	۰ (۰)	۲۶۷ (۱۰۰)	جدب و دفع نوزاد را کنترل می کند.
۰ (۰)	۰ (۰)	۲۶۷ (۱۰۰)	نوزاد را در سیستم کامپیوتر پذیرش می کند.
۰ (۰)	۰ (۰)	۲۶۷ (۱۰۰)	مشخصات پذیرش نوزاد را در دفتر پذیرش ثبت می کند.
۶ (۲/۵)	۲۸ (۱۰/۵)	۲۳۳ (۸۷)	به والدین اجازه می دهد که نوزادشان را در بخش در اولین زمان ممکن بعد از پذیرش ملاقات کنند.
۲۶۴ (۹۹)	۱ (۰/۳)	۲ (۰/۷)	در زمان ملاقاتات با والدین ضمن خوش آمد گویی، محل جغرافیایی بخش، تسهیلات آن و کارکنان را به آنان معرفی می کند.
۵۳ (۲۴)	۱۷۱ (۶۴)	۳۳ (۱۲)	والدین را از شرایط نوزاد و آخرین اطلاعات مطلع می کند.
۲۹ (۱۱)	۹۲ (۳۴)	۱۴۶ (۵۵)	به هنگام پذیرش به مادر نحوه دوشیدن شیر، ذخیره سازی، آماده سازی و مزیت شیر مادر را آموخت می دهد.
۵۱ (۱۹)	۱۵۲ (۵۷)	۶۴ (۲۴)	شستن دست را به والدین آموخت می دهد.
۱۱ (۴)	۵۶ (۲۱)	۲۰۰ (۷۵)	پوشیدن گان و روکشی را به والدین آموخت می دهد.
۲۲۲ (۸۳)	۳۱ (۱۲)	۱۴ (۵)	تماس پوست به پوست را به والدین آموخت می دهد.
۲۵۵ (۹۵)	۷ (۳)	۵ (۲)	پس از دادن آموخت به والدین، ارزشیابی انجام می دهد.
۰ (۰)	۱۴۳ (۵۴)	۱۲۴ (۴۶)	مراقبت های پذیرش را در پرونده نوزاد به طور کامل و دقیق ثبت می کند.

## بحث

گزارش نویسی،<sup>۲۱</sup> اجرای دستورات دارویی،<sup>۲۲</sup> وضعیت انتقال درون بیمارستانی نوزادان،<sup>۲۳</sup> فتوتایپی،<sup>۲۴</sup> مراقبت از خون (هموویژلانس)، در سطح متوسطی نشان دادند.<sup>۲۵</sup> همسو بودن یافته های پژوهش کنونی با یافته های پژوهش های مذکور، حاکی از وجود ضعف در ارایه مراقبت در بخش مراقبت ویژه نوزادان است. به نظر می رسد کمبود نیروی پرستاری به خصوص در شیفت های عصر و شب، عدم آگاهی پرستاران نسبت به دستورالعمل ها، در دسترس نبودن دستورالعمل های استاندارد و عدم کنترل و نظارت دقیق مدیران پرستاری می تواند از علل عملکرد متوسط پرستاران باشد. لذا لازم

میزان مطابقت مراقبت های پرستاری حین پذیرش نوزادان بسته در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان با استانداردها برابر با ۵۱ درصد بود که بیانگر عملکرد متوسط پرستاران در امر مراقبت حین پذیرش نوزادان است. در مطالعه جالو و همکاران (۱۳۸۷)<sup>۲۶</sup> کلیه مراقبت های پرستاری نوزادان مبتلا به سندروم دیسترنس تنفسی بسته در بخش های مراقبت ویژه نوزادان در سطح متوسط اجرا می شدند.<sup>۲۷</sup> در مطالعه نجفی بور (۱۳۹۱)<sup>۲۸</sup> نیز انطاق مراقبت ها با استانداردهای موجود در سطح متوسطی قرار داشت.<sup>۲۹</sup> یافته های مطالعات متعدد، عملکرد پرستاران را در زمینه های تغذیه نوزادان نارس،<sup>۳۰</sup>

یافته‌های مطالعه حاضر همچنین نشان داد که در اغلب موارد، دست‌ها قبل از تماس با نوزاد شسته نشده بودند و در برخی موارد نیز در صورت شستشو، این کار به درستی انجام نشده بود. در این راستا نتایج مطالعه ارشدی استان آباد و همکاران<sup>(۳)</sup> نشان داد که بیشترین موانع رعایت بهداشت دست، به ترتیب اعتقاد به بهداشت دست، نوع نگرش به تاثیر بهداشت دست در کنترل عفونت، تعداد زیاد نوزادان بستری در بخش، نبود دستمال کاغذی، حجم کاری بالا، عدم رعایت بهداشت دست توسط سرپرستار و پزشکان بودند.<sup>۳۱</sup> بر اساس نتایج پژوهش زنده و بروز (۱۳۹۱) کمترین مواردی که در بهداشت دست رعایت می‌شد، شست و شوی دست‌ها با آب و صابون قبل و بعد از مراقبت و شست و شوی دست‌ها پس از خروج دستکش از دست بود.<sup>۳۲</sup> که با یافته‌ی حاصل از پژوهش حاضر همسو است. در پژوهش‌های انجام شده در آمریکا<sup>۳۳</sup> و هنگ کنگ،<sup>۳۴</sup> میزان رعایت بهداشت دست در حد متوسط بود؛ در حالی که در پژوهش فرنیا و همکاران (۱۳۸۱)، پرستاران و پزشکان به ترتیب ۱۵ درصد و صفر درصد اقدام به شستن دست کردند<sup>۳۵</sup> و در پژوهشی که توسط Asare و همکاران (۲۰۰۹) در غنا انجام گرفت، میزان رعایت بهداشت دست‌ها توسط پزشکان و پرستاران در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان ضعیف بود.<sup>۳۶</sup> غفلت و عدم توجه به این مهم را شاید بتوان به حجم کاری زیاد کارکنان، تعداد زیاد بیماران تحت مراقبت، شرایط کار اورژانسی، ضرورت سرعت عمل بالا برای ارایه مراقبت و آگاهی اندک در مورد اهمیت دست‌شستن و عدم کنترل و نظارت مناسب بر عملکرد کارکنان نسبت داد.

با توجه به یافته‌های این مطالعه، در اغلب موارد تماس پوست به پوست به والدین آموزش داده نشده بود. متأسفانه مطالعه‌ای در این رابطه یافت نشد؛ اما در مورد پیامدهای این تماس، مطالعه کریمی و همکاران (۱۳۹۲) نشان داد که تماس پوستی مادر و نوزاد، میزان دلیستگی مادری را افزایش و میزان اضطراب مربوط به نوزاد را کاهش می‌دهد.<sup>۳۷</sup> از طرفی در پژوهش Srivastava و همکاران (۲۰۱۴) مشخص گردید که تماس پوست به پوست مادر و نوزاد، موجب تقویت مکیدن نوزاد، رضایت مادر و کنترل درجه حرارت و وزن نوزادان می‌شود.<sup>۳۸</sup> بنابراین، عدم لمس نوزاد توسط والدین و عدم آموزش مناسب این مساله، می‌تواند اثرات نامطلوبی بر سلامتی مادر و نوزاد به همراه داشته باشد.

نتایج مطالعه حاضر، کم توجهی و غفلت پرستاران نسبت به اهمیت مراقبت خانواده محور و تاکید بر جلب مشارکت اعضای خانواده در مراقبت از نوزاد را نشان داد. در مطالعه Jaloo و همکاران (۲۰۰۸)، کمبود وقت و مهارت ناکافی پرستاران، سبب غفلت در ارتباط با والدین و متعاقباً عدم تأمین نیازهای حسایی و اطلاعاتی والدین شده بود.<sup>۳۹</sup> ضعف عملکرد پرستاران در مطالعه حاضر می‌تواند به دلیل کمبود وقت، کمبود نیروی انسانی، اهمیت ندادن به این موضوع از سوی پرستاران و یا اضطراب والدین به عنوان مانع بر دریافت آموزش‌های مناسب باشد.

است مسؤولین با فراهم کردن دستورالعمل‌های استاندارد و ترغیب پرستاران جهت رعایت آن‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و نظارت دقیق بر حسن اجرای دستورات به رفع این چالش‌ها بپردازند. در مطالعه حسابرسی مراقبت‌های پرستاری مرتبط با نوزاد مادر مبتلا به دیابت، رعایت استانداردها در سطح مطلوب ارزیابی شد.<sup>۴۰</sup> احتمالاً تفاوت یافته‌های پژوهش کنونی با پژوهش مذکور، به دلیل اختصاصی بودن و دسترسی به دستورالعمل مشخص مراقبت پرستاری مرتبط با نوزاد مادر مبتلا به دیابت باشد. بنابراین نصب دستورالعمل در بخش می‌تواند زمینه را برای استفاده پرستاران در هنگام نیاز فراهم نماید.

یافته‌های پژوهش کنونی بیانگر مطلوب بودن برخی مراقبت‌ها از قبیل مانیتورینگ قلبی‌ریوی، اتصال پرپوپ پالس‌اکسی متر به نوزاد و مانیتور، اندازه‌گیری سطح اشباع اکسیژنی نوزاد، تزریق آمپول ویتامین K و واکسن هپاتیت B طبق دستور پزشک، ارسال آزمایشات دستور پزشک و داده شده توسط پزشک و کنترل جذب و دفع نوزاد بود. این یافته‌ها با مطالعات گودرزی و همکاران (۲۰۱۵)<sup>۴۱</sup> و اعتضادی جمع و همکاران (۱۳۹۱)<sup>۴۲</sup> همسو بود. گودرزی و همکاران (۲۰۱۵) در مطالعه خود با هدف تعیین میزان اجرای جنبه‌های مراقبت تکاملی در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان دریافتند که میزان رعایت مراقبت معمول و روزانه در حد مطلوب بود.<sup>۴۳</sup> مطالعه اعتضادی جمع و همکاران (۱۳۹۱) با هدف تعیین تاثیر اجرای یک راهنمای مدون تحويل نوبت کاری بر عملکرد این پرستاران در حیطه مراقبت‌های قلبی تنفسی در بخش‌های مراقبت ویژه نیز بیانگر اجرای مطلوب مانیتورینگ قلبی بیمار بود،<sup>۴۴</sup> اما مانیتورینگ تنفسی در مطالعه مذکور به طور کلی گزارش نشده بود و لذا امکان مقایسه یافته‌های مربوط به مانیتورینگ تنفسی وجود نداشت. مطلوب بود و پیگیری بیمار را نشان می‌دهد که در شرح وظایف پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه به طور مشخص و واضح وجود دارد.

در بررسی مراقبت‌های حین پذیرش نوزاد، مشکلات عملکردی پرستاران در برخی موارد بیشتر بود. به عنوان مثال، در ۹۹ درصد موارد تجهیزات مورد نیاز نوزاد قبل از استفاده گرم شده و در ۱۰۰ درجه حرارت آگریلاری نوزاد هر ۱۰ دقیقه در یک ساعت اول کنترل نشده بود. کنترل و ثبت درجه حرارت یک جزء بسیار مهم مراقبت از نوزاد است؛ چرا که هیپوترمی هنگام پذیرش، یک عامل مهم در بیماری و مرگ و میر نوزاد محسوب می‌شود.<sup>۴۵</sup> یافته‌های مطالعه‌ای در نیجریه نشان داد که ۶۲ درصد نوزادان مورد مطالعه، دچار هیپوترمی بدو تولد بودند و ۳۷ درصد این نوزادان فوت شده بودند.<sup>۴۶</sup> پژوهش دیگری در ساری گزارش نمود که حتی پس از ثبت و انتقال نوزادان، ۱۰/۱ درصد از آن‌ها دچار هیپوترمی شدند.<sup>۴۷</sup> علت ضعف عملکرد پرستاران در این رابطه می‌تواند ناشی از عدم آگاهی و یا بی‌توجهی آنان نسبت به اهمیت این موضوع باشد؛ بنابراین لازم است اهمیت این مراقبت‌ها و عوارض ناشی از غفلت در مراقبت مطلوب، در آموزش‌های ضمن خدمت مطرح گردد.

## تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندهای بیان نشده است.

### سهم نویسندهای

کبری امیدی: اجرای پژوهش و تهیه نسخه اولیه مقاله  
فروزان آتش زاده شوریده: طراحی و نظارت بر انجام پژوهش، مشارکت در تدوین و ویراستاری مقاله

اعظم شیرین آبادی فراهانی: مشارکت در تدوین مقاله  
باقر پهلوان زاده: مشارکت در تجزیه و تحلیل داده‌ها  
لیلا خانعلی مجن: مشارکت در تدوین مقاله.

### سپاسگزاری

این پژوهش، حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان و طرح پژوهشی به شماره ثبت ۱۳۵۴۵-۱۸۶-۱۳۹۳ و کمیته اخلاقی مورخ ۱۳۹۳/۲ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کلیه همکارانی که در این پژوهش همکاری داشته‌اند، تشکر و قدردانی می‌شود.

از جمله محدودیت‌های مطالعه کنونی می‌توان به تغییر رفتار و عملکرد پرستاران به دلیل حضور پژوهشگر اشاره نمود؛ هر چند سعی شد با حضور هر چه بیشتر در بخش و برقراری ارتباطی دوستانه با پرستاران و حذف ۳۰ مشاهده اولیه از یافته‌های پژوهش، از وقوع این امر تا حد ممکن جلوگیری گردد.

### نتیجه‌گیری

نتایج این پژوهش بیانگر عملکرد متوسط پرستاران در ارایه مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزادان در مقایسه با استانداردها بود. علت این امر را می‌توان به عدم توجه مراقبت کنندگان و نارسانی در آموزش و نظارت بالینی مدیران پرستاری نسبت داد. لذا بکارگیری راهنمای بالینی مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد مطابق با استانداردها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان و نظارت بر حسن اجرای آن، بایستی مد نظر مدیران و پرستاران قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود بررسی علل عدم رعایت مراقبت‌های پرستاری حین پذیرش نوزاد در مقایسه با استانداردها در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان در پژوهش‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد. از طرفی در این پژوهش فهرست تحقیقات بیشتری در خصوص اعتباریابی ابزار مورد نیاز است.

### References

- Rezaeian A, Boskabadi H, Mazlom SR. Factors associated with perinatal mortality in preterm infants in NICU Ghaem Hospital, Mashhad. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2014; 4(3): 349-60. [Persian]
- Cleveland LM. Symbolic interactionism and nurse-mother communication in the neonatal intensive care unit. Research and theory for nursing practice 2009; 23(3): 216-29.
- Abd El Fattah N, Negawa A, El Dein Z. Assessment of quality of nursing care provided immediately after birth at university hospital. Life Science Journal 2009; 9(4): 2115-26.
- Carbajal R, Rousset A, Danan C, Coquery S, Nolent P, Ducrocq S, et al. Epidemiology and treatment of painful procedures in neonates in intensive care units. The Journal of the American Medical Association 2008; 300(1): 60-70.
- Castrodale V, Rinehart S. The golden hour: Improving the stabilization of the very low birth-weight infant. Advances in Neonatal Care 2014; 14(1): 9-14.
- Knobel RB. Thermal stability of the premature infant in neonatal intensive care. Newborn and Infant Nursing Reviews 2014; 14(2): 72-6.
- Boo N-Y, Cheah IG-S. Admission hypothermia among VLBW infants in Malaysian NICUs. Journal of Tropical Pediatrics 2013; 59(6): 447-52.
- Binder WS, Zeltzer LK, Simmons CF, Mirocha J, Pandya A. The father in the hallway: Posttraumatic stress reactions in fathers of NICU babies. Psychiatric Annals 2011; 41(8): 396-402.
- Obeidat HM, Bond EA, Callister LC. The parental experience of having an infant in the newborn intensive care unit. The Journal of Perinatal Education 2009; 18(3): 23-9.
- De Rouck S, Ley S. Information needs of parents of children admitted to a neonatal intensive care unit: A review of the literature (1990-2008). Patient Education and Counseling 2009; 76(2): 159-73.
- Ugwu GM. Pattern of morbidity and mortality in the newborn special care unit in a tertiary institution in the Niger Delta region of Nigeria: A two year prospective study. Global Advanced Research Journal of Medicine and Medical Sciences 2012; 1(6): 133-8.
- Marquis BL, Huston CJ. Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application. 7<sup>th</sup> ed, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
- Hubbard M. Reducing admissions to the neonatal unit: A report on how one neonatal service has responded to the ever increasing demand on neonatal cots. Journal of Neonatal Nursing 2006; 12(5): 172-6.
- Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9<sup>th</sup> ed, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
- Manani M, Jegatheesan P, DeSandre G, Song D, Showalter L, Govindaswami B. Elimination of admission hypothermia in preterm very low-birth-weight infants by standardization of delivery room management. The Permanente Journal 2013; 17(3): 8-13.
- Niela-Vilén H, Axelín A, Salanterä S, Lehtonen L, Tammela O, Salmelin R, et al. Early physical contact between a mother and her NICU-infant in two university hospitals in Finland. Midwifery 2013; 29 (12):1321-30.
- MacDonald MG, Ramasethu J, Rais-Bahrami K. Atlas of Procedures in Neonatology. 5<sup>th</sup> ed, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
- Jaloo Z. Auditing of nursing care of neonatal respiratory distress in NICU at Shahid Beheshti

- University of Medical Sciences selected hospitals in 2008. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2008. [Persian]
19. Najafi Pur S, Rassouli M, Masoum Pur A, Kavousi A. Auditing of preventive nursing care regarding neonatal hypothermia at Shahid Beheshti Medical Sciences University selected hospitals in 2011. Modern Care Journal 2012; 9(2): 104-13. [Persian]
  20. Najafi Anari HR, Rasouli M, Atashzadeh-Shoorideh F, Namdari M. Auditing preterm neonatal nutrition nursing care at Shahid Beheshti Medical Sciences University selected hospitals. Journal of Nursing Management 2013; 2(4): 29-37. [Persian]
  21. Usefi Roshan H. Auditing of nursing record and nursing documentation in NICU at Babol University of Medical Sciences. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2012. [Persian]
  22. Hasani Kheiri M. Auditing of nursing care of Medication in NICU at Babol Medical Sciences University selected hospitals in 2014. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2013. [Persian]
  23. Borimnejad L, Ansari K, Tatarpour P, Haghani H. Studying High risk newborn intra-hospital transport in Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Iranian Journal of Critical Care Nursing 2012; 6 (3): 199-206.
  24. Piri Naghabadi F. Auditing of nursing care in phototherapy in NICU at Shahid Beheshti Medical Sciences University selected hospitals. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2014. [Persian]
  25. Tajali S. auditing Heamovigilance naring care in NICU at Shahid Beheshti Medical Sciences University selected hospitals. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2014. [Persian]
  26. Nabavian M. Auditing of nursing care in diabetic neonates in NICU at Shahid Beheshti University of Medical Sciences selected hospitals. [MSc Thesis]. Tehran, Iran: School of Nursing & Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2014. [Persian]
  27. Godarzi Z, Rahimi O, Khalesi N, Shamshiri A, Mohammadi N, Soleimani F. The rate of developmental care delivery in neonatal intensive care unit. Journal of Critical Care Nursing 2015; 8(2): 117-124.
  28. Etezadi- Jame T, Malekzadeh J, Mazluom S. R, Tasseeri A. Nursing handover written guideline implementation: A way to improve safe performance of nurses in Intensive Care Units. Journal of Evidence-Based Care 2012; 2(2): 7-18. [Persian]
  29. Boxwell G. Neonatal intensive care nursing. 2<sup>th</sup> ed, London: Routledge; 2010.
  30. Nakhshab M, Vosoughi E. The condition of neonatal transport to NICU in Mazandaran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2010; 20(78): 50-7. [Persian]
  31. Arshadi bostan abad M, assadollahi M, jebreili M, mahallei M, abdolalipour M. Nurses' attitudes towards barriers in hand hygiene in the neonatal units of Tabriz. Journal of Pediatric & Neonatal Nursing 2014; 1(1):18-26. [Persian]
  32. Zandiye M, Borzo R. The level of hand hygiene compliance by operating room personnel of educational hospitals in Hamadan University of Medical Science. Holistic Nursing and Midwifery Journal 2012; 22 (1) 23-9. [Persian]
  33. Lankford MG, Zembower TR, Trick W.E, Hacek DM, Nskin GA, Petersop LR. Influence of role models and hospital design on the hand hygiene of health care workers. Emergency Infectious Disease 2003; 9(2): 217-23.
  34. Lam BCC, Lee J, Lau YL. Hand hygiene practices in a neonatal intensive care unit: A multimodal intervention and impact on nosocomial infection. Official Journal of the American Academy of Pediatrics 2004; 114(5): 565-71.
  35. Farnia F, Anzasab B, Farag koda T. Quality of personel hand hygiene anb giving solution for decreasing of nosocomial infection. Abstracts of 5<sup>th</sup> conference of nursing & midmidwifery faculty of Hamadan; 2002, Hamadan, Iran, 68. [persian]
  36. Asare A, Enweronu-Laryea CC, Newman MJ. Hand hygiene practices in a neonatal intensive care unit in Ghana. The Journal of Infection in Developing Countries 2009; 3(5): 352-6.
  37. Karimi A, Tara F, Khadivzadeh T, Aghamohamadian Sharbaf H. The effect of skin to skin contact immediately after delivery on the maternal attachment and anxiety regarding infant. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2013; 16(67): 7-15. [Persian]
  38. Srivastava S, Gupta A, Bhatnagar A, Dutta S. Effect of very early skin to skin contact on success at breastfeeding and preventing early hypothermia in neonates. Indian journal of public health 2014; 58(1): 22-6.

## The conformity rate of nursing care during newborn admission with the standards in Neonatal Intensive Care Unit

Kobra Omidi<sup>1</sup>, Foroozan Atashzadeh-Shoorideh<sup>2</sup>, Azam Shirinabadi-Farahani<sup>3</sup>, Bagher Pahlevanzadeh<sup>4</sup>, Leila Khanali-Mojen<sup>3</sup>

1. MSc Student in Neonatal Intensive care Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Assistant Professor, Department of Nursing Management, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3. Instructor, PhD Student in Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4. PhD Student, Department of Biostatistics, School of Paramedical, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Original Article

Medical - Surgical Nursing Journal, 2015; 4(2): 24-32.

### ABSTRACT

**Background and Objective:** Newborn admission to the neonatal intensive care unit is associated with many complications. One of the solutions to reduce the complications is providing nursing care according to admission standards. This study was conducted aimed to determine the conformity rate of nursing care during newborn admission with the standards in Neonatal Intensive Care Units (NICUs).

**Materials and Method:** In this cross-sectional study, 267 neonatal nursing care during admission to NICUs in selected educational hospitals in Qazvin, in 2014 were selected and observed with quota sampling event. Data were gathered through demographic questionnaire for nurses and hospitalized newborns, checklist of neonatal nursing care during admission. Data were analyzed through descriptive statistics using SPSS 21.

**Results:** Conformity rate of nursing care during neonatal admission with the standards in neonatal intensive care units was 51 percent. Moreover, 36.84 percent of nursing care during neonatal admission was desirable, 14.03 percent was moderate, and 49.12 percent was poor.

**Conclusion:** According to results, nurses' performance concerning the nursing care during the admission was in moderate level in compare with standards. It is recommended the application of nursing clinical guide during the newborn admission and clinical supervision by nurse managers about optimizing the performance in order to improving quality of care.

Received: 16/04/2015

Accepted: 20/06/2015

**Keywords:** Nursing care, admission, newborn, standard

**Please cite this article as:** Omidi K, Atashzadeh-Shoorideh F, Shirinabadi-Farahani A, Pahlevanzadeh B, Khanali-Mojen L. The conformity rate of nursing care during newborn admission with the standards in Neonatal Intensive Care Unit. Medical - Surgical Nursing Journal 2015; 4(2): 24-32.



# Medical & Surgical Nursing Journal

Vol. 4, No. 2, 2015



Iranian Nursing Association

**Owned and Published by:** Zahedan University of Medical Sciences and Health Services, Nursing and Midwifery school

**ISSN:** 2322-178X

**Online ISSN:** 2322-4169

**Islamic Guidance License No:** 19191/90,  
90.7.24

**Director in Charge:** Ali Navidian

**Editor-in-Chief :** Ali Navidian

**Executive Manager:** Fatiheh Kermansaravi

**Deputy Editor:** Fereshteh Najafi

**Scientific & Literature Editor:** Fereshteh Najafi

**English Editor:** Fariba Yaghoubinia

**Journal Expert:** Toktam kianian

**Executive Expert & Site Manager:** Mahdiye Rezaei

## Editorial Board

**Fazlollah Ahmadi.** Professor of Nursing, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

**Abbas Abbaszadeh.** Professor of Nursing, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

**Hosein Ansari.** Assistant Professor of Epidemiology, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

**Abbas Ebadi.** Associate Professor of Nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

**Masoud Fallahi Khoshknab.** Associate Professor of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

**Fatiheh Kermansaravi.** Assistant Professor of Nursing, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

**Negin Masudi Alavi.** Professor of Nursing, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

**Zahra Moodi.** Assistant Professor of Midwifery, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

**Reza Negarandeh.** Professor of Nursing, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

**Ali Navidian.** Associate Professor of Councilor Family, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

**Fereshteh Najafi.** Instructor of Nursing, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

**Maryam Rassouli.** Associate Professor of Nursing, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

**Farideh Yaghmaei.** Associate Professor of Nursing, Islamic Azad University of Zanjan, Zanjan, Iran

**Fariba Yaghoubinia.** Assistant Professor of Nursing, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

**Ali Zargham.** Assistant Professor of Nursing, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

## The referee of this issue

Ansari H. (PhD), Atashzade Shourideh F. (PhD), Borhani F. (PhD), Dehghan M. (PhD Student), Firouzkouhi MR. (PhD), Ghaljaei F. (PhD), Giyasi F. (PhD), Mohsen Pour M. (PhD Student), Navabi-Rigi SH. (MSc), Naderi Far M. (PhD Student), Pishkar Mofrad Z. (MSc), Rasouli M. (PhD), Rezaei N. (PhD), Rejeh N. (PhD), Sabzevari S. (PhD), Yaghoubinia F. (PhD), Zeighami R. (PhD)

**Journal Scope:** Nursing

**Funded By:** Zahedan University of Medical Sciences, Deputy Minister for Research and Technology with cooperation by Iranian Nursing Scientific Association

Reprinting of this publication is subject to citing the references, and all rights reserved.

**This Journal is Indexed & Abstracted in:**  
**ISC, Iran Medex, Magiran, SID, Google Scholar**

**Address:** Medical & Surgical Nursing Journal, Mashahir Square, Zahedan Nursing and Midwifery School. P.O. Box: 98169-13396.

Tel: +98 54 33438473 fax: +98 54 33442481, email: ijmsn@zaums.ac.ir