

اثرات کاربرد توأم ویتامین A و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پائین (۵۰ هرتز) بر تکامل جوانه اندام حرکتی در رویان جوجه

جواد بهار آرا^۱, مصصومه صبوری^۲

تاریخ دریافت مقاله: ۸۹/۲/۲۱

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۹/۳/۲۵

۱. استادیار زیست شناسی تکوین جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم پایه

۲. کارشناس ارشد علوم جانوری گرایش سلوالی - تکوینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده علوم پایه

چکیده

زمینه و هدف: میدان‌های الکترومغناطیسی بر حسب شدت و فرکانس، اثرات متنوعی را در موجودات زنده القاء می‌کنند. ویتامین A نیز نقش گسترده‌ای بر رشد و نمو ارگانیسم‌های زنده دارد. در تحقیق حاضر اثرات کاربرد توأم ویتامین A و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی جنین جوجه بررسی شده است.

مواد و روش کار: این مطالعه به روش آزمایشگاهی تجربی روی ۳۰ تخم مرغ نطفه‌دار نژاد gallus انجام شد. تخم مرغ‌ها به طور تصادفی به سه گروه مساوی شاهد، شاهد آزمایشگاهی و تجربی تقسیم شدند. نمونه‌های گروه تجربی، یا یک واحد ویتامین A در ساعت ۵۶ انکوباسیون، تیمار و به مدت سه ساعت در دستگاه مولد میدان الکترومغناطیسی با فرکانس ۵۰ هرتز و شدت ۵۰ گاوس قرار داده شدند. در روز ۱۲ انکوباسیون، جنین‌های هر سه گروه خارج، وزن جنین و طول اندام حرکتی تحتانی اندازه‌گیری گردید. سپس از جنین‌ها مقاطع بافتی جهت مطالعات میکروسکوپی نوری تهیه و میانگین طول استخوان و طول منطقه استخوان سازی هر دو ساق با استفاده از نرم‌افزار SPSS-15 آنالیز شد.

یافته‌ها: میانگین درصدی وزن جنین، طول اندام حرکتی تحتانی، طول استخوان ساق، طول منطقه استخوان سازی ساق و سلول‌های غضروفی در مناطق ابی فیز و دیافیز ساق گروه تجربی نسبت به شاهد آزمایشگاهی کاهش یافته بود ($p=0.001$).

نتیجه‌گیری: استفاده توأم ویتامین A و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم بر رشد و نمو اثر تاخیری داشته و باعث کاهش وزن جنین، طول اندام حرکتی و تراکم سلول‌های غضروفی جنین جوجه می‌شود. [م ت ع پ ذ، ۱۳(۲):۷-۱۲]

کلیدواژه‌ها: میدان الکترومغناطیسی، جوانه اندام حرکتی، رویان جوجه، ویتامین A، تکامل

مقدمه

هم‌چنین مطالعات نشان داده است که افزایش شدت میدان الکترومغناطیسی با فرکانس ۵۰ هرتز باعث ایجاد خصوصیات غیر طبیعی در جنین جوجه می‌شود.^۱ کاهش باروری نیز تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی برگدد تنسالی موش ماده گزارش شده است.^۲ متابولیت‌های ویتامین A نظری اسید رینوئیک، از جمله مولکول‌های مهم و موثر در تکوین و هوموستاز می‌باشند و بر رشد و نمو اندام حرکتی پستانداران و تمایز بیشتر نسل‌های سلوالی از جمله دودمان سلول‌های غضروف‌زا اثر گذار هستند. علاوه بر این اسید رینوئیک در مواردی تراوت‌رُن بوده و باعث ایجاد نقص‌های اسکلتی می‌شود که وسعت ناهنجاری‌هاستگی به مرحله جنینی و میزان مصرف آن دارد.^{۳,۴}

اسید رینوئیک به عنوان تنظیم‌کننده فتوتیپ سلول‌های غضروفی هم معروف شده و باعث تغییر در شکل طبیعی این سلول‌ها می‌شود، علاوه بر این تمایز سلول‌های مزانتیمی به غضروفی را مهار می‌کند.^{۵,۶} مطالعات زیادی نشان داده‌اند که کنترل کمی اسید رینوئیک در مسیر صحیح رشد و نمو جنین‌های مهره‌داران لازم است و مکانیزم‌های مختلفی، ثابت بودن میزان رینوئید را در بر جستگی اکتودرم رأسی و مزانشیم، در طی جوانه زدن اندام حرکتی تنظیم می‌کنند، هم‌چنین ویتامین A یک پیام رسان ریخت‌زا بوده و به عنوان کلید روش و خاموش کنترل دیگر سیستم‌های پیام رسانی جنینی معرفی شده است.^{۷,۸} با توجه به این که بسیاری از دستگاه‌های اطراف انسان چه در منزل و

محیط‌گردی را می‌گردانند، اثرات این مواجهه، روی تکثیر و تمایز موجودات زنده القاء می‌کنند، اثرات این مواجهه، روی تکثیر و تمایز سلولی، تکرار چرخه سلوالی، مرگ بروگرامه‌زی شده سلوالی، ارتباط بین سلوالی، رونویسی دزوکسی ریبونوکلئیک اسید، بیان ژن و تومورزایی گزارش شده است.^۹ میدان‌های الکترومغناطیسی بر رشد و نمو جنین شرایط درون‌تنی، قابل دست‌کاری می‌باشد.^{۱۰} مطالعات آزمایشگاهی فراوانی در شرایط درون‌تنی و بروون‌تنی، نشان داده‌اند که مواجهه با میدان‌های الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم، پاسخ‌های متنوعی را در میان اندام‌های زنده القاء می‌کنند، اثرات این مواجهه، روی تکثیر و تمایز موجودات زنده القاء می‌کنند، اثرات این مواجهه، روی تکثیر و تمایز سلولی، تکرار چرخه سلوالی، مرگ بروگرامه‌زی شده سلوالی، ارتباط بین سلوالی، رونویسی دزوکسی ریبونوکلئیک اسید، بیان ژن و تومورزایی گزارش شده است.^{۱۱} تأثیر میدان‌های الکترومغناطیسی در شرایط بروون‌تنی جوجه نیز مؤثر هستند.^{۱۲} تأثیر میدان‌های الکترومغناطیسی در شرایط بروون‌تنی بر روی سلول‌های اجدادی استخوان‌ساز و پیش‌سازهای استئوبلاست، جهت ترمیم شکستگی استخوان هم مطالعه شده است.^{۱۳} نتایج برخی تحقیقات نیز بیان گر آن است که میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم باعث القای آسیب‌های کروموزومی در اریتروسیت‌های پلی کروماتیک مغز استخوان موش نر می‌شود.^{۱۴}

مجهز به سیستم انکوباسیون در حالت روش منقل گردیده و تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس ۵۰ هرتز و شدت ۵۰ گاوس به مدت سه ساعت قرار داده شد و مجدداً انکوبه شدند. در تمام مدت انکوباسیون، میزان رطوبت و دمای دستگاه جوجه کشی و چرخش تخم مرغها کنترل می‌گردید. تخم مرغهای هر سه گروه را در روز ۱۲ انکوباسیون باز و جنین‌ها را خارج و با سرم فیزیولوژی شیستشو، سپس با ترازوی دیجیتال توزین نمودیم. در ادامه نمونه‌ها در فرمالین ده درصد قرارداده شدند. از جنین‌ها با فوتواسترۇمیکروسکوپ تحقیقاتی (Ziess, Germany) عکس تهیه شد، هم‌چنین با کولیس طول اندام حرکتی تحتانی اندازه گیری و ثبت گردید و تصاویر توسط کامپیوتر و با استفاده از نرم‌افزار J (Imag ۱/۳۸) اندازه گیری شدند. سپس با تیغ، سر نمونه‌های تثیت شده، جدا گردید و پس از آب گیری به کمک درجات صعودی اتانول، قالب گیری توسط پارافین انجام شد، در ادامه برش‌های سهی بی درپی ۷ میکرونی توسط میکروتوم انجام شد، در ادامه برش‌های سهی بی درپی (Microm, Germany) تهیه و به روش هماتوکسلین-اثوزین هاریس رنگ‌آمیزی و مقاطع بافتی جهت مطالعه با میکروسکوپ آماده گردید. در مقاطع بافتی آماده شده، طول استخوان ساق (Tibia) و طول منطقه استخوان‌سازی در دیافیز اندازه گیری شد و سلول‌های غضروفی استخوان ساق در سه منطقه اپی‌فیز بالایی (محل اتصال به مچ پا)، اپی‌فیز پائینی (محل اتصال به استخوان ران) و سلول‌های استخوان ساز دیافیز (سلول‌های غضروفی هایپرتروفی شده) در درشت نمایی $\times 1000$ با استفاده از گراییکول مشبك در سه ناحیه (نرده‌یک به ضریع) از میدان دید شمارش شد. جهت مقایسه وزن جنین‌ها گروه تجربی با گروه شاهد آزمایشگاهی از رابطه نسبت میانگین وزن جنین به وزن تخم مرغ درصد استفاده شد:

$$\text{درصد} = \left(\frac{\text{وزن جنین}}{\text{وزن تخم مرغ}} \times 100 \right)$$

داده‌های کمی حاصل با استفاده از آزمون آماری t (به صورت مقایسه دو به دو گروه‌ها) به کمک نرم‌افزار SPSS-15 تحلیل شد. محققین در مراحل مختلف تحقیق متعهد به رعایت اصول اخلاقی مربوط به پژوهش بودند.

یافته‌ها

گروه‌های شاهد و شاهد آزمایشگاهی از نظر میانگین شاخص‌های مورد نظر شامل: وزن اولیه تخم مرغ (قبل از گذاشتن در انکوباتور)، وزن جنین ۱۲ روزه (بعد از خارج کردن از تخم مرغ)، طول کل اندام حرکتی تحتانی، هم‌چنین تعداد سلول‌های غضروفی در سه منطقه اپی‌فیز بالایی، پائینی و دیافیز، طول استخوان ساق و طول منطقه استخوان‌سازی باهم مقایسه شده و اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. لذا در مراحل بعدی داده‌های کمی حاصل از نمونه‌های گروه تجربی با گروه شاهد آزمایشگاهی مقایسه گردید. میانگین تعداد سلول‌های غضروفی در سه منطقه اپی‌فیز بالایی (30.6 ± 0.3 ، پائینی (33 ± 0.2) و دیافیز (5.6 ± 0.5) ، میانگین درصدی وزن جنین (3.6 ± 0.3 ، 6.3 ± 0.3) و میانگین طول اندام mm (35.7 ± 0.4 ، میانگین طول استخوان ساق 8.6 ± 0.8 و میانگین طول منطقه استخوان سازی mm (1.6 ± 0.1)

چه در محیط کار، مولد میدان‌های الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم هستند و ما به صورت مستمر در مواجهه با این امواج می‌باشیم و از طرفی ویتامین A هم در درمان‌های کلینیکی و هم در دوران بارداری به عنوان مکمل غذایی استفاده فراوانی دارد، در پژوهش حاضر اثرات کاربرد توأم این دو عامل مهم بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی تحتانی جنین جوجه بررسی شده است.

روش کار


این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی است و در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ در آزمایشگاه تحقیقاتی زیست‌شناسی تکوینی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام شده است. برای انجام تجربیات، تعداد ۳۰ عدد تخم مرغ نطفه‌دار نژاد gallus Gallus تازه (حداکثر ۴ روزانبار شدگی) و سالم، از شرکت مرغداران توسر تهیه و استفاده شد. تخم مرغ‌های مذکور به صورت تصادفی به سه گروه مساوی ذیل تقسیم شدند و بعد از توزین با ترازوی دیجیتالی (Sartorius, Germany) و ثبت وزن تخم مرغها و ضدعفونی با الکل ۷۰ درصد در دستگاه جوجه کشی (شرکت دام دشت، مشهد) با دمای 38°C و رطوبت ۶۰ درصد قرارداده شدند.

گروه شاهد: تخم مرغ‌های این گروه در شرایط معمول در ماشین sham-(exposed): در سطح افقی برای تخم مرغ‌های این گروه در ساعت ۲۴-۴۸ انکوباسیون در محیط استریل و زیر هود لامینار (Telstar, Spain) پنجره گذاشته شد و در ساعت ۵۶ انکوباسیون پنجره را باز نموده، حال ویتمان، دی متیل سولفوکسید (DMSO) را به میزان یک میکرولیتر، با استفاده از سمپلر بر سطح جوانه اندام چکانده و مجدداً محل ایجاد پنجره بسته شد. سپس تخم مرغ‌های مذکور به مدت سه ساعت در دستگاه مولد امواج الکترومغناطیسی مجهز به سیستم انکوباسیون که در مطالعات قبلی توسط بهار آرا و اشرف در آزمایشگاه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و ساخته شده است در حالت خاموش قرار گرفته و مجدداً انکوبه شدند (تصویر ۱).




تصویر ۱: انکوباسیون متعلق به دستگاه مولد میدان الکترومغناطیسی: A؛ بوبین، B؛ سیستم انکوباسیون، C؛ فازن، D؛ ریوست، E؛ ولتسن

گروه تجربی: برای تخم مرغ‌های این گروه در سطح افقی و در ساعت ۲۴-۴۸ انکوباسیون در محیط استریل، پنجره گذاشته شد و در ساعت ۵۶ انکوباسیون، با ویتامین A به میزان یک واحد (IU) (معادل $0.344 \mu\text{g}$ میکروگرم) که در یک میکرولیتر DMSO حل شده بود، تیمار انجام گرفت. سپس تخم مرغ‌های مذکور به دستگاه مولد امواج الکترومغناطیسی



تصویر ۴: فتواسترئومیکروگراف از مقطع بافتی استخوان ساق و منطقه استخوان سازی نمونه های شاهد آزمایشگاهی (A: طول استخوان ساق، B: طول منطقه استخوان سازی) (بزرگنمایی $\times 40$ ، رنگ آمیزی H&E)



تصویر ۵: فتوامیکروگراف از سلول های غضروفی اپی فیذا استخوان ساق نمونه تجربی (بزرگنمایی $\times 400$ ، رنگ آمیزی H&E)

بحث


نتایج حاصل از این مطالعه بیان گر آن است که به کارگیری توأم ویتامین A و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس ۵۰ هرتز و شدت ۵۰ گاوس باعث کاهش تعداد سلول های غضروفی در مناطق اپی فیز بالایی، اپی فیز پایینی و دیافیز می شود. همچنین میانگین درصدی وزن جنین ها، طول اندام حرکتی، طول منطقه استخوان سازی در نمونه های گروه تجربی نسبت به شاهد آزمایشگاهی کاهش نشان داد.

طبق جدول هامیلتون که در سال ۲۰۰۶ نیز توسط دکتر مارک هیل مورد بازبینی قرار گرفت، زمان جوانه زدن اندام حرکتی عقبی در جوجه مرحله ۱۷ مقارن با ساعت ۵۲-۶۴ انکوباسیون می باشد.^{۱۹} در تجربه حاضر زمان تیمار تخم رخها و قرار دادن آنها در دستگاه میدان الکترومغناطیسی هم زمان با این مرحله انتخاب شد. نتایج بیان گر کاهش در میانگین طول کل اندام، طول استخوان ساق، طول منطقه استخوان سازی و وزن جنین های گروه تجربی نسبت به گروه شاهد آزمایشگاهی است. مطالعات پژوهشگران گذشته بیان گر آن است که مصرف زیاد ویتامین A و مشتقاتش نظری اسید ریتوئینیک در دوران پارداری به عنوان تراویز عمل می کنند. همچنین ریتوئینیدها در بیان ژن های تأثیرگذار ۱۴ در تنظیم پدیده هایی مثل مورفوژنز،^{۲۰} تعیین سرنوشت سلولی و غضروف زایی دخالت دارند و با حضور در بیشتر فرآیندهای تنظیم


گروه تجربی نسبت به میانگین تعداد سلول های غضروفی در سه منطقه اپی فیز بالایی ($35/8 \pm 0/8$)، پایینی ($40/2 \pm 1/3$) و دیافیز ($6/8 \pm 0/2$)، میانگین درصدی وزن جنین ($7/7 \pm 0/3$)، میانگین طول اندام ($37/9 \pm 0/2$ mm)، میانگین طول استخوان ساق ($9/5 \pm 0/2$ mm) و میانگین طول منطقه استخوان سازی ($2/4 \pm 0/1$ mm) گروه شاهد آزمایشگاهی کاهش معنی دار مشاهده شد ($p=0/001$) (جدول ۱) (تصاویر ۲ تا ۵).

جدول ۱: مقایسه آماری داده های کمی حاصل از نمونه های گروه تجربی با گروه شاهد

متغیرها	گروه ها	
	شاهد	تجربی
	Mean \pm SD	Mean \pm SD
درصدی وزن جنین (گرم)	$6/3 \pm 0/3$	$7/7 \pm 0/2$
طول اندام (میلی متر)	$35/7 \pm 0/4$	$37/9 \pm 0/2$
طول استخوان ساق (میلی متر)	$8/6 \pm 0/2$	$9/5 \pm 0/2$
طول منطقه استخوان سازی	$1/6 \pm 0/1$	$2/4 \pm 0/1$
تعداد سلول های غضروفی اپی فیز پایینی	$33 \pm 0/8$	$40/2 \pm 1/3$
تعداد سلول های غضروفی اپی فیز بالایی	$30/6 \pm 0/3$	$35/8 \pm 0/8$
تعداد سلول های استخوان ساز دیافیز	$5/6 \pm 0/2$	$6/8 \pm 0/2$



تصویر ۲: فتواسترئومیکروگراف از مقطع بافتی استخوان ساق و منطقه استخوان سازی نمونه تجربی (A: طول استخوان ساق، B: طول منطقه استخوان ساق) (بزرگنمایی $\times 40$ ، رنگ آمیزی H&E)



تصویر ۳: فتواسترئومیکروگراف از مقطع بافتی استخوان ساق و منطقه استخوان سازی نمونه شاهد (A: طول استخوان ساق، B: طول منطقه استخوان ساق) (بزرگنمایی $\times 40$ ، رنگ آمیزی H&E)

وجه و بلدرچین هم نشان می دهد که به طور کلی رشد غضروفی افزایش می باید و فرآیندهای استخوان سازی تسریع شده و پیدایش مراکز اولیه استخوان سازی تحریک می شود.^۷ میدان های الکترومغناطیسی باعث جابجایی یون های آزاد در سطح غشاء پلاسمایی می شوند و این موجب تغییر در بار الکتریکی غشاء شده و منجر به باز شدن غیر طبیعی کاتال های یونی وابسته به ولتاژ می شود^۸ که یکی از پی آمد های آن ایجاد تغییر در هدایت یون کلسیم است، چون یون کلسیم در چرخه های سلولی نقش اساسی دارد می تواند موجب تغییر در زمان چرخه تقسیم سلولی و باعث افزایش نسخه برداری، افزایش سنتر پروتئین و RNA و در نتیجه سرعت بخشیدن به فرآیند تقسیم سلولی شود.^۹

کاربرد توأم ویتامین A و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر رشد و نمو جنین جوجه اثر تاخیری داشته و موجب کاهش وزن جنین، طول اندام حرکتی و تراکم سلول های غضروفی می شود. بنابراین با توجه به این که انسان در زندگی روزمره به علت کاربرد وسیع دستگاه های مولد امواج الکترومغناطیسی در مواجهه مدام با این امواج می باشد باید در مصرف ویتامین A احتیاط لازم را بنمایند به خصوص مادران باردار باید در این زمینه مراقبت های شدید داشته باشند و استفاده دارویی و یا مکملی از این ویتامین با تجویز پژوهش صورت پذیرد. از طرفی لازم است مطالعات تکمیلی بر روی مکانیسم اثرات توأم میدان های الکترومغناطیسی و ویتامین A بر جوانه اندام حرکتی بهویژه در زمینه شناسایی مکانیسم های سلولی مولکولی انجام پذیرد.

سپاسگزاری

از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد که در اجرای این طرح پژوهشی با کد ۱۴۸۸/ت مورخه ۹/۶ ۱۳۸۷ همکاری نمودند تشکر و قدردانی می نمائیم.

بیان ژن باعث اختلال در سطوح مختلف رشد و نمو می شوند.^{۱۰-۱۳} از طرفی اسید ریتوئیک در فرآیندهای مربوط به غضروفی زایی از شکل گیری سلول های پیش غضروفی تا تمایز کنربوبلاست ها، جهت توازن در رشد و نموا سکلتی بسیار مهم است و کمبود یا افزایش آن اثرات منفی روی استخوان سازی دارد.^{۱۴-۲۱، ۲۲} مطالعات جدیدتر نیز نشان داده اند که اسید ریتوئیک تولید سلول های غضروفی از سلول های مزانشیمی را با تنظیم کاهاشی در بیان سیگنال TGF- β /Smad، مهار می کند و باعث ایجاد شکاف کامی در جنین موش می شود.^{۲۳} حتی رسپتور گامای اسید ریتوئیک باعث القاء بد تنظیمی در غضروفی زایی جوانه اندام حرکتی موش در شرایط برون تنی می شود.^{۲۴} در پژوهش حاضر میانگین تعداد سلول های غضروفی در سه منطقه اپی فیز بالایی، پایینی و دیافیز گروه تجربی کاهش معنی داری را نسبت به گروه شاهد آزمایشگاهی نشان داد، لذا می توان گفت که این نتایج احتمالاً در نتیجه تأثیر ویتامین A بر رشد و نمو جوانه اندام حرکتی می باشد و دوز به کار برده شده همراه با میدان الکترومغناطیسی باشد.^۵ گاؤس دارای اثرات تراویزینک می باشد. حال آن که تحقیقات پریور در زمینه اثرات میدان های الکترومغناطیسی بر رشد جوانه اندام حرکتی نشان داده است که میدان الکترومغناطیسی باعث افزایش رشد طولی در بخش های مختلف اندام حرکتی شده و همچنین ناهنجاری مورفو لوژیکی در نمونه ها ایجاد نمی کند هم چنین این گزارش بر وجود نوعی پتانسیل غضروفی زایی میدان الکترومغناطیسی تأکید می کند.^{۲۵} برخی مطالعات نیز نشان داده است که میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار کم، باعث تسریع در تشکیل سلول های استخوانی شده و انتشار فاکتور رشد انسولینی II را در محیط کشت القاء می کند.^{۲۶}

مواجهه با میدان های الکترومغناطیسی فرکانس بسیار پایین در جنین های

References

- Catala M. Control of the positioning of the vertebrate limb axes during development. *Morphology* 2000; 84(265): 17-23.
- Tickle C. Molecular basis of vertebrate limb patterning. *Am J Med Genet* 2002; 112(3): 250-5.
- Tickle C. The contribution of chicken embryology to the understanding of vertebrate limb development. *Mech Dev* 2004; 121(9): 1019-29.
- Davey MG, Tickle C. The chicken as a model for embryonic development. *Cytogenet Genome Res* 2007; 117(1-4): 231-9.
- Levin M. Bioelectromagnetics in morphogenesis. *Bioelectromagnetics* 2003; 24(5): 295-315.
- Ali-Khan SE, Hales BF. Novel retinoid targets in the mouse limb during organogenesis. *Toxicol Sci* 2006; 94(1): 139-52.
- Goodman R, Blank M. Insights into electromagnetic interaction mechanisms. *J Cell Physiol* 2002; 192(1): 16-22.
- Juutilainen J. Developmental effects of electromagnetic fields. *Bioelectromagnetics* 2005; Suppl7: S107-15.
- Yamaguchi DT, Huang J, Ma D and Wang PK. Inhibition of gap junction intercellular communication by extremely low-frequency electromagnetic fields in osteoblast-like models is dependent on cell differentiation. *J Cell Physiol* 2002; 190(2): 180-8.
- Baharara J, Haddad F, Ashraf AR and Khanderoo E. [The effect of extremely low frequency electromagnetic field (50Hz) on induction of chromosomal damages on bone marrow erythrocytes of male Balb/C mouse] Persian. *J Arak Univ Med Sci* 2008; 11(2): 19-26.
- Lahijani MS, Ghafoori M. Teratogenic effects of sinusoidal extremely low frequency electromagnetic fields on morphology of 24 hr chick embryos. *Indian J Exp Biol* 2000; 38(7): 692-9.
- Baharara J, Parivar K, Oryan S and Ashraf AR. [Effects of low frequency electromagnetic fields on gonads and fertility of female Balb/C mouse] Persian. *J Arak Univ Med Sci* 2006; 9(2): 1-11.
- Ross SA, McCaffery PJ, Drager UC and De Luca LM. Retinoids in embryonal development. *Physiol Rev* 2000; 80(3): 1021-54.
- Underhill TM, Sampaio AV, Weston AD. Retinoid

- signaling and skeletal development. *Novartis Found Symp* 2001; 232: 171-85.
15. Cho SH, Oh CD, Kim SJ, et al. Retinoic acid inhibits chondrogenesis of mesenchymal cells by sustaining expression of N-cadherin and its associated proteins. *J Cell Biochem* 2003; 89(4): 837-47.
 16. Rousche KT, Knudson CB. Temporal expression of CD44 during embryonic chick limb development and modulation of its expression with retinoic acid. *Matrix Biol* 2002; 21(1): 53-62.
 17. Martinez-Ceballos E, Burdsal CA. Differential expression of chicken CYP26 in anterior versus posterior limb bud in response to retinoic acid. *J Exp Zool* 2001; 290 (2): 136-47.
 18. Reijntjes S, Blentic A, Gale E and Maden M. The control of morphogen signaling: regulation of the synthesis and catabolism of retinoic acid in the developing embryo. *Dev Biol* 2005; 285(1): 224-37.
 19. Hill M. [homepage on the Internet]. Acknowledgements, UNSW Embryology. Chicken development stages 2008. Available from: <http://embryology.med.unsw.edu.au/OtherEmb/chick2.htm>.
 20. Zile MH. Function of vitamin A in vertebrate embryonic development. *J Nutr* 2001; 131(3): 705-8.
 21. Hoffman LM, Weston AD, Underhill TM. Molecular mechanisms regulating chondroblast differentiation. *J Bone Joint Surg Am* 2003; 85(Suppl 2): 124-32.
 22. Ruhl R, Sass JO, Nau H and Klug S. Effects of all-trans-retinoic acid and all-trans-retinoyl glucuronide in two in vitro systems of distinct biological complexity. *Arch Toxicol* 2001; 75(8): 497-504.
 23. Yu Z, Xing Y. All-trans retinoic acid inhibited chondrogenesis of mouse embryonic palate mesenchymal cells by down-regulation of TGF-beta/Smad signaling. *Biochem Biophys Res Commun* 2006; 340(3): 929-34.
 24. Galdones E, Hales BF. Retinoic acid receptor gamma-induced misregulation of chondrogenesis in the murine limb bud in vitro. *Toxicol Sci* 2008; 106(1): 223-32.
 25. Parivar K, Kouchesfehani MH, Boojar MM and Hayati RN. Organ culture studies on the development of mouse embryo limb buds under EMF influence. *Int J Radiat Biol* 2006; 82(7): 455-464.
 26. Stavroulakis P. Biological effects of electromagnetic fields. New York: Springer Verlag; 2003: 477-478.
 27. Barnes F, Greenebaum B. Biological and medical aspects of electromagnetic fields. 3rd ed. New York: CRC press; 2007: 24-26.
 28. Panagopoulos DJ, Karabarounis A, Margaritis LH. Mechanism for action of electromagnetic fields on cells. *Biochem Biophys Res Commune* 2002; 298(1): 95-102.
 29. Pomerai D, Daniels C, David H, et al. Cell biology: non-thermal heat-shock response to microwaves. *Nature* 2000; 405: 417-418.

The effects of concurrent use of vitamin A and very low frequency electromagnetic field (50Hz) on limb bud development in chick embryo

Javad Baharara¹, Masomeh Saboori²

Received: 11/May/2010

Accepted: 15/Jun/2010

Background: Electromagnetic fields depending on the intensity and frequency have variety effects on living organisms. Vitamin A has an important role on the growth of living organisms. In this study, the effects of concurrent use of vitamin A and very low frequency electromagnetic field on the growth of limb bud of chick embryo have been investigated.

Materials and Method: This experimental laboratory study was performed on 30 eggs with Gallus gallus fertilized race. The eggs were randomly divided into three equal groups including control, laboratory control and experimental. The samples of experimental group were treated with vitamin A 56 hours after incubation (1 IU). Then eggs were placed in active electromagnetic waves generator machine with 50 HZ frequency and 50 G intensity for 3 hours. On the twelfth day of incubation, embryos were removed from their eggs and measured embryo weight and total length of embryo hindlimb. Then embryos were prepared for histological studies with microscope using measurement software "Image J" in microscope sections at length of tibia, length of ontogenesis zone and also counting of chondrocytes of epiphysis and diaphysis. The resulting data were analyzed with SPSS-15.

Results: The results show a significant decrease in the average of embryo weight, total length of embryo limb, length of tibia, average of chondrocyte zones of epiphysis and diaphysis and average length of osteogenesis zone ($p=0.001$).

Conclusion: Based on this Study we conclude that concurrent use of vitamin A and very low frequency electromagnetic field has a delayed effect on development of chick embryo and it causes decreased embryo weight, limb length and accumulation of chondrocyte. [ZJRMS, 13(2): 7-12]

Keywords: Electromagnetic fields, limb buds, chick embryo, vitamin A, development

1. Assistant Professor of Biology, School of Basic Sciences, Islamic Azad University Mashhad branch, Mashhad, Iran.

2. Msc of Cell & Developmental Biology, School of Basic Sciences, Islamic Azad University Mashhad Branch, Mashhad, Iran.

Please cite this article as: Baharara J, Saboori M .The effects of concurrent use of vitamin A and very low frequency electromagnetic field (50Hz) on limb bud development in chick embryo. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS)2011; 13(2): 7-12.