

ارزیابی توانایی انتوپاسیون در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی استان آذربایجان شرقی

مرتضی سعیدی^۱، هومن حاجی سید جوادی^۲، علیرضا علا^۳، حسام رحمانی^۴، اسماعیل محمد نژاد^۵، جیران زبردست^۶

تاریخ دریافت مقاله: ۹۰/۲/۱۲
تاریخ پذیرش مقاله: ۹۰/۳/۱۸

۱. استادیار طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲. استادیار طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳. رزیدنت طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۴. دانشجوی دکترا پرستاری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
۵. کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران

شرایط شبیه‌سازی سخت موفق به انتوپاسیون شدند. مدت زمان انتوپاسیون در امدادگران ۲۲/۸ ثانية، پرستاران ۲۴ ثانية، تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی ۲۳/۵ ثانية و تکنسین‌های بیهوشی ۱۶/۵ ثانية بود. به طور کلی می‌توان استنباط کرد که میزان عدم موفقیت پرسنل EMS ایران بسیار بیشتر از همکاران خارجی ایشان می‌باشد. Wang و همکارانش در پنسیلوانیا نشان دادند که میزان موفقیت پرسنل پارامدیک در امر انتوپاسیون در افراد با ایست قلبی-تففسی در حدود ۹۲/۸ درصد بوده که این میزان در صورت استفاده از دارو در افراد با ایست قلبی-تففسی حدود ۹۷/۱ بود.^۳ برای بهبود ارائه خدمات به بیماران نیازمند اضافه کردن دوره‌های آموزش ضمن خدمات استخدام نیروهای آموزش دیده مانند تکنسین‌های فوریت و بیهوشی، تغییر کدهای اعزام به صورتی که هر آمبولانس حداقل دارای یک نفر پارامدیک یا تکنسین بیهوشی بوده و استفاده از وسایل جدیدتر تامین راه هوایی مانند LMA و Combitube پیشنهاد می‌شود.^۴ م ت ع پ ز، ۱۳۹۰؛ ۱۳(ویژنامه [۳۶]: ۱)

References

1. Yule S, Flin R, Murdy R. The role of management and safety climate in preventing risk-taking at work. Int J Risk Assess Manag 2007; 7(2): 137-51.
2. Davis DP, Ochs M, Hoyt DB, et al. Paramedic-administered neuromuscular blockade improves prehospital intubation success in severely head-injured patients. J Trauma. 2003; 55(4): 713-719.
3. Wang HE, Kupas DF, Paris PM, et al. Preliminary experience with a prospective multi-centered evaluation of out-of-hospital endotracheal intubation. Resuscitation 2003; 58(1): 49-58.

هنگام مواجه اولیه با بیمار اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد این است آیا اقدامات صحیح توسط گروه EMS (اورژانس پیش بیمارستانی) بر روی بیمار انجام شده یا خیر. مهم ترین اقدامات مورد نظر حفاظت راه هوایی بیمار و جلوگیری از هیپوکسی است. دوره‌های هیپوکسی طولانی در موارد انتوپاسیون پیش بیمارستانی امری شایع است.^۱ با وجود دستورالعمل‌های متعدد، انجام انتوپاسیون اندوتراتکال به دلیل وجود رفلکس‌های طبیعی حفاظتی راه هوایی فوکانی امری مشکل می‌باشد.^۲ پرسنل اورژانس در ایران ترکیبی ناهمگن از ۴ گروه پرستاران، امدادگران، تکنسین‌بیهوشی و فوریت-های پزشکی هستند. با توجه به اهمیت موضوع توانایی انتوپاسیون پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی، در شرایط شبیه سازی شده بر روی مانکن بررسی شد. این مطالعه با هماهنگی قبلی با مرکز اورژانس پیش بیمارستانی در پرسنل آن مرکز که برای شرکت در کلاس‌های بازآموزی شرکت کرده بودند انجام شد. در ارزیابی اولیه مشخص شد درصد قابل توجهی از افراد سابقه قبلی از انتوپاسیون نداشته و از تجهیزات به کار رفته در این روش آگاهی کافی ندارند. روش صحیح انتوپاسیون طی مدت ۲ ساعت به صورت تئوری و عملی ارائه شد، هر شرکت کننده به دلیل جلوگیری از ایجاد خطأ به دنبال آشنا شدن پرسنل با آناتومی مانکن تنها یک نوبت مجاز به انجام انتوپاسیون بود.

نتایج نشان داد که تعداد ۲۷ نفر از آن‌ها امدادگر، ۸ نفر پرستار، ۸ نفر تکنسین بیهوشی و ۱۷ نفر تکنسین فوریت‌های پزشکی (معادل پارامدیک) بودند. ۵۶/۷ درصد هیچ‌گونه سابقه قبلی انجام انتوپاسیون بر روی مانکن و انسان را ذکر نمی‌کردند. ۷۰/۴ درصد امدادگران، ۶۲/۵ درصد پرستاران، ۱۰۰ درصد تکنسین بیهوشی و ۴۴/۱ درصد تکنسین فوریت پزشکی در وضعیت شبیه‌سازی عادی و ۴۴/۲ درصد امدادگران، ۲۵ درصد پرستاران، ۱۰۰ درصد تکنسین بیهوشی و ۴۴/۲ درصد تکنسین فوریت پزشکی در

Please cite this article as: Saeedi M, Haji-Seyd-Javadi H, Alaa A, Rahmani H, Mohammadnezhad E and Zebardast J. Evaluation of endotracheal intubation skill in prehospital emergency medical personnel (EMS) of East Azerbaijan. Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2012; 13(suppl 1): 36.